




506.947.22

M852




XB. U863, 1837

v. 9 cop. 2



117 (cop. 2)
BULLETIN

DE LA




Société Impériale

DES NATURALISTES

de Moscou.

ANNÉE 1837.



N° I.

*This is indispensable
to have at
least 7 parts!*
Glen

Moscou,

DE L'IMPRIMERIE D'AUGUSTE SEMEN,
IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE MÉDICO-CHIRURGICALE.

~~~~~  
1837.

U863  
1837  
[т. 9 1-4]  
с. 2

**ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,**

съ тѣмъ, чтобы по оппечашаніи предшавлены были въ Ценсур-  
ный Комишешъ три экземпляра. Москва, Января 8 дня, 1837 года.

Ценсоръ и Кавалеръ *И. Снегиревъ*.

# KURZE NOTIZEN

UEBER EINIGE

SCHMETTERLINGE RUSSLANDS.

ALS BEITRÆGE

ZU

TREITSCHKE'S SUPPLEMENTEN

ZU BETRACHTEN,

VON

DR. EDUARD EVERSMAUN,

PROFESSOR'N DER ZOOLOGIE AN DER UNIVERSITÄT ZU KASAN.





## KURZE NOTIZEN

UEBER EINIGE

## SCHMETTERLINGE RUSSLANDS.

---

MELITAEA *Artemis*.

Die Varietät, welche Hübner Tab. 429 fig. 653 darstellt, fliegt hier im Kasanischen Gouvernement, und scheint, in diesen Gegenden wenigstens, die nördliche Form dieses Falters zu seyn. Manche Exemplare sehen auf der Oberfläche gerade so aus wie *Merope*, d. h. von der sonst breiten rothen Binde der Hinterflügel bleiben nur kleine rothe Flecken übrig, mit schwarzen Punkten darin, und von diesen bis zur Basis ist der Grund braunschwarz, noch weit schwärzer, als ihn Hübner in gedachter Figur darstellt, mit wenigen gelben Flecken; kurz, genau so, wie bei *Merope*, die sich jedoch durch die blasse Unterseite unterscheidet. Von dieser Varietät der *Artemis* fehlt es nicht an sanften Uebergängen bis zur breiten rothen Binde der Hinterflügel, wie man sie bei Hübner Tab. 4 fig. 4 und 5 sieht, und brei-

ter; diese finden sich aber nur in südlichen Gegenden, im Orenburgischen Gouvernement, an der untern Wolga und im Caucasus. Die Flugzeit dieses Falters ist bei Kasan im Juny; an der untern Wolga und im Caucasus fliegt er um einen Monat früher, in der Mitte des May's.

### *Trivia.*

*Melitæa Fascelis* ist nichts als eine grosse dunkel gefärbte *Trivia*; ich besitze aus den hiesigen Gegenden die leisesten Uebergänge bis zur gewöhnlichen *Trivia*, hell gefärbt und von der Grösse wie *Athalia*. oder noch etwas darunter. Jedoch sind diese Stücke hier sehr selten, die gewöhnliche Form ist die, wie Esper den Falter Tab. 88 fig. 3 und 4 darstellt, oder noch weit besser Hübner Tab. 176 fig. 871, das ist ein vollkommen gelungenes Bild der *Trivia*, wie sie hier gewöhnlich vorkommt. Dieser Schmetterling fliegt bei Kasan gegen die Mitte oder Anfangs July, und ist hier selten; in der Gegend von Orenburg im Anfange des July's und Ende Juny's; und an der untern Wolga, bei Sarepta, Zaryzyn u. s. w. gegen das Ende des May's (alles nach altem Style gerechnet) und zwar dort sehr häufig.

### *Arduina.*

*Arduina* Böb. scheint wohl eine eigene Art zu seyn, und ich will die Merkmale angeben, durch welche sie sich von den ihr verwandten Arten, *Cinxia* und besonders *Phæbe*, unterscheidet. Im Jahre 1830,

im Monat Junius, habe ich zwei Exemplare im Caucasus gefangen, und 1835 am 12. May drei Exemplare an der Wolga, zwischen Kamyschin und Zaryzyn, so dass ich deren fünf besitze, einen Mann und vier Weiber. Mann und Weib unterscheiden sich nicht in der Farbenvertheilung, nur in der Grösse: der Mann ist etwas grösser als die Esper'sche und Herbst'sche Figur, die Weiber sind aber wie die grössten Exemplare von *Phæbe*. Hinsichtlich der Punkte auf den Hinterflügeln ähnelt *Arduina* der *Cinxia*, und ich muss gestehen, dass, als ich im vorigen Jahre an gedachtem Tage die drei Exemplare fing, ich glaubte *Cinxia* gefunden zu haben, und mir deshalb weiter keine Mühe gab, mehrere zu erstehen; als ich aber einige Tage später bei Sarepta die wahre *Cinxia* fand, die dort ausserordentlich häufig war, und das Gesammelte genauer durchsah, ward ich meinen Irrthum inne, konnte aber, trotz aller Mühe, keine *Arduina* mehr finden. — Wie gesagt also, die Punkte auf den Hinterflügeln hat *Arduina* mit *Cinxia* gemein, sie unterscheidet sich aber gleich auf den ersten Blick von dieser schon durch die Oberseite der Flügel, die bei *Cinxia* schwarz gegittert ist, bei *Arduina* aber schwarz gefleckt wie bei *Didyma* und *Phæbe*. Noch mehr unterscheidet sich die Unterseite. Nehmen wir zuerst die rothe Fleckenbinde an der Wurzel der Hinterflügel: diese besteht bei *Cinxia* etwa aus sieben Flecken, und geht vom Vorderrande bis zum Innenrande; bei *Arduina* sind nur die drei obersten rothen Flecken nächst dem Vorderrande



vorhanden, von welchen der zweite und dritte einen gelblich-weissen Fleck der Grundfarbe einschliessen, wie es in der Esper'schen Figur richtig, obgleich sehr grob, angegeben ist; ausser diesen drei Flecken ist nur noch ein kleiner rother, stark mit Schwarz eingefasster, Fleck zwischen dem zweiten und dritten Längsnerven, vom Innenrande gezählt, vorhanden. (Durch diese Bildung der rothen Binde an der Basis unterscheidet sich *Arduina* auch von *Phæbe*.) — Nun die zweite rothe Binde: diese ist bei *Cinxia* an beiden Seiten von schwarzen Bogen (zwischen je zwei Nerven einer) eingefasst, die ihre Convexitäten sich zuwenden; bei *Arduina* aber ist sie so gebildet wie bei *Phæbe*, sie ist kappenförmig, besteht aus rothen Halbmonden, die der Basis zugewandte Seite derselben ist von doppelten schwarzen Bogen mit entgegengestellter Convexität begränzt; kurz, genau so wie bei *Phæbe*. Deshalb ist auch die Zeichnung bei Esper und bei Herbst nicht richtig. — Ausserdem ist auch die Stellung der schwarzen Flecken in der weissen Grundfarbe zwischen den beiden genannten rothen Binden verschieden bei den verschiedenen Arten.

Von *Phæbe* unterscheidet sich *Arduina* theils durch die Oberseite, besonders aber durch die Unterseite der Hinterflügel: oben durch die Reihe schwarzer Punkte; sonst ist die Oberseite hellgefärbten Exemplaren von *Phæbe* sehr ähnlich. Ueberhaupt steht *Arduina* der *Phæbe* ohne Vergleich am nächsten, sowohl in Hinsicht der Grösse, als auch der Gestalt

und der Farbenvertheilung; und wenn man sie als Varietät irgend einer andern Art aufstellen wollte, so kann sie nur als Varietät der *Phæbe* angesehen werden. Der Hauptunterschied liegt in der Unterseite der Hinterflügel. Zuerst die rothe Fleckenbinde an der Basis: diese besteht bei *Phæbe* wie bei *Cinxia* ungefähr aus 6 bis 7 Flecken; bei *Arduina* ist sie aber wie oben angegeben. Die zweite rothe Fleckenbinde ist der bei *Phæbe* ähnlich gebildet, nur dass sie in jedem Flecken einen schwarzen Punkt hat. Ein wichtiges Unterscheidungszeichen giebt wohl noch die Stellung der schwarzen Punkte oder Flecken in der weissen Grundfarbe (Binde) zwischen den beiden rothen Binden. Die Flecken, die bei *Phæbe* sich meist als schwarze Linien zeigen, jedoch auch bei hellen Exemplaren als rundliche Flecken oder Punkte, liegen bei *Arduina* fast in der Mitte zwischen den beiden rothen Binden, bei *Phæbe* hingegen weit näher der rothen Binde an der Basis. Bei *Arduina* ist die Grundfarbe der Hinterflügel schön weiss, mit etwas Perlenmutterglanz, etwas wenig in's Gelbliche sich ziehend; bei *Phæbe* meist mehr oder weniger gelblich.

Mit *Didyma* hat *Arduina* gar keine Aehnlichkeit, und es würde unnütze Mühe seyn, die Unterscheidungszeichen anzuführen.

### *Phæbe.*

Die nördlicheren Gegenden, hier um Kasan und im nördlichen Orenburgischen, scheinen meist dunkel

gefärbte Exemplare hervorzubringen, mit eben so dunkler Oberseite wie *Athalia* und *Parthenie*; in den südlichen Gegenden an der Wolga habe ich nur hellgefärbte gefangen, etwa wie Hübner's *Aetheria* Tab. 477, und auch mit noch weit weniger Schwarz auf der Oberseite. Der Falter ist häufig, und man findet nur grosse Exemplare.

### ARGYNNIS *Selenis*.

So habe ich einen Falter genannt, der zwischen *Selene* und *Aphirape* mitteninne steht, sich jedoch von beiden wesentlich unterscheidet. Zuerst die Vergleichung mit *Selene*:

Auf der Oberseite sieht meine *Selenis* der *Selene* vollkommen gleich, desto mehr aber unterscheidet sich die Unterseite: die sogenannten Silberflecken der Hinterflügel sind nie silbern, sondern stets und ohne Ausnahme matt blassgelb, wie bei *Aphirape*; daran, und dass die Schmarren auf der Unterseite der Hinterflügel und an der Spitze der Vorderflügel, die bei *Selene* zimmetbraun sind, hier eine lebhaft Rostfarbe, die in's Pfirsichrothe zieht, zeigt, kann man den Falter gleich erkennen. Nun folgt aber noch ein specifisches Merkmal: man betrachte bei *Selene* die zweite Silberflecken-Binde auf der Unterseite der Hinterflügel, die etwa aus neun ungleichen Flecken besteht, dort bemerke man den grössern länglichen Mittelflecken, der beständig silberfarben ist, wo man finden wird, dass sich durch ihn eine kleine schwarze Querader zieht, die jedoch mehr oder weniger von

der Silberfarbe bedeckt ist; diese Querader nun befindet sich bei *Selene* am Grunde des Fleckens nach der Wurzel des Flügels hin, bei *Selenis* aber durchschneidet sie den Flecken in der Mitte, wie bei *Aphirape*. Zudem hat dieser Flecken, so wie auch die übrigen, eine etwas andere Gestalt; so z. B. hat der dritte Flecken vom Innenrande und auch der erste vom Vorderrande bei *Selene* an beiden Seiten einen Ausschnitt, bei *Selenis* aber sind sie an beiden Seiten gerade, oder auch etwas zugerundet, ohne Ausschnitt, fast wie bei *Aphirape* u. s. w. Die Nerven und Adern und Punkte, die bei *Selene* schwarz sind, sind bei *Selenis* zimmetbraun u. dergl. m. Im Uebrigen ist der Falter an Gestalt und Grösse, so wie auch auf der Oberseite, der *Selene* gleich. Mann und Weib unterscheiden sich nicht wesentlich.

Von *Aphirape* unterscheidet sich *Selenis* durch den runden Flecken oder Punkt an der Basis der Hinterflügel, wie bei *Selene*, der auf der Unterseite gelb und Braun eingefasst, auf der Oberseite aber schwarz ist; sodann auch durch die rostrothen Schmarren auf der Unterseite der Hinterflügel und an der Spitze der Vorderflügel, so wie bei *Selene*, die bei *Aphirape* ganz fehlen, u. dergl. m.

Der Falter fliegt hier im Kasanischen auf Waldwiesen, vom Ende May's bis in den July, und ist nicht selten.

Ich besitze eine Varietät, die auf der Oberseite ganz russigbraun ist, mit wenigen verwischten rothen Flecken der eigentlichen Grundfarbe.



*Niobe — Adippe.*

Ich muss gestehen, dass diese beiden Arten einander sehr nahe stehen, und dass ich einige Exemplare besitze, von welchen ich nicht weiss, zu welcher Art ich sie stecken soll. Der schwarze Punkt auf der Unterseite der Hinterflügel an der Basis kann für *Niobe* nicht entscheidend seyn, er fehlt oft; eher die grüne Färbung der Unterseite. Beide Arten sind hier sehr häufig.

*Aglaja.*

Exemplare, die ich im Caucasus gefangen habe, zeichnen sich dadurch aus, dass sie über ein halb Mal grösser sind als die hiesigen, und meist auf der Oberseite sehr dunkel gefärbt, und mit schönem veilchenblauen Schimmer der schwarzen Farbe. Jedoch ist dieses nichts Specielles, denn es fehlt nicht an Uebergängen. Dasselbe finde ich auch an orenburgischen und caucasischen Exemplaren von *Hecate*.

*Laodice.*

Fliegt auf Waldwiesen hier im Kasanischen, ist aber selten; nur im Jahre 1830 war sie sehr häufig.

*Paphia.*

Die Varietät *Valesina* ist im Orenburgischen nicht selten, ich habe aber bis jetzt nur Weiber gesehen.

*Pandora.*

Fliegt auch an der untern Wolga, bei Sarepta, im Juny. Im Caucasus ist sie ausserordentlich häufig

auf den blühenden Disteln neben Laubholz; fliegt dort ebenfalls von den ersten Tagen des Juny bis in den July.

### VANESSA *Cardui*.

Ist hier überall, im Norden und im Süden, der gemeinste Schmetterling und fliegt das ganze Jahr hindurch. Selbst in den ödesten Steppen am Caspischen Meere, zwischen der Wolga und dem Uralflusse, wo sonst kein Tagschmetterling lebt, trifft man ihn an.

### *Xanthomelas* — *Polychloros*.

*Xanthomelas* ist auch hier sehr selten; ich habe nur ein Exemplar aus dem Orenburgischen, das im Spätsommer gefangen ist, und ein anderes, das überwintert hatte, fing ich hier bei Kasan am 6. April. *Polychloros* kommt aber wohl östlich von der Wolga nicht mehr vor; auch auf dem westlichen Ufer dieses Flusses habe ich ihn noch nicht gefunden.

### *F. album*.

Ich habe einen Schmetterling aus dem Orenburgischen, der genau die Gestalt des *F. album* hat, wie er bei Esper abgebildet ist, nur dass die braune Farbe bei meinem Exemplare schwärzer und mehr verbreitet ist, und die gelbe Farbe röther. Da ich nur ein Exemplar habe, so kann ich nichts darüber bestimmen, möchte ihn aber eher für Art halten, als für Varietät von *C. album*.

**LIMENITIS** *Aceris* etc.

Der Falter fliegt überall an der Wolga und am Ural in niedrigem Laubholze, besonders wenn Wasser in der Nähe ist; in südlichen Gegenden am Ende May's, in nördlichen im Juny. — *Lucilla* fliegt an denselben Stellen, nur etwas später, und ist häufiger als *Aceris*. — *Sibilla* fliegt ebenfalls an denselben Stellen, nur noch später, im Juny und July. — *Camilla* habe ich bis jetzt nur im Caucasus gefunden.

**APATURA** *Iris* — *Ilia*.

Beide Falter kommen hier im Kasanischen vor, obgleich *Iris* sehr selten. *Ilia* ist in den südwestlichen Vorgebirgen des Urals sehr häufig an belaubten Bächen. — Bei Sarepta (an der Wolga) soll, nach dem Zeugnisse des dortigen Gemeindevorstehers, Herrn Zwick, keine blaue *Iris* oder *Ilia* vorkommen, alle sind roth. Bei meiner Anwesenheit in Sarepta flog dieser Schmetterling noch nicht, und ich konnte auch keinen zur Ansicht bekommen, deshalb kann ich nicht bestimmen, ob es (nach der Ochsenheimer'schen Festsetzung) *Iris* oder *Ilia* ist. Er fliegt, nach der Aussage des Hrn. Zwick, gegen Ende des Juny und im July.

**HIPPARCHIA** *Briseis*.

Ist im Orenburgischen sehr häufig auf trocknen, lehmigen Anhöhen, fliegt im Juny und July. Nie habe ich dort eine Var. *Pirata* gesehen.

*Anthe.*

Fliegt auf denselben Stellen, wo *Briseis*, nur später, im July; kommt auch an der südlichen Wolga vor.

*Hippolyte.*

Bewohnt die südwestlichen nackten und trocknen Vorgebirge des Urals; fliegt dort zu gleicher Zeit, in der ersten Hälfte des July, mit *Antonoë*. Beide Falter sind dort nicht selten, nur, da sie sich meist an steilen Felsen aufhalten, mühsam zu fangen. Bei der Hübner'schen Figur ist die Binde auf der Oberseite der Flügel zu roth gehalten.

*Antonoë.*

Dieser Falter fliegt, wie gesagt, im Juny und July an trocknen, steinigen Anhöhen des östlichen Orenburgischen Gouvernements. Die Hübner'sche Figur ist schlecht, der Schmetterling ist darnach nicht zu erkennen; die Binde auf der Oberseite ist in der Natur nicht röthlich, sondern bleichgelb, wie bei der Esper'schen Figur; die weissen Punkte auf der Oberseite der Hinterflügel, wie sie Hübner angiebt, sind in der Natur nicht, nur ein sehr kleines Auge mit weissem Kern ist vorhanden; auf der Unterseite ist ebenfalls ein sehr kleines Auge mit weissem Kern, und vier nur sehr schwach angedeutete Punkte. Alle meine Exemplare haben auf den Vorderflügeln nur zwei Augen.



*Semele.*

Ist häufig im Caucasus und bei Sarepta an der Wolga; fliegt an buschigen Orten gegen Ende May's und im Juny; setzt sich am liebsten an Baumstämme.

*Arethusa.*

Fliegt im Juny in den Orenburgischen Steppen nicht selten.

*Bryce.*

Ist häufig an den nackten und steinigen Hügeln des südwestlichen Ural-Gebirges, wo sie zu gleicher Zeit mit *Antonoë* fliegt. Die Männchen sind in der Regel (wenn sie nicht abgeflogen oder verbleicht sind) auf der Oberseite schwarzbraun, ohne jede Spur einer Binde; die Weibchen mehr oder weniger dunkelkaffeebraun, mit schwach angedeuteter blasser Binde. Ich bin vollkommen einverstanden, dass *Bryce* und *Cordula* zu einer Species gehören, wenigstens ist der Schmetterling, den ich als *Cordula* aus Deutschland erhalten habe, durchaus nicht von unserer *Bryce* hier verschieden; jedoch kommt unsere *Bryce* nie mit so gelber Binde vor, wie sie Hübner's *Peas* Tab. 29 (*Cordula* Ochs.) zeigt. *Bryce* ändert auf den Vorderflügeln mit zwei, drei und vier Augen.

*Clymene.*

Fliegt häufig bei Sarepta zugleich mit *Semele* in kleinen Wäldchen oder bewachsenen Schluchten; auch bei Saratow wird sie noch angetroffen; höher

nach Norden habe ich sie nicht gesehen. Ich habe Mann und Weib zu derselben Zeit (Ende May's und Anfangs Juny) frisch und wohl erhalten gefangen. Das Weib ist um ein halb Mal grösser als der Mann.

### *Tarpeja.*

scheint sehr früh im Jahre, schon in den ersten Tagen des May's, und ist im Juny schon abgeflogen. Sie findet sich überall in den Orenburgischen Steppen, die etwas hügelig und mit Gras bewachsen sind, und an der Wolga, aber immer nur einzeln. Der Schmetterling ist ziemlich zart, und gute Exemplare sind selten. Nach Norden bis in's Kasanische Gouvernement geht er nicht.

### *Narica*, TAUSCHER.

Fliegt in den mehr südlichen Orenburgischen Steppen auf etwas nackten, unbewachsenen Stellen und auf niedrigen Hügeln. Die Hübner'schen Abbildungen Tab. 439 sind sehr gut.

### *Clotho.*

Ist der gemeinste Schmetterling in den Steppen an der Wolga ost- und westwärts; überall im Orenburgischen Gouvernement und selbst bis hier nach Kasan ist er verbreitet, und fliegt in den südlichen Gegenden schon gegen Ende May's, in den nördlichen um einen Monat später, und fliegt bis in den August.

*Galatea* aber ist hier sehr beschränkt, nur in der Gegend von Ufa hat sie sich gezeigt; im Caucasus hingegen ist sie sehr häufig.

*Afer.*

Hält sich nur in den südlichen Steppen an der Wolga und des Orenburgischen Gouvernements auf; fliegt früh, in der ersten Hälfte des May's. Bei Saratow kommt er noch vor, nördlicher wohl nicht. Der Schmetterling ist sehr zart, und gute Exemplare sind selten.

*Leander.*

Ist nicht selten an der untern Wolga; findet sich auch im Orenburgischen und im Caucasus. Der Schmetterling fliegt gegen das Ende des May's und im Anfange Juny's, am liebsten zwischen Buschwerk an Bächen in Schluchten.

*Amarillis*, HERBST. Tab. 486. Fig. 4, 2.

Dieser Schmetterling, den Ochsenheimer zu *Leander* gezogen hat, stellt eine ganz unbezweifelte Species dar, die zu *Leander* nicht mehr Verwandtschaft hat, als auch die übrigen hier nahe stehenden Iriparchien. Die Herbst'sche Figur ist ziemlich treu, und ist hinreichend, den Unterschied von *Leander* zu zeigen. *Amarillis* ist auf der Oberseite bei Mann und Weib einfarbig ockergelb, ohne schwarze Bestäubung wie bei *Leander*; die Augen der Unterseite scheinen oben durch, nur auf der Oberseite der Vorderflügel zeigen sich einige derselben als schwarze Punkte; auf den Hinterflügeln ist dieses selten der Fall.

Um den Unterschied dieses Schmetterlings von

*Leander* zu zeigen, habe ich ihn schon vor mehrern Jahren in den Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou abgebildet und beschrieben. — Er fliegt in den östlichen grasbewachsenen Steppen des Orenburgischen Gouvernements in der letzten Hälfte des Juny's.

*Phryne.*

Pallas nennt diesen Schmetterling mit Recht ein *Animalculum tenerrimum*; er ist sehr zart und verfliegt deshalb bald, besonders auch wegen der starken Winde, die in den Steppen im Frühjahre beständig herrschen. Der Mann ist bekanntlich schwarz und grösser, und auch gegen die sonstige Regel viel seltener, als das weisse Weib; man kann hundert Weiber fangen, ohne einen einzigen Mann zu finden. Der Schmetterling fliegt hauptsächlich in den südlichen Steppen; jedoch habe ich ihn einmal auch bei Sisran an der Wolga gefangen, und das wäre dann der nördlichste Punkt. Er ist sehr träge: wenn man ihn aufjagt, wird er vom Winde mehr oder weniger weit fortgetrieben und fällt dann nieder. Er fliegt schon in den ersten Tagen des May's; am Ende dieses Monats ist schwerlich noch ein ganzes Exemplar zu finden.

**LYCAENA** *Arion.*

Die Exemplare aus hiesiger Gegend und aus den Orenburgischen Steppen sind meist sehr dunkel gefärbt, bei manchen ist die ganze Oberseite schwarz-



braun, doch so, dass die schwarzen Punkte noch deutlich sind. Exemplare aus dem Caucasus gleichen denen aus Teutschland.

*Euphemus.*

Fliegt auch in den grasbewachsenen nordöstlichen Steppen des Orenburgischen Gouvernements im July, jedoch nicht häufig.

*Acis.*

Ist hier und im Orenburgischen die gemeinste *Lycæna*; sie sitzt im Juny und July zu vielen Tausenden auf feuchten Wegen und an Pfützen.

*Argiolus.*

Fliegt hier nur in den ersten Frühlingstagen, sobald der Schnee weggeschmolzen ist; ich vermuthe deshalb, dass die Puppe hier überwintert, denn die Exemplare sind frisch.

*Donzelii.*

Von dieser *Lycæna* habe ich ein Exemplar im Orenburgischen gefangen, ganz genau so, wie sie bei Hübner Tab. 439 fig. 955 und 956 abgebildet ist.

*Rhymnus.*

So habe ich eine kleine *Lycæna* aus dem Orenburgischen genannt, die sich von allen übrigen Arten dadurch auszeichnet, dass sie auf der Unterseite, statt der schwarzen Punkte, weisse hat u. s. w. Ich habe sie beschrieben und abgebildet in den Nouveaux Mémoires de la Société des Naturalistes de Moscou.

*Daphnis.*

Die Weiber dieses Falters sind hier fast alle auf der Oberseite braun mit mehr oder weniger Weiss gegen den Rand hin, und mit schwarzen, weiss eingefassten Punkten am Rande; jedoch fehlt es nicht an Uebergängen zu dem in Teutschland gewöhnlichen Weiße mit blauer Oberseite, schwarzem Rande u. s. w.

*Escheri.*

Ich kann diesen Falter, der auch hier genau so vorkommt, wie ihn Hübner Tab. 460 abgebildet hat, unmöglich für eine eigene Art halten, denn er unterscheidet sich doch von *Alexis*, der hier ebenfalls sehr häufig ist, durch nichts, als durch die fehlenden zwei Punkte an der Basis der Vorderflügel; und Exemplare von *Alexis* mit einem Punkte kommen hier auch vor.

*Pylaon*, FISCHER.

So hat Herr Professor Fischer in Moskau eine *Lycæna* aus dem südlichen Russland benannt, und sie in den Mémoires de Moscou etc. Tom. II. auf der 49. Tafel fig. 5 und 6 abgebildet. Wahrscheinlich stellt diese Figur ein Weibchen vor, und ich glaube den Mann zu besitzen. Die Oberseite ist bei diesem ganz blau, ungefähr wie bei *Argus*, mit einem sehr schmalen schwarzen Saume eingefasst; nur auf den Hinterflügeln steht am Rande zwischen je zwei Nerven ein schwarzer Punkt; die rothe Binde

der Unterseite stimmt vollkommen mit der Figur am angeführten Orte. Der Schmetterling steht dem *Argus* am nächsten; silberne Punkte auf der Unterseite wie bei *Argus* habe ich an vier Exemplaren, die ich am 12. May bei Kamüschin an der Wolga fing, nicht bemerken können.

### *Cyane.*

Ich habe eine wunderschöne *Lycæna* aus dem östlichen Orenburgischen Gouvernement, die durchaus mit keiner andern der bekannten verwechselt werden kann; aber leider habe ich nur ein Exemplar, ein Weibchen; ich habe es einstweilen *Cyane* genannt. Auf der Oberseite sind die Flügel braun, von der Basis her mit Himmelblau überzogen; in der Mitte der Vorderflügel steht ein schwarzer Mondfleck, und am Aussenrande zwischen je zwei Nerven ein weisser Fleck mit einem schwarzen Punkte. Auf den Hinterflügeln stehen eben solche Flecken, aber orangegelb mit schwarzen Punkten, und über ihnen, der Basis zu, leichter angedeutete weisse Flecken. Die Unterseite ist weisslich mit grossen schwarzen eckigen Punkten; nur die Hinterflügel haben Orange-Flecken mit Silberpunkten.

### *Bavius.*

Diese neue Species habe ich ebenfalls im Orenburgischen gefangen und in mehrbenannten *Mémoires* abbilden lassen. Sie hat im Allgemeinen einige Aehnlichkeit mit *Battus*, nur ist sie stärker gebaut und

fast doppelt so gross, hat eine rothe Binde auf der Oberseite der Hinterflügel, und keine schwarzen Flecken auf der Oberseite wie bei *Battus*. Die schwarzen Flecken der Unterseite gleichen denen bei *Battus*.

*Hippothoë.*

Findet sich im Orenburgischen nicht selten; der Schmetterling wechselt auch dort sehr in der Grösse: ich habe Exemplare von der Grösse einer *V. Urticæ*, und auch die kaum grösser sind als *Phleas*. Besonders wechseln die Weiber in der Grösse.

**DORITIS** *Nomion.*

Dieser Schmetterling fliegt nur im östlichen Sibirien, und ist gewiss keine Varietät von *Apollo*. Es finden sich, wie überall, so besonders auch hier im Kasanischen und Orenburgischen schwarzbestäubte Exemplare von *Apollo* (besonders sind es Weiber), aber ein *Nomion* ist hier nie gefunden worden, obgleich *Apollo* sehr häufig ist.

*Mnemosyne.*

Ist in den Steppen an der mittlern Wolga meist so häufig, wie in Teutschland *Pontia Brassicæ*, *rapæ* oder *napi*.

**PONTIA** *Raphani.*

Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, dass dieser Falter in Russland nicht angetroffen wird: ich habe nun seit zwanzig Jahren diese Gegenden vielfach durchstreift, aber nie ist er mir aufgestossen.



*Chloridice.*

Fliegt im Orenburgischen in der Nähe von Dörfern nicht selten, zugleich mit *Daplidice*, und an manchen Stellen noch häufiger als diese, im Juny; im July findet man nur noch selten ein ganzes Exemplar; überhaupt ist der Schmetterling weit zarter als *Daplidice*. Er entfernt sich nicht so weit von bewohnten Gegenden als diese, und fliegt meist auf den mit *Raphanus Raphanistrum* L. et *tenellus* Pall., *Sisymbrium Sophia* L. etc. bewachsenen Schutthaufen, wo wahrscheinlich späterhin die Raupe ihre Nahrung findet. Die Hübner'schen Abbildungen sind recht treu.

*Eupheme*, ESP.*Erothoë*, МНН.

Da die Esper'sche Figur nicht besonders gerathen ist, so habe ich den Falter noch einmal in den *Mémoires des Naturalistes de Moscou* abbilden lassen. Ein Pärchen fing ich in den ersten Tagen des Mays in den Steppen der Kalmücken zwischen der südlichen Wolga und dem Ural-Flusse. Das Weibchen unterscheidet sich vorzüglich durch den mangelnden rothen Flecken in der Spitze der Vorderflügel. Der Falter flog auf Stellen, die mit *Sisymbrium Sophia* L. und *Lepidium perfoliatum* L. bedeckt waren, wahrscheinlich um dort seine Eier abzulegen.

*Pyrothoë.*

So habe ich eine *Pontia* genannt, die in der Farben-

vertheilung viel Aehnlichkeit mit der vorigen hat, jedoch sich von ihr vielfach unterscheidet. Ich habe sie zugleich mit der vorigen in gedachten Memoires abbilden lassen.

### COLIAS *Aurora*.

Dieser Schmetterling kann nicht zu den europäischen gezählt werden, denn diesseits des Uralgebirges kommt er gewiss nicht vor; der westlichste Punkt von Sibirien, wo er gefunden wird, ist wohl das Altai-Gebirge; meine Exemplare sind aus Irkutsk. Auf meinen vielen Reisen im südlichen und östlichen europäischen Russland habe ich nie eine *Aurora* gefunden, auch nie von andern Sammlern gehört, dass sie diesen Schmetterling aus dem südlichen Russland besäßen. Die einzigen Exemplare, die ich in Anderer Sammlungen gesehen habe, sah ich bei dem Professor Fischer in Moskau, in beiden Geschlechtern, und diese waren ebenfalls aus dem östlichen Sibirien. Ich besass zwei Paare, jetzt habe ich nur noch ein Paar. Mein Männchen kommt mit dem bei Hübner abgebildeten recht gut überein, und ich finde nicht, dass der Flügelschnitt verfehlt wäre, wie Hr. Treitschke in seinen Supplementen angiebt, allenfalls dass der Aussenrand der Vorderflügel zu sehr auswärts gebogen, zu sehr zugerundet ist (das ändert aber häufig ab, wie wir an *Myrmidone* sehen); sonst stimmt Grösse und Zeichnung vollkommen, nur dass bei meinem Männchen in dem schwarzen Flecken am Vorderrande der Vorderflügel ein grosser orange-

farbener Punkt ist, so dass der Flecken als schwarzer Ring erscheint; bei dem Weibe ist dieses nicht, jedoch so etwas variirt. — Die Weiber müssen in der Grundfarbe der Oberseite abändern, denn meine Weibchen waren oberhalb gelblichweiss, ungefähr von der gelblichen Farbe des Weibes von *Palæno*, oder noch weisser; die Weibchen aber, die ich in Moskau gesehen habe, waren orangefarben, etwas weniger roth wie das Männchen, unterschieden sich aber in nichts von den meinigen.

Nun will ich kurz das mir noch gebliebene Weibchen beschreiben, muss aber vorher bemerken, dass ich Hrn. Boisduval's Abbildung des Weibes nicht kenne, und daher nicht urtheilen kann, inwiefern diese mit meinem Exemplare stimmt; jedoch nach der Beschreibung des Hrn. Treitschke in den Supplementen zu urtheilen, hat Hr. Boisduval ein rothes Weibchen gehabt, so wie ich in Moskau gesehen habe. Noch will ich anmerken, dass wenn Hrn. Boisduval's Weibchen wirklich aus dem südlichen Russland stammt, ich es für meinen Theil so lange für *Myrmidone* halte, bis ich die Zeichnung werde gesehen haben.

Mein Weibchen ist etwas grösser als das Männchen; die Oberseite, wie gesagt, gelblichweiss, Flügelschnitt, schwarzer Aussenrand und die gelben Flecken darin so genau wie bei *Myrmidone*; die Franzen aller Flügel sind rosenroth; der Vorderrand, die Basis und die Nerven der Vorderflügel schwarz bestäubt, die Nerven am stärksten; auf den Hinterflügeln ist die

ganze Fläche von den gelben Flecken am Aussenrande bis zur Basis schwarz bestäubt, ungefähr wie bei *Myrmidone*, nur der Flecken in der Mitte ist rein, blass fleischfarben. Die Unterseite ähnelt, hinsichtlich der Farbe, der des blassen *Palæno*-Weibchens; der schwarze Mittelflecken der Vorderflügel hat eine grosse silberne Pupille; die schwärzlichen Flecken vor dem Aussenrande sind sehr schwach; die Hinterflügel haben gar keine schwarzen Flecken vor dem Aussenrande, wie dieses z. B. bei *Myrmidone*, *Hypale* u. s. w. der Fall ist (jedoch fehlen sie auch oft bei *Myrmidone*), nur die gelben Flecken der Oberseite scheinen schwach durch; in der Mitte steht ein grosser und ein kleiner Silberfleck wie bei *Myrmidone*, beide ebenfalls braun eingefasst.

*Aurore* steht der *Myrmidone* sehr nahe, nur ist sie über ein halb Mal grösser.

### *Myrmidone.*

Fliegt hier um Kasan, in den nördlichen Steppen des Orenburgischen Gouvernements und an der mittlern Wolga vom May bis tief in den August, und ist gar nicht selten, in manchen Jahren gemein. Die grosse Aehnlichkeit, die dieser Falter mit *Aurora* hat, und dann die falsche Angabe, dass *Aurora* im südlichen Russland fliege, ist die Ursache, wesshalb fast alle Sammler, die keine Kupferwerke besitzen, und blos nach Beschreibungen bestimmen können, unsere *Myrmidone* für *Aurora* gehalten haben; mir ist es Anfangs nicht besser gegangen. Zu dem kommt



noch, dass unsere *Myrmidone* hier sehr gross ist, und in frischen Exemplaren von ausserordentlicher Schönheit, mit eben solchem Rosenschimmer auf der dunkel-orangefarbenen Oberfläche, wie bei *Aurora*.

### *Chrysotheme.*

Fliegt um Kasan im May, ist nicht häufig und fliegt nur kurze Zeit. In andern Gegenden habe ich sie bis jetzt nicht bemerkt.

### *Nerience*, FISCHER.

Fischer hat nur das Männchen abgebildet. Der Falter bewohnt die südlichen Steppen der Wolga; am östlichen Ufer der Achtuba, unweit Astrachan, traf ich ihn um die Mitte des May's nicht selten. — Das Weibchen lässt sich am besten mit *Hyala* vergleichen, der es so nahe kommt, dass es dem Ungewöhnlichen oft schwer fallen wird, dasselbe zu unterscheiden; das Männchen aber hat einen schwarzen Aussenrand ohne Flecken, wie bei *Chrysotheme* und *Myrmidone*. *Nerience* ist kleiner als *Hyale*; das Gelb der Oberseite ist lebhafter und geht in's Orange über, sowohl beim Weibe als beim Manne, doch bei diesem öfterer, so dass der Falter der *Chrysotheme* ähnlich sieht, sich von ihr aber (ausser der geringeren Grösse) dadurch unterscheidet, dass der schwarze Saum des Aussenrandes auf den Vorderflügeln sich fast unter einem rechten Winkel zum Vorderrande umbiegt, noch auffallender wie bei *Myrmidone*; bei *Chrysotheme* hingegen wird der schwarze Saum

gegen den Vorderrand hin nur allmählig breiter. Gelbe und abgeflogene verbleichte Weibchen sehen der *Hyale* sehr ähnlich.

### **HESPERIA** *Tessellum*.

Fliegt in den Orenburgischen Steppen und an der Wolga Ende May's und im Juny bis in den July, und ist nicht selten.

### *Sylvius*.

Fliegt im Orenburgischen, und auch, wiewohl selten, hier um Kasan gegen das Ende des May's und im Anfange Juny's, zugleich mit *Paniscus*, in kleinen Wäldchen an den feuchten Ufern der Bäche.

### **ZYGAENA**.

Die gemeinsten *Zygänen* hier im Kasanischen sind *Minos*, *Scabiosæ* und *Trifolii*; die gemeinsten im Orenburgischen sind: *Onobrychis* und *Lonicerae*; die gemeinste im Caucasus war im Jahre 1830 *Meliloti*. *Cynaræ* scheint an der untern Wolga am häufigsten vorzukommen.

### **MACROGLOSSA** *bombyliformis*.

Die hier und im Orenburgischen vorkommt, scheint, nach der Beschreibung in Treitschke's Supplementen zu urtheilen, *Miseliformis Treitschkii* zu seyn, stimmt aber genau mit Hübner's *Fuciformis* Tab. 9 fig. 55, aber nicht ganz mit der Esper'schen Abbildung desselben Schmetterlings.

*Croatica.*

Kommt auch hier im Kasanischen vor, aber sehr selten; häufiger bei Sarepta an der Wolga; fliegt dort im May und Juny bei Tage im Sonnenschein auf Blumen: Disteln, Rittersporn u. s. w.

*Gorgon.*

Fliegt bei Sarepta Ende May's und Anfang Juny's Abends spät, wie die echten *Sphinges*. Er ist sehr selten.

**DEILEPHILA** *lineata.*

Schwärmte mit *D. Euphorbiæ* Ende May's häufig auf Euphorbia in den Steppen an der Achtuba. Auch bei Sarepta findet er sich.

*Zygophylli.*

Ist an der Wolga noch nicht gefunden. Die zwei Stücke, die aus Russland sind, sollen bei Kislär gefangen worden seyn. Ich habe diesen Schwärmer noch nicht gesehen.

**ACHERONTIA** *Atropos.*

Findet sich an der südlichen Wolga, herauf bis nach Saratow.

**SPHINX** *Convolvuli.*

Ist bis jetzt nicht nördlicher und nicht östlicher als Sarepta gefunden.

*Ligustri.*

Findet sich auch hier um Kasan und im nörd-

lichen Orenburgischen Gouvernement. Die Raupe habe ich oft angetroffen, jedoch nur jahrweise; sie lebt hier von *Lonicera tatarica* L. und *Xylosteum* L., und in den Gärten findet man sie auch auf *Syringa vulgaris* L. und *persica* L.

### **SATURNIA** *Carpini.*

Die Raupe, die hier sehr häufig ist, lebt auf wilden Rosen- und Himbeersträuchen.

### **LITHOSIA** *grammica.*

Ist in den nördlichen grasbewachsenen Steppen des Orenburgischen Gouvernements sehr häufig im Juny, und kommt oft mit ganz schwarzen Unterflügeln vor.

### **LIPARIS** *Monacha.*

Der Schmetterling war hier in den Wäldern um Kasan im Jahre 1829 in ungeheurer Menge und in allen Varietäten, von weiss bis ganz grauschwarz, ohne alle Zeichnung. Vorher und nachher ist er nicht mehr gesehen worden.

### *Dispar.*

Verwüstet im Orenburgischen in der Regel die Eichen- und Espenwälder so sehr, dass kein Blatt mehr zu sehen ist, und der Wald mitten im Sommer schwarz erscheint.

### **EUPREPIA** *pulchra.*

Dieser schöne Schmetterling erscheint bei Astrachan und in der Gegend weiter umher im May in



ungeheurer Menge, und immer auf Stellen, die mit der dort häufigen Messerschmidia Arguzia L. bewachsen sind. Er kommt auch weiter östlich und nördlich bis Orenburg vor, aber dort nur sehr selten.

*Lapponica.*

Ich habe ein Exemplar, das bei Irkutsk gefangen worden ist; hier kommt sie nicht vor.

*Flavia.*

Kommt vorzüglich im Permischen und im nördlichen Ural vor; ist aber selten. Der Schmetterling erscheint im July.

(Die Fortsetzung folgt.)

INSECTA  
WOLGAM FLUVIUM

INTER ET  
MONTES URALENSES

OBSERVATA

A

DR. EDUARDO EVERSMAHN.

CASANI 1836.

---

RHYNCHOTA.

TYPHLOCYBA. *Cicada. Fabr.*

Picta. F.  
Quadrinotata. F.  
Quercus. F.  
Flavescens. *mihi*.  
Rosae (*Iassus*) F.

BYTHOSCOPIUS. *Iassus* F.

Biguttatus. F.  
Adpersus. *mihi*.  
Clathratus. *mihi*.  
Fulgidus. F.  
Fasciatus. *mihi*.  
Flavicollis. (*Cicada*).  
Frontalis. *mihi*.  
Diaphanus. *mihi*.  
Infuscatus. *mihi*.  
Varius. *mihi*.

IASSUS. *Cicada. F.*

Prasinus. F.

ACOCEPHALUS. *Cercopis. F.*

Costatus. Pz.  
Striatus. F.  
Trifasciatus. *Cicada* F.  
Punctulatus. *mihi*.  
Luridus. *mihi*.

EUACANTHUS. *Cicada.*

Interruptus. F.  
Histrionicus. *mihi*.

TETTIGONIA. *Cicada* F.

Viridis. F.

APHROPHORA. *Cercopis*. F.

Spumaria. F.  
Bifasciata. F.  
Angulata. F.

CERCOPIS. *Autor*.

Sanguinolenta. F.

## CENTROTUS.

Cornutus. F.  
Genistæ. F.

TETTIGOMETRA. *Gm.*

Piceola. *Klug.*

ISSUS. *Autor*.

Apterus. F.

CIXIA. *Flata* F.

Linearis. *mihi.*  
Pallida. *mihi.*

CICADA. *Tettigonia*. F.

Sanguinea. F.  
Aestivalis. *mihi.*  
Minor. *mihi.*  
Fuchsii. *mihi.*  
Prasina. *mihi.*

CORIXA. *Sigara*. F.

Punctata. Pz.  
Striata. F.

NOTONECTA. *Autor*.

Glaucia. F.

NAUCORIS. *Autor*.

Cimicoides. F.  
Maculatus. F.

NEPA. *Autor*.

Cinerea. F.

RANATRA. *Autor*.

Linearis. F.

## HYDROMETRA.

Paludum. F.  
Lacustris. L.  
SALDA.  
Littoralis. F.  
Major. *mihi.*

GERRIS. *Fabr.*

Erraticus. *Klug.*

HARPACTOR. *Reduvius*. *Aut*

Cruentus F.  
Annulatus. F.  
Pedestris. *Wolf.*

PIRATES. *Reduvius*. *Fabr.*

Stridulus. F.

## NABIS.

Vagans (*Miris*). F.  
Pallida. *mihi.*  
Aptera (*Reduvius*). F.

## ONCOCEPHALUS.

Squalidus (*Reduvius*) *Rossi.*

## SYRTIS.

Crassipes. F.

## ACANTHIA.

Lectularia. F.

## ANEURUS.

Laevis (*Aradus*). F.

## ARADUS.

Betulæ. F.  
Corticalis. F.  
Depressus. F.  
Lugubris. Fall.

## PIESMA.

Marginatum. (*Acanthia*) Wolf.

MONANTHIA. *Tingis*. autor.

Cardui. F.

Convergens. Klug.

Humuli. F.

Quadrимaculata. Fall.

## ZOSMERUS.

Maculatus. Lap.

## MIRIS.

Elongatus. *mihi*.

Laevigatus. F.

Virens. F.

Dolabratus. F.

Erraticus L.

Abbreviatus. Wolf.

Holsatus F.

CILLOCORIS. Hahn. *Capsus*. F.

Flavomaculatus. F.

Rubricollis. *mihi*.

Liturgatus *mihi*.

HIPPORHYNCHUS. *mihi*.

Bifasciatus. m.

Unifasciatus. m.

PHYTOCORIS. *Miris* et *Lygaeus*. F.

Bipunctatus. F.

Binotatus. Hahn.

Ferruginosus. m.

Scriptus. F.

Ferrugatus. F.

$\beta$ . campestris. F.

Seticornis (*Capsus*). F.

Gothicus. F.

$\beta$ . albomarginatus. F.

Collaris. m.

Dorsalis. m.

Quadrимaculatus. m.

Marmoratus. m.

Conspersus. m.

Rubromarginatus. m.

Longicornis. Wolf.

Contaminatus. Hahn.

Obsoletus. m.

Pallidus. m.

Pellucidus. m.

Prasinus. m.

Obscurus. m.

Saliens. Wolf.

Unicolor. (*Capsus*). Hahn.

Semiflavus. Hahn.

Lateralis. Hahn.

Pratensis. F.

Conspurcatus. m.

Sordidus. m.

Rubroterminatus. m.

Tripunctatus. F.

Pictus. Hahn.

Pabulinus (*Miris*). F.

Transversalis. F.

Pinastri. Hahn.

Bimaculatus. m.

Brunnipennis. m.

Ferrugineus. m.

## CAPSUS. Autor.

Tricolor. F.

Ater. F.

Flavomaculatus. m.

Tyrannus. F.

Scutellaris. F.

Magnicornis. Hahn.

HETEROTOMA. *Capsus*. F.

Pulverulenta. Klug.

Brunnipes. m.

ATTUS. Hahn.

Lencocephalus. (*Lygaeus*). F.

Opacus. m.



HALTICUS. *Hahn. Salda. F.*

Pallicornis. *F.*

Unicolor. *m.*

### LABOPS.

Diopsis. *Burm.*

PYRRHOCORIS. *Lygaeus. F.*

Apterus. *F.*

ANTHOCORIS. *Lygaeus. F.*

Nemorum. *F.*

OPHTHALMICUS. *Salda. F.*

Ater. *F.*

CYMUS. *Hahn.*

Resedae. *Pz.*

Glandicolor. *Hahn.*

Pusillus. *m.*

HETEROGASTER. *Lygaeus.*  
*F. Fallen.*

Urticae. *F.*

Salviae. *Schilling.*

PACHYMERUS. *Lygaeus.*  
*autor.*

Echii. *F.*

Marginatus. *m.*

Marginepunctatus. *Wolf. Hahn.*

Quadratus. *Hahn. F.*

Chiragra. *F.*

Agrestis. *Hahn.*

Sylvaticus. *Hahn.*

Saturnius. *Rossi.*

Pedestris. *Pz.*

Pini. *F.*

Vulgaris. *Schill.*

Nebulosus. *Fall.*

Staphyliniformis. *Schill.*

Varius. *Wolf.*

Decoratus. *Hahn.*

Erraticus. *Fall.*

Abietis. *Fall.*

Amoenus. *m.*

Rolandri. *F.*

### LYGAEUS.

Equestris. *F.*

Punctum. *F.*

Pruinosus. *m.*

CORIZUS. *Coreus et Lygaeus F.*

Hyoscyami. *F.*

Crassicornis. *F.*

Capitatus. *F.*

### COREUS.

Denticulatus. *Hahn.*

Pilicornis. *Klug.*

Denticulatus. *Wolf.*

GONOCERUS. *Coreus. Autor.*

Venator. *F.*

Sordidus. *m.*

MYRMUS. *Coreus. Fall.*

Miriformis. *Fall.*

### BERYTUS.

Tipularis. *F.*

SYROMASTES. *Coreus. F.*

Scapha. *F.*

Marginatus. *F.*

ALYDUS. *Autor.*

Flavomarginatus. *m.*

Calcaratus. *F.*

STENOCEPHALUS. *Latr.*

*Coreus. Hahn.*

Nugax. *F.*

ACANTHOSOMA. *Curt. Cimex. F.*

Haemorrhoidalis. F.  
 Haematogaster. *Schrank. Litu-  
 rata. F.*  
 Grisea. l. *Agathinus. F.*  
 Bispina. *Pz. Ferrugator F.*

## AELIA. F.

Acuminata. F.

## CIMEX. F.

Rufipes. F.  
 Sanguinipes. F.  
 Nigricornis. F.  
 Prasinus. F.  
 Juniperinus. F.  
 Purpuripennis. *Hahn.*  
 Roseo-marginatus. *m.*  
 Baccarum. F.  
 Vernalis. *Wolf.*  
 Subtilis. *m.*  
 Perlatus. F. (*Cydnus*).  
 Inflexus. *Wolf. (Cydnus).*  
 Intermedius. *Wolf. (Cydnus)*  
 Oleraceus. F.  
 Ornatus. F.  
 Festivus. F.  
 Amoenus. *m.*

SERICORIS. *Fall.*

Marginatus. F. (*Edessa*).  
 Griseus *m. umbrinus. Hahn.*  
 Umbrinus. *Wolf. (Cimex).*

CYDNUS. *autor.*

Morio. F.  
 Bicolor. F.

Albomarginellus. F.  
 Biguttatus. F.  
 Scarabaeoides. F.

ASOPUS. *Burm. Cimex. F.*

Cæruleus. F.  
 Dumosus. F.  
 Custos. F.  
 Bidens. F.

THYREOCORIS. *Schr. Tetyra. F.*

Globus. F.

ODONTOSCELIS. *Lap. Tety-  
 ra. F.*

Fuliginosa. F.  
 Fumosa. *m.*

PODOPS. *Lap. Tetyra. F.*

Inunctus. F.

TRIGONOSOMA. *Burm. Tety-  
 ra. F.*

Nigrolineata. F.  
 Albolineata. F.  
 Flavolineata. F.  
 Prasina. *m.*

## TETYRA F.

Maura. *Hahn.*  
 Picta. *Hahn.*

PACHYCORIS. *Burm. Tetyra. F.*

Grammicus. F.

## ORTHOPTERA.

FORFICULA. *Linn.*

Gigantea. F.  
 Auricularia. F.  
 Elongata. *mihi*.  
 Bipunctata. F.  
 Biguttata. F.  
 Parallela. F.  
 Quadriguttata. *mihi*.  
 Brevis. *mihi*.  
 Minor. L.

BLATTA. *Linn.*

Orientalis. F.  
 Germanica. F.  
 Lapponica. F.

EMPUSA. *Ill.*

Pennicornis. *Pall.*

MANTIS. *Linn.*

Oratoria. F.  
 Religiosa. L.

MANTISPA. *Ill.*

Pagana. F.

GRYLLOTALPA. *Latr.*

Vulgaris. *Latr.*

ACHETA. *Fabr.*

Campestris. L.  
 Domestica. L.  
 Deserta. *Pall.*

LOCUSTA. *Fabr.*

Viridissima. F.  
 Cantans. *mihi*.  
 Verrucivora. F.  
 Glabra. *Ilbst.*  
 Grisea. F.  
 Varia. F.  
 Brevipennis. *Charp.*  
 Nervosa. *mihi*.

PHANEROPTERA. *Serv.*

Lilifolia. F.

XIPHIDION. *Serv.*

Fuscum. F.

TETTIGOPSIS. *Fisch.*

Pedo. *Pall.*

EPHIPPIGER. *Latr.*

Laxmanni. *Pall.*

GRYLLUS. *Fabr.*

Muricatus. *Pall.*  
 Italicus. L.  
 Armatus. *Fisch.*  
 Migratorius. L.  
 Nigrofasciatus. *Latr.*  
 Thalassinus. F.  
 Salinus. *Pall.*  
 Germanicus. *Latr.*  
 Tuberculatus. F.  
 Insubricus. *Scop.*

Stridulus. L.  
 Coeruleans. L.  
 Caerulescens. L.  
 Fuscus. *Pall.*  
 Scalaris. *Fisch.*  
 Elegans. *Philippi.*  
 Cruciatu. *Philippi.*  
 Apricarius. L.

Biguttulus.  
 Viridulus.  
 Pedestris.

### ACRIDIUM. *Fabr.*

Subulatum. F.  
 Bipunctatum. F.

## LIBELLULINAE.

### LIBELLULA.

Depressa.  
 Conspurcata.  
 Quadrimaculata.  
 Fuchsiana. *mihi.*  
 Cancellata.  
 Infuscata. *mihi.*  
 Melanostigma. *mihi.*  
 Pedemontana.  
 Vulgata.  
 Flaveolata.  
 Nigricula. *mihi.*  
 Aenea.  
 Metallica.

Mixta.  
 Affinis.  
 Viridis. *mihi.*  
 Grandis.  
 Rufescens.  
 Forcipata.  
 Cognata. *mihi.*  
 Unguiculata.

### AGRION.

Virgo.  
 Macrostigma. *mihi.*  
 Barbara.  
 Paedisca. *mihi.*  
 Fusca.  
 Platypoda.  
 Pulchella.  
 Puella.  
 Elegans.

### AESHNA.

Formosa.  
 Maculatisma.



# EINIGE WORTE

UEBER DIE

## FAUNA ENTOMOLOGICA TRANSCAUCASICA.

---

Es sey mir gestattet, das entomologische Publikum auf den zweiten Theil meiner transcaucasischen Insecten, welcher gegenwärtig in Moskau unter der Presse ist und im Laufe dieses Jahres erscheinen wird, aufmerksam zu machen.

Der erste Theil ist bekanntlich 1835 in Moskau schon erschienen; er bildet den vierten Band der «*Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*», und enthält unter den Titeln: «*Additamenta Entomologica ad Faunam Rossicam*» etc. und «*Coleoptera Persico-Armeniaca*» die Beschreibungen aller neuen Arten der Pentameren, d. h. *Carabici* 104, *Hydrocanthari* 4, *Brachelytra* 46, *Sternoxi* 40, *Malacodermata* 27, *Teredili* 10, *Clavicornes* 47, *Palpicornes* 2, *Lamellicornes* 64, mit 40 Kupfertafeln, worauf die mehr ausgezeichneten Arten getreu dargestellt sind.

Im zweiten Theile, welcher den fünften Band der neuen Memoiren bilden wird, folgen die Beschreibungen der neuen Arten der Hetromeren, d. h. *Melasomen* 47, *Taxicornes*, 2, *Helopiden* 29, *Tracheliden* 8, *Vesicanten* 47, *Stenelytren* 8; ferner die Tetrameren; d. h. *Curculionen* 79, *Xylophagen* 9, *Longicornen* 42, *Chrysomelinen* 50; endlich die *Trimeren*, *Aphidiphagen* 40. — Die Platten zum zweiten Theile sind in diesem Augenblicke noch nicht alle beendet, doch dürfte deren Zahl leicht jene des ersten Theils überschreiten. Nebst einem kleinen Supplemente folgt sodann eine ergänzende Berichtigung über den erschienenen ersten Theil, und das ganze Werk schliesst mit einem Cataloge. Diesen Catalog, welcher sowohl die sämtlichen neuen, als wie die alten Arten, die auf diesen beiden Kaiserlichen naturforschenden Expeditionen entdeckt worden sind, systematisch aneinander gereiht enthält, habe ich mit aller mir bekannten Synonymie ausgestattet. — Durch diesen allgemeinen Catalog gewinnen beide Theile ein rundes Ansehen, und durch den neuen Titel «*Fauna Entomologica Transcaucasica*», welcher beiden Theilen noch besonders zugefügt werden soll, wird es ein selbstständiges, russisch-entomologisches Werk, welches dann von jedem Entomologen, isolirt von den übrigen Bänden der Memoiren der Gesellschaft, bei Hrn. Voss in Leipzig acquirirt werden kann.

Der Grund, warum ich die beiden Titel des ersten Theils in einen neuen, passendern umschmelze, mag

mir hier erlaubt seyn zu beleuchten. Wir besitzen in Russland bis dato, im Sinne des Wortes, als ein erschienenenes Werk, noch keine umfassende Bearbeitung der *Fauna Entomologica Rossica*, wesshalb man auch noch keine *Additamenta* zu derselben schreiben kann. Will man aber die, zum Theil sehr gehaltvollen, Gesammtschriften entomologischen Inhalts, welche, besonders seit PALLAS Zeiten, von mehreren der ausgezeichnetsten Entomologen Russlands zu verschiedenen Perioden und unter mannigfachen Gestalten im russischen Kaiserreiche erschienen sind, als eine *Fauna Entomologica Rossica* im zerstreuten Zustande betrachten; so muss nothwendigerweise mein Werk in zwei Bänden, das über 600 theils gänzlich neue, theils früher unbeschriebene Arten enthält, und welches nun noch durch den allgemeinen Catalog, der, zusammen mit den schon früher bekannten Arten, welche in jenen Gegenden gleichzeitig aufgefunden wurden, circa 2000 Arten aufzählt, nicht «*Additamenta ad Faunam*», sondern als ein ganz ordentliches *Additamentum* betrachtet werden. Ferner wird durch den Titel «*Coleoptera Persico-Armeniaca*» jener gewissermassen wieder aufgehoben; denn man kommt dadurch ganz natürlich in Versuchung, zu glauben, dass sämtliche *Coleoptera* zur *Fauna Persica*, und nicht etwa zur *Fauna Rossica* gehören. Dem aber ist nicht so, indem nach den letzten politischen Ereignissen die Provinzen, in welchen sämtliche Insecten, sowohl von SCOVITZ, als wie von MÉNÉTRIÉs, entdeckt worden sind, nun

integrirende Theile des russischen Kaiserreichs ausmachen, daher man sie nicht mehr Persisch-Armenien, sondern füglich Russisch-Armenien nennen muss. Da aber die von mir aufgenommenen Insecten nicht allein aus Russisch-Armenien kommen, sondern auch in den affiniten transcaucasischen Ländern, die ebenfalls unter russischem Scepter stehen, von beiden Naturforschern aufgefunden wurden, so erscheint der nunmehrige Titel «*Fauna Entomologica Transcaucasica*» bezeichnender, und verleiht dem Ganzen wieder eine gerade Richtung. Nur so giebt der Titel selbst eine reine Ansicht zu dem ganzen Werke, und dasselbe erhält dadurch einen speciellen Werth für Russland, rücksichtlich der Kunde seiner Naturproductionen. Von diesem Gesichtspunkte aus kann nun mein Werk als ein integrirender Theil der künftigen *Fauna Entomologica Rossica* betrachtet werden.

Möge fürwahr doch der Augenblick nicht mehr fern seyn, wo ein eminenter Entomolog mit weit umfassenden Kenntnissen und gründlich-tiefen Einsichten auftaucht, um uns, mit etwaiger Beihülfe einiger tüchtigen Mitarbeiter, dieses so sehr fühlbar nöthige Werk zu liefern.

F. FALDERMANN, Dr. Phil.

ST. PETERSBURG  
den 1. Januar 1837.

**EXTRAIT**  
DES  
**PROTOCOLES DES SÉANCES**  
DE LA  
**SOCIÉTÉ IMPÉRIALE DES NATURALISTES**  
DE MOSCOU.

*Pendant l'année 1836.*

---

**SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1836.**

Sur la proposition de M. le Président, M. B. ZOUBROFF a été élu 4<sup>er</sup> secrétaire, M. J. SCHYKHOFFSKY 2<sup>o</sup> secrétaire et M. N. BASSALAYEFF, trésorier.

**D O N.**

Le Prince Nicolas Ivanovitch TROUBETZKOÏ fait don de 500 r. ass.

*Ouvrages offerts.*

Addenda ad Zoographiam Rossicam; par l'auteur M. EVERSMAAN de Kasan.

Montrositates Coleopterorum; par l'auteur M. ASSMUS de Dorpat.



*Objets offerts.*

Des échantillons géognostiques du district de Briansk et quelques morceaux de marbre du district de Taroussa; par M. BIKHOVETZ.

Un crâne fossile du *Bos latifrons*; par M. MAKÉROFFSKY.

60 différents minéraux; par M. DOBRONRAVOFF.

406 minéraux de Sitka; par M. le Baron WRANGEL.

*Lectures.*

Notice sur les avantages des micromètres au foyer de l'oculaire dans les microscopes composés, ainsi que sur la manière de les y placer; par M. A. FISCHER.

О прикрѣпленіи сѣмянъ внѣ плодниковъ въ нѣкоторыхъ семействахъ явнوبرачныхъ растеній (sur l'insertion extracarpellaire des graines dans quelques familles des plantes phanérogames); par M. SCHYKHOFFSKY.

M. HEIMANN communique une observation de M. SCHMIDT, Aide-Chimiste de l'Académie médico-chirurgicale de Moscou, sur la propriété que possède la limaille de fer, d'empêcher l'inflammation des gaz interceptés par elle.

*Membres reçus.*

M. G. STCHOUROFFSKY, Prof. de Minéralogie à l'Université Impériale de Moscou.

M. ERICHSON, de Berlin.

M. RATZEBOURG, de Neustadt-Eberswalde.

M. Victor MOTSCHOUFSKY, officier d'Etat-Major, à St. Pétersbourg.

## SÉANCE DU 20 MARS.

*Objets offerts.*

Un crâne fossile du *Bos latifrons*; par M. NOVOM-LINSKY.

Une dent molaire de Mammont; par M. SAVINE.

Les squelettes d'un *Felecanus onocrotalus* et d'un *Phenicopterus ruber*; par M. HONENACKER.

Du pyrites cuivreux avec de l'oxyde d'étain de Finlande; par M. OMÉLIANOFF.

*Lectures.*

Нѣчто о рожденіи, возрожденіи и перерожденіи; par M. LOWETZKY.

О вліаніи философической Анапоміи на спсшему живописнаго царства; par M. STCHOUROFFSKY.

О сходствѣ и существенныхъ опилчіяхъ сѣмянъ лвнобрачныхъ распеній опѣ обыкновенныхъ распительныхъ почекъ; par M. SCHYKHOFFSKY.

## SÉANCE DU 20 AVRIL.

*Ouvrages offerts.*

Mémoires de l'Acad. Impériale des Sciences de St. Pétersbourg. Sciences naturelles. Tom. II. livr. 1.; par l'Académie.

Elémens d'Histoire naturelle; par l'auteur M. SAUCEROTTE de Lunéville.

Tableau des fossiles, par DEFRANCE, trad. en russe, par M. T. FISCHER de St. Pétersbourg.

Considérations sur la théorie électro-chimique; par l'auteur M. EINBRODT.

Замѣчанія на теорію прикрѣпленія сѣмянъ въ плодѣ  
явнобрачныхъ расшеній; par l'auteur M. SCHUKNOFSKY.

Практическія наставленія о собираніи произведе-  
ній царства расшишельнаго, Декадоля; par M.  
SCHUKNOFSKY.

### *Lectures.*

Observations sur les coquilles fossiles du Gouver-  
nement de Moscou; par M. FISCHER DE WALDHEIM.

Procédé microchimique pour reconnaître la pré-  
sence des poisons métalliques; par M. GÖBEL de Dor-  
pat (\*). M. HEIMANN fait plusieurs expériences qu  
en prouvent l'efficacité.

### *Membres élus.*

M. SCHMIDT, Aide-Chimiste à l'Académie Impériale  
médico-chirurgicale de Moscou.

### **SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE.**

### **D O N.**

M. le Comte Alexis Alexéiévitich BOBRINSKY fait don  
de 500 r. ass.

### *Ouvrages offerts.*

Главныя основанія минералогіи и таблицы для опре-  
дѣленія минераловъ посредствомъ простыхъ химиче-  
скихъ опытовъ сухимъ и мокрымъ путемъ; par l'au-  
teur M. STURM, Sous-Lieutenant au corps des Ingé-  
nieurs à St. Pétersbourg.

---

(\*) Ce procédé est inséré dans le T. IX. du Bulletin. p. 375.

Mémoires de l'Acad. Imp. des Sciences de St. Pétersbourg. Sciences mathém. T. III. liv. 3, et Sciences polit. hist. philol. T. IV. liv. 4 ; par l'Académie.

Transactions of the Royal Society of Edinbourg. 9 vol. ; par le Conseil de la Société.

Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino. T. XXXVII. ; par l'Académie.

Annales de la Société entomologique de France, année 1834, 4<sup>e</sup> trimestre, les 4 trimestres de l'année 1835 et le 4<sup>er</sup> trimestre de l'année 1836 ; par la Société.

Nouveau groupe d'Orthoptères de la famille des Mantides ; Rectification de la Nyssia pomonaria ; Description d'un Coléoptère nouveau Leptura Silbermann ; Description d'un Argus Alexis hermaphrodite ; Description d'un Coléoptère nouveau du genre Clerus sous ses divers états ; Lettre à M. Audinet-Serville sur le Canopus obtectus de Fab. ; par l'auteur M. LEFEBVRE, Secrétaire de la Soc. Ent. de France.

Monographie du genre Crabro de la famille des Hyménoptères fouisseurs ; par les auteurs MM. LE PELLETIER DE SAINT-FARCEAU et A. BRULLÉ.

Musci exotici ; par l'auteur M. HOOKER de Glasgow.

Osservazioni geologiche sulla valle di Suza e sul monte Cenisio ; par l'auteur M. A. SISMONDA de Turin.

Recherches pour servir à l'histoire et à l'anatomie des phryganides ; par l'auteur M. J. PICTET de Genève.

Hymeno et gastero-mycetes recensuit J. A. Weinmann, pars prodromi Floræ Rossicæ ; par l'auteur.

Основанія физики ; par l'auteur M. PAVLOFF, Prof. à l'Univ. Imp. de Moscou.

*Objets offerts.*

Des minéraux de la Bohême ; par M. STRUVE, Ministre-Résidant à Hambourg.

445 espèces de plantes recueillies dans les environs de Sarepta ; par M. WUNDERLICH.

Le crâne d'un mammoth ; par M. NAKHIMOFF.

*Correspondance.*

M. FALDERMANN de St. Pétersbourg informe la Société qu'il a eu le bonheur d'offrir à SA MAJESTÉ L'EMPEREUR, par l'entremise de M. le Ministre de l'Instruction publique, la 4<sup>ème</sup> partie de son ouvrage *Coleoptera Persico-Armeniaca*, imprimée dans le T. IV des Nouveaux Mémoires, et que SA MAJESTÉ a daigné lui accorder gracieusement une bague enrichie de diamans.

*Membres élus.*

M. SAUCEROTTE à Lunéville.

M. J. PICTET à Genève.

M. ROBISON à Edimbourg.

M. WEINMANN à Pawlowsk.

**SÉANCE DU 20 OCTOBRE.****DON.**

M. le Comte Dmitri Nicolaiévitch CHÉRÉMÉTEFF fait don de 4000 r. ass.

*Ouvrages offerts.*

Mémoires de l'Acad. Imp. des Sciences de St. Pétersbourg, Mémoires des savants étrangers. T. III.



liv. 4, 2; Sciences naturelles T. II. liv. 2; Recueil des actes de la séance publique tenue le 29 Décembre 1835; par l'Académie.

Annales de la Société entomologique de France, 2<sup>ème</sup> trimestre de l'année 1836; par la Société.

Бзглядъ на лѣсоводство и садоводство въ Херсонской Губерніи; par l'auteur M. KIRIAKOFF d'Odessa.

### *Objets offerts.*

Une collection de graines de 326 espèces de plantes; par M. FRÉSÉNIUS, Directeur du jardin botanique à Francfort.

### *Lectures.*

Объ изверженіяхъ грязей изъ горы Мокалуби подлѣ Джирженчи въ Сициліи; par M. TCHERTKOFF.

M. FISCHER DE WALDHEIM appelle l'attention de la Société sur un poisson fossile rapporté du Négrepont et qui doit constituer un nouveau genre qu'il appelle *Allocotus*.

La Société adopte un nouveau plan pour la publication de son Bulletin. Dès l'année 1837, il paraîtra par numéros, à des époques indéterminées. Le nombre des numéros publiés dans le courant de l'année, dépendra uniquement de l'activité des membres. Cette amélioration était indispensable pour fournir à nos savants le moyen de faire connaître promptement leurs découvertes et pour leur en assurer la priorité. Les Académies, les Sociétés scientifiques et tous les membres régnicoles et étrangers le recevront gratis.

*Membres élus.*

M. M. KIRIAKOFF, Propriétaire dans le district d'Odessa.

**SÉANCE DU 19 NOVEMBRE.***Ouvrages offerts.*

Nova Acta Academiæ Cæsareæ Leopoldino-Carolinæ. T. XVII. pars 2; par l'Académie.

Handboek der Dierkunde; Dissertatio de sceleto piscium; Oratio de diligenti veritatis studio præcipua naturæ interpretis dote; par l'auteur M. VAN DER HÖVEN d'Amsterdam.

Clavis novi Hymenopterorum systematis etc.; Pro-dromus Hymenopterologiæ Scandinaviæ; par l'auteur M. DALBOM de Lund.

Mémoire sur la famille des Anonacées et notices sur les plantes rares cultivées dans le jardin de Genève; par les auteurs MM. A. P. et Alph. DE CANDOLLE.

Recherches sur les ossemens fossiles de la Russie; 4<sup>er</sup> cahier; par l'auteur M. FISCHER DE WALDHEIM.

Neuer Nachtrag von Beschreibungen und Abbildungen neuer Fische, et Neue Wirbelthiere von Rüppel. IV, V et VI livr.; par M. FISCHER DE WALDHEIM.

Histoire naturelle des Lépidoptères de France, par Godart et Duponchel. 436 liv.; par M. RANTZEFF.

Медико - топографическое описаніе княжесства Молдавіи и Валахіи; par l'auteur M. DOBRONRAVOFF.

Химическія уравненія; par l'auteur M. JOFSKY, Prof. à l'Univ. de Moscou.

*Objets offerts.*

Collection de plantes recueillies en Moldavie et en Valachie ; par M. DOBRONRAVOFF.

*Lectures.*

Observations sur les coquilles des céphalopodes ; par M. FISCHER DE WALDHEIM.

Idées philosophiques sur la nature ; par M. le Général ORLOFF.

Observations sur la peste ; par M. DOBRONRAVOFF.

Observations sur l'eau du Volga ; par M. VOZDVIGENSKY, Prof. d'hist. naturelle au Lycée - Démidoff à Iaroslaff.

**SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE.***Ouvrages offerts.*

Sylloge plantarum Floræ Napolitanæ hucusque detectarum ; Essai sur la géographie physique et botanique du royaume de Naples ; par l'auteur M. TENORE de Naples.

Annals of the Lyceum of natural history of New-York, April 1836 ; Report on the Geology, Mineralogy, Botany and Zoology of Massachusetts by E. Hitchcock ; par M. CRAMER de New-York.

*Objets offerts.*

340 espèces de plantes, recueillies en Sibérie ; par M. STCHOUKINE d'Irkoutsk.

300 plantes recueillies dans le gouvernement de Moscou ; par M. HENNING.

*Lectures.*

Notice sur les Mélasomes; par M. FISCHER DE  
WALDHEIM.

*Membres élus.*

M. VON DER HÖVEN d'Amsterdam.

M. DAHLBOM de Lund.

---

La Société a fait paraître dans le courant de l'année 1836 le T. IV des Nouveaux Mémoires, le T. IX du Bulletin et 42 feuilles de l'Oryctographie du gouvernement de Moscou, par M. FISCHER DE WALDHEIM. L'impression de ce dernier ouvrage avait commencé en 1832, et avait été suspendue à la fin de la même année. Elle a été reprise au mois de Janvier 1836.

---

**ETAT**

DE LA RECETTE ET DE LA DÉPENSE PENDANT L'ANNÉE 1836.

**RECETTE.**

|                                               | Roubl. c. |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Reste de la dépense de l'année 1835 . . .     | 773 70    |
| Reçu du Bureau de finances. . . . .           | 40000 —   |
| Envoyé par plusieurs membres pour diplôm. . . | 425 —     |
| Donné par M. le Comte CHÉRÉMÉTEFF. . .        | 4000 —    |
| » par M. le Comte BOBRINSKY . . . .           | 500 —     |
| » par M. le Prince TROUBETZKOÏ . . .          | 500 —     |
| Produit de la cotisation. . . . .             | 4920 —    |

---

Total 44818 70

## D É P E N S E.

R

Roubl. C.

|                                                                                                                                                                                                               |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Frais d'impression du T. IV des nouveaux<br>Mémoires, du T. IX du Bulletin et de<br>42 feuilles de l'Oryctographie du Gouv.<br>de Moscou, papier, gravure et enluminure<br>des planches, reliure etc. . . . . | 2943 | 22    |
| Appoint. du dessinateur, de l'empailleur, du<br>teneur de livres et du copiste (les deux<br>derniers emplois ont été supprimés au<br>mois de Mars). . . . .                                                   | 1875 | —     |
| Suites de plusieurs ouvrages donnés par<br>M. BEKLÉMISCHEFF et reliure des journaux                                                                                                                           | 355  | 62    |
| Frais de Chancellerie, impression des circu-<br>laires, ports de lettres à l'étranger et me-<br>nues dépenses . . . . .                                                                                       | 593  | 44    |
| Donné à M. ABOVIAN, en Arménie, pour les<br>frais d'expédition des objets qu'il aura re-<br>cueillis . . . . .                                                                                                | 250  | —     |
| Armoires pour la bibliothèque . . . . .                                                                                                                                                                       | 4000 | —     |
| Un boa constrictor acheté en 1835 . . . .                                                                                                                                                                     | 175  | —     |
|                                                                                                                                                                                                               |      | <hr/> |
| Total                                                                                                                                                                                                         | 7492 | 28    |
| Reste pour l'année 1837                                                                                                                                                                                       | 7626 | 42    |





## NOUVELLES DIVERSES.

M. FALDERMANN de St. Pétersbourg a achevé la 2<sup>e</sup> partie de son ouvrage *Coleoptera Persico-Armeniaca*. Elle est en ce moment sous presse et formera le Tom. V des Nouveaux Mémoires de la Société. D'après le désir de M. FALDERMANN, son ouvrage aura pour titre: *Fauna Entomologica Trans-Caucasica*. Un titre semblable sera distribué gratis aux personnes qui possèdent la 4<sup>ème</sup> partie insérée dans le Tom. IV des Nouveaux Mémoires.

M. J. SCHYKHOFKY fait imprimer une traduction russe de l'ouvrage de M. Alph. DE CANDOLLE intitulé: *Introduction à l'étude de la Botanique*, et se propose d'y joindre ses propres notes.

---

# INDEX

## SPECIERUM PLANTARUM,

CIRCA

### URBEM IRCUTIAM, IN DAURIA

ET

### AD LACUM BAIKAL IN SIBIRIA LECTARUM,

QUAS SOCIETAS CÆSAREA NATURÆ SCRUTATORUM MOSQUENSIS  
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT (\*).

---

#### 1. RANCUNULACEÆ.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Clematis angustifolia Jacq.<br/>petalis incis, bilobis.</p> <p>2. Thalictrum aquilegiæfolium<br/>L.</p> <p>3. — — — petaloidum L.</p> <p>4. — — — galioides Nestl.</p> <p>5. — — — fœtidum L.</p> <p>6. — — — simplex L.</p> <p>7. Anemone patens L. β. ochro-<br/>leuca Fisch. DC.</p> <p>8. — — — reflexa Steph.</p> <p>9. — — — dichotoma L.</p> <p>10. — — — Pulsatilla L. δ. da-<br/>hurica DC.</p> <p>11. — — — narcissiflora L.</p> <p>12. Ranunculus pulchellus C.<br/>A. M.</p> <p>13. — — — salsuginosus<br/>Pall.</p> | <p>14. — — — amœnus Ledeb.</p> <p>15. — — — radicans C. A.<br/>Mey.</p> <p>16. — — — Cymbalariae DC.</p> <p>17. Aquilegia glandulosa Fisch.</p> <p>18. — — — sibirica Lam.</p> <p>19. Isopyrum grandiflorum<br/>Turcz.</p> <p>20. — — — fumarioides L.</p> <p>21. Delphinium grandiflorum L.</p> <p>22. — — — glabellum Turcz.</p> <p>23. Aconitum barbarum Patr.</p> <p>24. — — — volubile Pall.</p> <p>25. Cimicifuga fœtida L.</p> <p>26. Paeonia anomala L.</p> <p>27. — — — albiflora Pall.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 2. MENISPERMEÆ.

28. Menispermum dahuricum  
DC.

---

(\*) Pro quibus plantis non aliæ magis quam eæ, quæ extra euro-  
pæ fines crescunt, desiderantur.

3. **BERBERIDÆ.**

- 29.
- Berberis sibirica*
- Pall.

4. **NYMPHÆACEÆ.**

- 30.
- Nymphaea pygmaea*
- Ait.

5. **PAPAVERACEÆ.**

- 31.
- Papaver nudicaule*
- L.

- 32.
- Hypecoum erectum*
- L.

6. **FUMARIACEÆ.**

- 33.
- Corydalis gebleri*
- Ledeb.

34. — — —
- sibirica*
- Perf.

35. — — —
- impatiens*
- Fisch.

7. **CRUCIFERÆ.**

- 36.
- Barbarea arcuata*
- Andr.

- 37.
- Cardamine macrophylla*
- W.

38. — — —
- tenuifolia*
- Turcz.

39. — — —
- pratensis*
- L.

- 40.
- Alyssum altaicum*
- C. A. Mey.

41. — — —
- tenuifolium*
- Steph.

42. — — —
- obovatum*
- Turcz.

- 43.
- Hesperis aprica*
- Poir.

- 44.
- Arabis incarnata*
- Pall.

- 45.
- Andreowskia integrifolia*
- DC.

- 46.
- Draba contorta*
- Ehrh.

47. — — —
- repens*
- M. B.

- 48.
- Thlaspi cochleariforme*
- DC.

- 49.
- Andreowskia pectinata*
- DC.

- 50.
- Erysimum andrzejewskianum*
- Bess.

51. — — —
- virgatum*
- Roth.

- 52.
- Lepidium latifolium*
- L.

- 53.
- Camelina microcarpa*
- Andr.

- 54.
- Isatis oblongata*
- Stev.

8. **VIOLARIÆ.**

- 55.
- Viola biflora*
- L.

56. — — —
- ircutiana*
- Turcz.

57. — — —
- dactyloides*
- R. et Sch.

58. — — —
- Patrinii*
- DC.

59. — — —
- gmeliniana*
- R. et Sch.

60. — — —
- uniflora*
- L.

9. **POLYGALÆ.**

- 61.
- Polygala comosa*
- Schkuhr.

62. — — —
- tenuifolia*
- W.

63. — — —
- sibirica*
- L.

10. **CARYOPHYLLACEÆ.**

- 64.
- Dianthus versicolor*
- Fisch.

65. — — —
- superbus*
- L. b.
- rubicundus*
- .

- 66.
- Gypsophila gmelini*
- Bge.

- 67.
- Silene tenuis*
- W. b.
- setifolia*
- .

68. — — —
- repens*
- Patr.

69. — — —
- chamarensis*
- Turcz.

70. — — —
- aprica*
- Turcz.

- 71.
- Lychnis sibirica*
- L.

72. — — —
- dioica*
- L.

73. — — —
- apetala*
- L.

- 74.
- Cerastium maximum*
- L.

75. — — —
- pilosum*
- Ledeb.

76. — — —
- dahuricum*
- Fisch.

77. — — —
- incanum*
- Led.

- 78.
- Krascheninnikowia rupestris*
- Turcz.

11. **LINEÆ.**

- 79.
- Linum sibiricum*
- Dc.

12. **MALVACEÆ.**

- 80.
- Malva verticillata*
- L.

13. **HYPERICINÆ.**

- 81.
- Hypericum Ascyron*
- L.

82. — — —
- attenuatum*
- Fisch.

14. **GERANIACEÆ.**

- 83.
- Geranium wlassowianum*
- Fisch.

84. — — — albiflorum L.  
85. — — — biflorum Patr.

### 15. **RUTACEÆ.**

86. *Ruta dahurica* Pall. e  
Nertschinsk.

### 16. **LEGUMINOSÆ.**

87. *Melilotus suaveolens* Ledeb.  
88. *Trifolium Lupinaster* L.  
89. *Thermopsis lanceolata* R.  
Br.  
90. *Trigonella ruthenica* L.  
91. *Caragana Altagana* Poir.  
92. *Caragana microphylla* DC.  
93. — — — *pygmæa* DC.  
94. — — — *Spinosa* DC.  
95. — — — *jubata* Poir.  
96. *Phaca oroboides* DC.  
97. — — — *alpina* Jacq.  
98. — — — *astragalina* DC.  
99. *Oxytropis deflexa* DC.  
100. — — — *myriophylla* DC.  
101. — — — *Uralensis* DC.  
102. — — — *lanata* DC.  
103. — — — *oxyphylla* DC.  
104. — — — *glabra* DC.  
105. — — — *cespitosa* Pers.  
106. — — — *sylvatica* DC.  
107. — — — *coerulea* DC.  
108. *Astragalus melilotoides* Pall.  
109. *Astragalus lupulinus* Pall.  
110. — — — *prostratus* Fisch.  
111. — — — *fruticosus* Pall.  
112. — — — *dahuricus* DC.  
113. — — — *adscendens* Pall.  
114. — — — *versicolor* Pall.  
115. — — — *galactites* Pall.  
116. — — — *laguroides* Pall.  
117. *Güldenstædtia pauciflora*  
Fisch.  
118. *Onobrychis Carpathica* DC.  
111. *Hedysarum inundatum*  
Turcz.  
120. — — — *elongatum* Fisch.

121. *Lespedeza juncea* Pers.  
122. *Vicia tenuifolia* L.  
123. — — — *multicaulis* Ledeb.  
124. *Orobis venosus* W. var  
*latifolius*.  
125. — — — *lathyroides* L.  
126. *Lathyrus humilis* Fisch.

### 17. **ROSACEÆ.**

127. *Armeniaca sibirica* Pers.  
128. *Spiraea sorbifolia* Lin.  
129. *Potentilla pensylvanica* L.  
130. — — — *fragarioides* L.  
131. *Chamærhodos erecta* Bge.  
132. *Spiraea flexuosa* Fisch.  
133. — — — *thalictroides* Pall.  
134. — — — *Salicifolia* L.  
135. — — — *Ulmaria* L.  
136. *Agrimonia pilosa* Ledeb.  
137. *Rosa dahurica* Pall.  
138. — — — *alpina* Lin.  
139. *Cratægus sanguinea* Pall.  
140. *Cotoneaster vulgaris* Lindl.  
141. *Pyrus baccata* L.  
142. *Sibbaldia procumbens* Lin.

### 18. **ONAGRARIÆ.**

143. *Epilolium latifolium* L. V.  
*humile* W.

### 19. **TAMARISCINÆ.**

144. *Myricaria longifolia* DC.  
145. — — — *dahurica* DC.

### 20. **CRASSULACEÆ.**

146. *Umbilicus spinosus* DC.  
147. — — — *malacophyllus* DC.  
148. *Sedum Rhodiola* DC.

### 21. **GROSSULARIÆ.**

149. *Ribes Diaacantha* L.  
150. — — — *triste* Pall.

151. — *atropurpureum*. C.A.M.**22. SAXIFRAGACEÆ.**

152. *Saxifraga sibirica* L.  
 153. — — — *crassifolia* L.  
 154. — — — *stellaris* L.  
 155. — — — *Melaleuca* Fisch.  
 156. — — — *hirsuta* L.  
 157. — — — *bronchialis* L.

**23. UMBELLIFERÆ.**

158. *Schultzia crinita* Spreng.  
 159. *Bupleurum triradiatum*  
 Adams.  
 160. — — — *multinerve* DC.  
 160. — — — *scorzoneræfoium*  
 Willd.  
 162. *Peucedanum baicalense* Koch.  
 163. — — — — *condensatum*  
 Turcz. *Athamanta*.  
 164. — — — — *humile* Turcz.  
 165. *Pleurospermum uralense*  
 Hoffm. (*Ligust. Helm.*)  
 166. *Falcaria dahurica* DC. *Cri-*  
*taurus dahuricus* Hoffm.  
 167. *Stenocodium divaricatum*.  
 168. *Phloiodicarpus dahuricus*  
 Turcz.

**24. RUBIACEÆ.**

169. *Rubia cordifolia* L.

**25. VALERIANEÆ.**

170. *Patrinia sibirica* Juss.  
 171. — — — *rupestris* Juss.  
 172. — — — *scabiosæfolia* Juss.  
 173. *Valeriana officinalis* L.  
 174. — — — *heterophylla*.

**26. DIPSACEÆ.**

175. *Scabiosa ochroleuca* Lin.  
 176. — — — *Dahurica* Pall.  
 Fisch. DC.

**27. SYNANTHEREÆ.**

177. *Cirsium serratuloides* Scop.  
 178. — — — *acaule* All.  
 179. — — — *helenioides* Lin.  
 180. *Saussurea elongata* DC.  
 181. — — — *salicifolia* DC.  
 182. — — — *pulchella* Fisch.  
 183. — — — *parvillora* DC.  
 184. — — — *glomerata* Poir.  
 185. *Leucea carthamoides* DC.  
 186. *Serratula centauroides* DC.  
 187. *Rhaponticum uniflorum* DC.  
 188. *Cacalia hastata* Lin.  
 189. *Echinops dahuricus* Fisch.  
 190. *Tussilago saxatilis*.  
 191. *Gnaphalium Leontopodioides* W.  
 192. *Tanacetum sibiricum* L.  
 193. *Artemisia desertorum* Spr.  
 194. — — — *Redowskii* Ledeb.  
 195. — — — *Sacrorum* Ledeb.  
 196. — — — *palustris* Lin.  
 197. — — — *pectinata* L.  
 198. — — — *Sieversiana* Ehrh.  
 199. *Absinthium sericeum*.  
 200. *Anandria dimorpha* Turcz.  
*Leibnitzia anandra*.  
 201. *Erigeron armeriæfolius*  
 Turcz.  
 202. *Aster alpinus* Lin.  
 203. — — — *altaicus* W.  
 204. — — — *Tripolium* L.  
 205. — — — *Hauptii* Fisch.  
 206. — — — *Intermedius* Turcz.  
 207. — — — *conspicuus* Fisch.  
 208. *Cineraria lyrata* Ledeb.  
 209. — — — — *sibirica* L.  
 210. — — — — *ambracca* Fisch.  
 (*Senecio.*)  
 211. — — — *atropurpurea*  
 Ledeb.  
 212. — — — *aurantiaca*. Hoppe.  
 213. *Senecio dahuricus* Fisch.  
 214. *Arnica altaica*.



215. *Chrysanthemum sibiricum* Fisch.  
 216. *Leucanthemum ircutianum* DC.  
 217. *Pyrethrum pectinatum* Fisch.  
 218. *Achillea impatiens* L.  
 219. — — *setacea* Kit.  
 220. *Crepis sibirica* L.  
 221. — — *rigida* Kit.  
 222. — — *tenuifolia* W.  
 223. — — *Pallasii* Turcz.  
 224. *Leontodon collinus* Tutcz.

### 28. CAMPANULACEÆ.

225. *Campanula Infundibulum* Vest.  
 226. — — — *pilosa* Pall.  
 227. *Adenophora denticulata* Fisch.  
 228. — — — *marsupiflora* Fisch.  
 229. — — — *latifolia* Fisch.

### 29. ERICACEÆ.

230. *Rhododendron dahuricum* L.  
 231. — — — *palustre*.  
 232. — — — *chrysanthum* L.  
 233. *Menziesia coerulea* L.

### 30. PRIMULACEÆ.

234. *Primula exaltata* Lehm.  
 235. — — — *sibirica* Jacq.  
 236. *Androsace lactiflora* Fisch.  
 237. — — — *filiformis* Retz.  
 238. *Cortusa Matthioli* L.  
 239. *Lysimachia dahurica* Ledeb.

### 31. ASCLEPIADEÆ.

240. *Cynanchum roseum* R. Br.  
 241. — — — *sibiricum* R.Br.

### 32. GENTIANEÆ.

242. *Gentiana algida* Pall.  
 243. — — — *triflora* Pall.

244. — — — *rotata* Fröhl.  
 245. — — — *adscendens* Pall.  
 246. — — — *humilis* Stev.  
 247. — — — *aquatica* Pall.  
 248. — — — *barbata* Frölich.  
 249. — — — *altaica* Pall.  
 250. — — — *macrophylla* Pall.  
 251. — — — *squarrosa* Ledeb.  
 252. *Swertia dichotoma* L.  
 253. *Halenia sibirica*.

(*Swertia corniculata* Humb.)

### 33. CONVOLVULACEÆ

254. *Convolvulus Ammanii* Desf.  
 255. — — — *pellitus*, Ledeb.  
 256. — — — *arvensis* L.  
 var.

### 34. POLEMONIACEÆ.

257. *Phlox sibirica* L.

### 35. BORRAGINEÆ. S. ASPERIFOLIEÆ.

258. *Myosotis alpestris* Lin.  
 259. — — — *obovata* Ledeb.  
 260. *Cynoglossum divaricatum* Ledeb.  
 261. *Pulmonaria mollis* Wulf.  
 262. *Lithospermum stylosum* Fisch.

### 36. LABIATÆ.

263. *Aniethystea cœrulea* L.  
 264. *Elsholtzia cristata* W.  
 265. *Lophanthus chinensis* Benth.  
 266. — — — *multifidus* (Nepeta Lin.)  
 267. *Leonurus tataricus* L.  
 268. — — — *sibiricus* L.  
 269. *Panzeria lanata* Mönch. (*Bal-lota* L.)

270. *Dracocephalum altaianse* Laxm.

271. — — — — *Moldavica* L.

272. — — — — *nutans* L.

273. — — — — *fragile* Turcz.

274. *Lagopsis viridis*. Bunge.

275. *Scutellaria minor* L.

276. — — — *grandiflora* Sims.

277. — — — *scordifolia* Fisch.

### 37. SOLANÆÆ.

278. *Solanum persicum* W.

### 38. PERSONATÆÆ.

279. *Linaria buriatica* Turcz.

280. *Cymbaria davurica* L.

281. *Scrophularia incisa* Weinm.

282. *Castilleja pallida* Spreng.

283. *Pedicularis uncinata* Spreng.

284. — — — *compacta* Stepl.

285. — — — *Lapponica* L.

286. — — — *resupinata* L.

287. — — — *striata* Pall.

288. — — — *rubens* W.

289. — — — *comosa* L.

290. — — — *verticillata* L.

291. — — — *versicolor* Wahlb.

292. — — — *euphrasioides* Steph.

293. — — — *Wlassowiana* Stev.

294. *Veronica sibirica* Lin.

### 39. PLUMBAGINÆÆ.

295. *Statice aurea* L.

296. — — *flexuosa* L.

297. — — *speciosa* L.

### 40. PLANTAGINÆÆ.

298. *Plantago exaltata* L.

### 41. CHENOPODIACEÆÆ.

299. *Salicornia herbacea* L.

300. *Schoberia corniculata* C. A. Mey.

301. *Corispermum hyssopifolium* L.

302. *Chenopodium aristatum* L.

### 42. POLYGONÆÆ.

303. *Rumex Gmelini* Turcz.

304. *Polygonum sericeum* Pall.

305. — — — *sagittatum* L.

306. — — — *undulatum* Murr.

307. — — — *acidulum* W.

308. — — — *hastatum* Murr.

309. — — — *Laxmanni* Lep.

### 45. EUPHORBIACEÆÆ.

310. *Euphorbia alpina* C.A.Mey. var. *pilosa*.

311. — — — *verticillata* Pall.

312. — — — *Pallasii* Turcz.

### 44. THYMELEÆÆ.

313. *Passerina stelleri* Wikstr.

### 45. SANTALACEÆÆ.

314. *Thesium repens* Ledeb.

### 46. URTICEÆÆ.

315. *Urtica cannabina* L.

### 46. AMENTACEÆÆ.

316. *Salix prunifolia* Smith.

### 48. ORCHIDÆÆÆ.

317. *Spiranthes amæna* M. B.

318. *Cypripedium mearanthon* Sw.

319. — — — *guttatum* Sw.

49. **IRIDEÆ.**

320. *Iris sibirica* W.  
 321. — *dichotoma* Pall.  
 322. — *ruthenica* Ait.  
 323. — *Laevigata* Turcz.

50. **SMILACINEÆ.**

324. *Asparagus dahuricus* Fisch.  
 325. *Paris obovata* Ledeb.

51. **LILIACEÆ.**

326. *Lilium spectabile* L.  
 327. — — *tenuifolium* Fisch.  
 328. *Allium odorum* L.

329. — — *tenuissimum* W.  
 330. — — *lineare* Lin.  
 331. *Heimerocallis flava* L.  
 332. *Imperialis Dagana* Turcz.  
 333. *Gagea pauciflora* Turcz.

52. **COLCHICACEÆ.**

334. *Melanthium sibiricum* L.

53. **CYPERACEÆ.**

335. *Carex vesicaria* L.  
 336. — — *atrata* L.  
 337. — — *asperula* Turcz.  
 338. — — *Tabernemontani*  
 Gmel.

## ERRATA

DU TOM. IX DU BULLETIN.

Page 235 lig. 7 laterallbus — *lisez*: lateralibus.

— 238 — 1 Libellula Melanostigma — *ajoutez*: Tab. I. fig. 3.

— 238 — 1 antepenultima eorum — *ajoutez*: latitudo.

— 244 — 6 alarum — *ajoutez*: livido.

Tab. I. fig. 3 au lieu de Libellula cognata — *lisez*: L. Melano-  
stigma.





BULLETIN

DE LA



Société Impériale

DES NATURALISTES

de Moscou.



---

ANNÉE 1837.

---

N° II.

Moscou,

DE L'IMPRIMERIE D'AUGUSTE SEMEN,  
IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE MÉDICO-CHIRURGICALE

~~~~~  
1837.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,
съ тѣмъ, чтобы по оппечатаііи предсшавлены были въ Ценсур-
ный Комитетъ три экземпляра. Москва, Февраля 5 дня, 1837 года.

Ценсоръ и Кавалеръ *М. Снегиревъ*.

MÉMOIRE
SUR
QUELQUES GENRES ET ESPÈCES
DE
CARABIQVES,
PAR
M. le Comte MANNERHEIM.

Depuis que les coléoptères carnassiers ont été placés à la tête de cet ordre dans le système généralement adopté par les entomologistes de notre siècle, la famille des Carabiques l'a emporté de beaucoup en intérêt sur les autres familles, et est devenue l'objet particulier de l'attention des savans qui ont publié des ouvrages entomographiques. Après la publication du *Species* de M. le Comte Dejean, dont les cinq volumes qui ont paru jusqu'à présent renferment une monographie, la plus complète qui existe, sur les Carabiques, l'on croirait peut-être qu'il est très difficile de contribuer à l'augmentation d'une telle monographie; mais les

ouvrages récents de MM. Klug, de Laporte, Comte de Castelnau, Faldermann, Ménétériés, Gory, Buquet et autres entomologistes, prouvent le contraire, en nous faisant connaître un grand nombre d'espèces qui n'ont pas été mentionnées par le noble Pair de France.

La manière de récolter les insectes ayant été de plus en plus perfectionnée et employée par les voyageurs qui, maintenant, exploitent, en fait de productions entomologiques, les pays les plus divers du monde, procure à nos musées, presque tous les jours, des nouveautés. — Il devient de plus en plus difficile de se tenir au courant des progrès rapides de la science; et ayant terminé la classification des Carabiques, on se trouve tellement encombré d'espèces inédites des familles suivantes, qu'on ne pourra bientôt plus s'y retrouver, qu'à l'aide de monographies assez complètes sur ces familles. — Plusieurs entomologistes se sont empressés de remédier à cet inconvénient, mais tous leurs efforts n'ont cependant pas suffi, et ils laissent encore beaucoup de lacunes à remplir. Parmi ces auteurs on peut sans contredit placer M. SCHÖNHERR au premier rang, et son ouvrage sur les Curculionites est certes, non seulement le plus complet, pour le contenu, mais encore le mieux soigné pour la partie descriptive, de toutes les monographies entomologiques que je connaisse. — J'ai cru de mon devoir de contribuer, autant que je pouvais, au perfectionnement de cette publication, si utile à la science, en cédant à M. SCHÖNHERR tous

MÉMOIRE
SUR
QUELQUES GENRES ET ESPÈCES
DE
CARABQUES,
PAR
M. le Comte MANNERHEIM.

Depuis que les coléoptères carnassiers ont été placés à la tête de cet ordre dans le système généralement adopté par les entomologistes de notre siècle, la famille des Carabiques l'a emporté de beaucoup en intérêt sur les autres familles, et est devenue l'objet particulier de l'attention des savans qui ont publié des ouvrages entomographiques. Après la publication du *Species* de M. le Comte Dejean, dont les cinq volumes qui ont paru jusqu'à présent renferment une monographie, la plus complète qui existe, sur les Carabiques, l'on croirait peut-être qu'il est très difficile de contribuer à l'augmentation d'une telle monographie; mais les

ouvrages récents de MM. Klug, de Laporte, Comte de Castelneau, Faldermann, Ménétrés, Gory, Buquet et autres entomologistes, prouvent le contraire, en nous faisant connaître un grand nombre d'espèces qui n'ont pas été mentionnées par le noble Pair de France.

La manière de récolter les insectes ayant été de plus en plus perfectionnée et employée par les voyageurs qui, maintenant, exploitent, en fait de productions entomologiques, les pays les plus divers du monde, procure à nos musées, presque tous les jours, des nouveautés. — Il devient de plus en plus difficile de se tenir au courant des progrès rapides de la science; et ayant terminé la classification des Carabiques, on se trouve tellement encombré d'espèces inédites des familles suivantes, qu'on ne pourra bientôt plus s'y retrouver, qu'à l'aide de monographies assez complètes sur ces familles. — Plusieurs entomologistes se sont empressés de remédier à cet inconvénient, mais tous leurs efforts n'ont cependant pas suffi, et ils laissent encore beaucoup de lacunes à remplir. Parmi ces auteurs on peut sans contredit placer M. SCHÖNHERR au premier rang, et son ouvrage sur les Curculionites est certes, non seulement le plus complet, pour le contenu, mais encore le mieux soigné pour la partie descriptive, de toutes les monographies entomologiques que je connaisse. — J'ai cru de mon devoir de contribuer, autant que je pouvais, au perfectionnement de cette publication, si utile à la science, en cédant à M. SCHÖNHERR tous

les Curculionites de ma collection qu'il ne possédait pas. Par une noble générosité, dont je garderai toujours le souvenir, ce célèbre naturaliste vient de me sacrifier tous les Carabiques que renfermait sa riche collection et qui manquaient dans la mienne. J'ai d'abord trouvé parmi ces insectes un Cicindéléte d'une conformation trop particulière pour être placé dans aucun des genres connus jusqu'à présent. J'ai donc été obligé d'en former un nouveau, et comme j'ai supposé qu'il serait assez intéressant pour les entomologistes de connaître, dans la tribu des Cicindélètes, un nouveau genre qu'on ne découvre pas tous les jours, j'ai conçu l'idée d'en publier la description; et pour ne pas borner ma publication à un seul insecte, je me suis proposé de livrer en même temps au public la description de toutes les nouvelles espèces de Carabiques qui se trouvent dans ma collection, laquelle, pour ce qui concerne cette famille, est, à ce que je crois, la plus riche en Russie. J'offre maintenant à cette illustre Société, qui m'a fait l'honneur de m'agréger au nombre de ses membres, mes nouveautés dans les tribus de Cicindélètes et de Troncatipennes, ainsi que quelques observations sur des insectes déjà connus de ces tribus; observations que j'ai crues être d'un intérêt particulier. Je me recommande à l'indulgence des personnes qui sont à même de juger la valeur de ce petit traité, et s'il trouve un accueil favorable, je ne manquerai pas d'en présenter la suite aussitôt que les occupations nombreuses de ma place, au service de l'Etat, me permettront de cul-

tiver l'entomologie avec un peu plus de loisir que je n'ai pu le faire pendant les années qui viennent de s'écouler.

MEGACEPHALA INFUSCATA (*).

Viridi-cuprea, nitida, ore, antennis, ano, pedibus maculaque elytrorum apicali communi lunata flavis, elytris apicem usque crebre punctatis, dorso nigro-violaceis.

Habitat in insula Porto-Rico. D. MORITZ.

Longit. 7 lin. Latit. $2\frac{1}{2}$ lin.

Elle ressemble beaucoup pour la forme et la grandeur à la *M. Carolina*. La tête paraît plus large entre les yeux et les stries le long des yeux sont beaucoup plus nombreuses et plus fortement marquées. Le corselet est un peu plus convexe et les élytres sont très-fortement ponctuées et presque rugueuses jusqu'à l'extrémité; elles sont d'un noir bleuâtre avec une bordure assez large d'un vert brillant qui n'atteint pas l'extrémité et qui, à la base, se prolonge un peu sur la suture; mais la marge latérale elle-même est d'un beau bleu. La tache qui termine chaque élytre est presque de la forme de celle de la *Carolina*, seulement un peu plus large, moins en forme de virgule, et les deux taches sont

(*) Ne voulant pas répéter à presque toutes les espèces les mots de *mihi* ou de *nobis*, je prévien mes lecteurs que les noms sans cette indication sont tous donnés par moi.

plus distinctement séparées à l'extrémité. Le milieu de l'abdomen est noir ; l'anوس et les bords latéraux des derniers anneaux de l'abdomen sont plus largement testacés et d'une couleur plus pâle que dans la *Carolina*.

IRESIA BESCKII.

Supra viridi-cyanea, violaceo-micans, subtus viridis, ano nigro-piceo, femoribus rufis, tibiis tarsisque nigris, elytris transversim valde rugatis.

Habitat in Brasilia interiore. D. BESCKE.

Longit. $4\frac{1}{2}$ lin. Latit. $1\frac{1}{2}$ lin.

Caput utrinque profunde canaliculatum, canaliculis inter se in medio approximatis, antice callo elevato rotundato et collari nonnihil intumido, viride, ad oculos utrinque cyaneo-violaceum ; oculi maximi, globosi, prominuli ; labrum magnum, semi-ovatum, nigrum, apice pallidum ; palpi elongati nigri, basi testacei ; antennæ capite cum thorace longiores, tenues, nigræ, articulo primo subtus testaceo. — Thorax capite multo angustior, cylindricus, latitudine paullo longior, basi apiceque impressione transversa profunda valde constrictus, dorso globosus, medio tenue canaliculatus, viridis, marginibus et in medio longitudinaliter cyaneo-violaceus. — Scutellum triangulare, cyaneum. — Elytra thorace quadruplo longiora et ejus basi duplo latiora, cylindrica, postice oblique angustata, apice ipso truncata, interior utrinque denticulo armata, supra convexa, transversim,

præsertim in medio, profunde rugosa, rugis irregularibus intricatis, viridi-cyanea, basi, lateribus, apice et quasi fascia transversa in medio læte violaceis. — Corpus subtus læte viride, abdominis segmentis duobus ultimis nigro-piceis nitidis. Pedes elongati, femoribus pallide rufis, tibiis tarsisque nigris.

C'est la quatrième espèce que nous connaissons de cet intéressant genre, établi par M. le Comte Dejean dans la magnifique *Iconographie des Coléoptères*, I. p. 40. Tab. I. fig. 4, et décrit depuis plus en détail dans les *Species général* du même auteur, Tom. V. p. 206. A l'espèce unique de la riche collection de M. le Comte Dejean *J. Lacordairei*, M. le Docteur Klug vient encore d'ajouter deux autres, qui avec cette dite espèce font partie du Muséum de Berlin, savoir : *J. binotata* et *bimaculata* (*). Toutes ces espèces ainsi que la nouvelle que je décris sont du Brésil, ce pays si riche en productions entomologiques qui, quoique déjà exploité par tant de naturalistes, nous offre encore chaque jour les nouveautés les plus intéressantes en objets d'histoire naturelle. — M. C. H. Bescke, marchand-entomologiste très-connu, y a fait une récolte d'insectes des plus grandes que je connaisse et avec beaucoup de choix. Dans les envois qu'il m'a transmis se trouvent un nombre très-considérable de nouvelles espèces et même des genres regardés comme extrêmement

(*) *Jahrbücher der Insectenkunde etc. von Dr. F. Klug. Berlin 1834. I. p. 8.*

rares. — J'ai cru lui rendre un juste hommage de reconnaissance au nom de la science que nous cultivons, en lui dédiant une espèce aussi remarquable que l'*Iresia* dont je viens de donner la description. Tous les envois de M. Bescke sont parfaitement bien soignés, et comme il en demande un prix extrêmement modique, je le recommande à tous les entomologistes. Il est parti du Brésil pour se rendre dans le Mozambique. Que ne doit-on pas attendre d'un collecteur aussi instruit et aussi zélé dans un pays si peu connu, en fait d'insectes qui présentent sans doute les formes les plus intéressantes !

ODONTOCHEILA (*) CHRYSOCHLORIS.

Elongata, cylindrica, supra cupreo-ænea, subtus viridi-cærulea, thoracis elytrorumque margine viridi, elytris punctis duobus marginalibus albis, mandibulis vix incurvis.

Habitat in Brasilia interiore. D. BESCKE.

Longit. 6 lin. Latit. $1\frac{1}{2}$ lin.

Elle ressemble beaucoup à l'*O. nodicornis*, mais elle est plus étroite et plus allongée. La tête est plus convexe, le corselet est plus long, plus étroit et plus cylindrique. — Les élytres sont un peu plus longues, d'une couleur plus claire et plus brillante, leur extrémité est d'un beau vert et la tache humérale manque entièrement. — Les cuisses et les

(*) *Laporte, Revue entomologique, par Silbermann. Strasbourg 1834. II. p. 34.*

jambes sont aussi en grande partie d'un jaune-testacé assez pâle.

ODONTOCHEILA RUGIPENNIS.

Sub-cylindrica, supra obscure aenea, subtus viridicærulescens, thoracis elytrorumque margine violaceo, elytris dorso inæqualibus, valde rugosis, punctis duobus marginalibus albis, mandibulis vix incurvis.

Habitat in Brasilia? D. Dr. SIEWALD.

Longit. $5\frac{1}{4}$ lin. Latit. $1\frac{1}{2}$ lin.

Cette espèce est assez voisine de l'*O. Curvidens*. Elle est un peu plus allongée, la tête est moins convexe postérieurement, le corselet est beaucoup plus étroit avec les impressions plus fortement marquées, et les élytres sont très-inégales et couvertes de rides irrégulières très-fortement marquées, surtout dans le milieu, ce qui la distingue de toutes les espèces voisines.

CICINDELA TARTARICA.

Depressa, rubro-cuprea, capite thoraceque viridimaculatis, antennis basi viridibus, abdomine cæruleo, elytris punctis tribus marginalibus lineaque apicali albis.

Habitat in Tartaria magna.

Longit. 6 lin. Latit. $2\frac{2}{3}$ lin.

Caput inter oculos valde impressum, longitudinaliter strigosum, vertice punctulatum, rubro-cupreum,

maculis duabus anticis verticeque viridibus, labro basique mandibularum pallide luteis; oculi nonnihil prominuli testacei; palpi violacei; antennæ capite cum thorace paullo longiores, articulis quatuor basalibus viridibus, reliquis nigro-fuscis. — Thorax latitudine fere duplo brevior, lateribus marginatus et nonnihil rotundatus, basi apiceque truncatus, depressus, antice posticeque transversim impressus, impressionibus canalicula longitudinali media conjunctis, ruguloso-punctatus, rubro-cupreus, in impressionibus viridis. Scutellum triangulare, ruguloso-punctatum, rubro-cupreum. — Elytra thorace duplo latiora et fere quadruplo longiora, ante medium nonnihil dilatata, versus apicem late rotundata, supra valde depressa, subtiliter granulosa, rubro-cuprea, basi ad scutellum utrinque virescentia, maculis quatuor marginalibus minutis albis, quarum prima in ipso humero majori, secunda paullo pone medium sublunaris marginem non attingens, tertia nonnihil ante apicem sub-triangularis et quarta in ipso apice marginem sequens linearis. Thorax subtus et pectus rubro-cuprea, abdomen cœruleum. Pedes femoribus rubro-cupreis, tibiis viridibus, tarsis cœruleis.

Cette espèce est, je crois, très-peu répandue dans les collections. Je n'en ai vu qu'un seul individu dans celle de feu M. le Docteur Henning, et qui maintenant fait partie du Musée de l'Université Alexandre de Helsingfors. C'est aussi à l'amitié de M. Henning que je dois l'individu qui se trouve en ma possession. Elle est pour la forme assez voisine de la *C. campes-*

tris, mais beaucoup plus plane et se rapproche davantage sous ce rapport de la *C. Maroccana* Fabr. que je crois être une espèce réellement distincte, à en juger du moins par l'individu du Portugal que je possède. Je partage ainsi l'opinion de M. Brullé(*) et non pas celle de M. Mariano de Sans de Barcelonne(**).

CICINDELA SOMMERI.

Obscure cuprea, subtus violaceo-micans, antennarum basi, sutura pedibusque rufescenti-cupreis, elytris lunula humerali, fascia media transversa maculaque magna postica rotundata fulvis.

Habitat in Mexico, ad Oaxaca.

Longit. $5\frac{3}{4}$ lin. Latit. $2\frac{1}{4}$ liu.

Caput inter oculos depressum, subtilissime coriaceum, ad oculos longitudinaliter strigulosum, obscure cupreum, lateribus nonnihil rubescente-micans; labrum brunneum; mandibula palpique viridi-ænea, rubro-cupreo-micantia; oculi magni globosi prominuli nigri; antennæ articulis quatuor baseos rufescenti-cupreis, reliquis nigro-fuscis. Thorax quadratus, supra planus, apice parum rotundatus, basi truncatus, lateribus rectis, antice posticeque linea transversa arcuata impressus, his lineis canalicula tenui in medio conjunctis, obscure cupreus, subtilissime coriaceus, pilis albis ad latera utrinque adpersus.

(*) *Revue entomologique*, par Silbermann. II. p. 96.

(**) *Annales de la Société entomologique de France*. IV. p. LXIX.

Scutellum triangulare, obscure cupreum. Elytra basi thorace fere duplo latiora, medio iterum dilatata, versus apicem rotundata, ibique serrulata, supra modice convexa, obscure cuprea, sutura rufescenti-ænea; in singulo lunula humerali, postice in maculam ovatam valde dilatata, fascia media transversa ad suturam producta et marginem attingens ibique anguste antrorsum extensa, postice in medio leviter emarginata, et macula magna rotundata paullo ante apicem, fulvæ. Corpus subtus obscure cupreum, virescenti et violaceo-micans, ad latera albo-pilosum. Pedes rufescenti-cuprei, femoribus pilis albidis adspersis.

J'ai cru devoir rendre par la dénomination de cette belle espèce de Cicindèle un juste hommage de reconnaissance à M. M. C. Sommer, négociant à Altona, qui depuis longtemps cultive l'entomologie avec tant de succès et contribue beaucoup aux progrès de cette science par ses nombreuses relations d'outre-mer, et qui a bien voulu augmenter ma collection d'une grande quantité d'insectes les plus précieux. Quoique dans les six livraisons que je possède de l'ouvrage de M. Chevrolat publié sous le titre de *Coléoptères du Mexique* cet auteur nous donne les descriptions de quinze nouvelles espèces de Cicindela, l'espèce que je viens de décrire ne s'y trouve pas et je ne l'ai pas non plus retrouvée dans les ouvrages de MM. Klug, Dejean et autres que j'ai consultés à cet égard.

CICINDELA MADAGASCARIENSIS DUPONT.

Viridi-ænea, subtus cyaneo-virescens, labro, abdominis margine, elytris lunula humerali, fascia media recurva, lunula apicali omnibus ad marginem contiguis maculisque tribus luteis.

Habitat in insula Madagascar.

Longit. $5\frac{1}{2}$ lin. Latit. 2 lin.

Caput subtilissime punctatum, utrinque ad oculos strigulosum, viridi-cupreum, medio impressum, fronte carina transversa separata; labro mandibularumque basi luteis; oculi valde globosi, brunnei; antennæ articulis quatuor prioribus cupreo-æneis, reliquis nigro-fuscis. Thorax quadratus, antice nonnihil rotundato-productus, ante apicem triangulariter, basi transversim impressus, medio canaliculatus, subtilissime punctatus, viridi-cupreus, lateribus albido-pilosus. Scutellum triangulare, viridi-æneum. Elytra viridia, obscure punctata, sutura cupreo-ænea, thorace fere duplo latiora et triplo longiora, apice serrulata, in singulo lunula humerali oblique descendente in disco protensa, fascia flexuosa media transversa apice hamata, lunula apicali dilatata, omnibus in limbo marginali contiguis, macula scutellari rotundata, altera elongata subscutellari, et tertia suturali, luteis, summo margine nigro. Corpus subtus cyaneo-virescens, abdominis margine anoque pallidis. Pedes albo-pilosi, femoribus viridi-æneis, tibiis cupreis, apice tarsisque violaceis.

Cette espèce m'a été envoyée par mon ami M. Chardigny de Lyon sous le nom que je lui ai conservé. Elle paraît être très-voisine de *C. abbreviata* Klug (*) mais elle en diffère par les signatures des élytres qui se joignent dans le bord fauve non interrompu. De même la *C. quadraticollis* Chaudoir (**) en est très-voisine, à juger du moins d'après une description assez courte et assez superficielle, or les trois taches près de l'écusson et de la suture ne se trouvent point mentionnées pour la *quadraticollis* qui vient également de Madagascar. Quant au mémoire de M. Chaudoir que je viens de citer, je prends encore la liberté d'observer que sa *Cicindela propinqua* est apparemment la *C. deserticola* Faldermann (***) et que la *Cicindela figurata* Chaudoir du désert des Kirguises ne pourra nullement, d'après mon opinion, être séparée de la *C. contorta* Steven du Caucase (****).

(*) *Bericht über eine auf Madagascar veranstaltete Sammlung von Insekten etc.* Berlin 1833. p. 33, 2. Tab. 1. fig. 2.

(**) *Annales de la Société entomologique de France.* Tom. IV. p. 436.2.

(***) *Bulletin de la Société Impériale des naturalistes de Moscou.* IX. p. 355.

(****) *Entomographie de la Russie*, par FISCHER. III. p. 30. 17. Tab. I. * fig. 11.

CICINDELA DREGEI, DEJEAN.

Cylindrica, fusco-ænea, elytris fascia media sinuata interrupta, margine apicis tenue punctisque quatuor albidis.

Habitat in Caffraria. D. DREGÉ.

Longit $3\frac{3}{4}$ lin. Latit. $1\frac{1}{4}$ lin.

C. Octoguttatæ Dej. affinis, sed magis cylindrica, capite brevior, thorace latior et signaturis elytrorum diversa. Caput fusco-æneum, subtilissime strigulosum, depressum, oculis globosis prominulis, mandibulis basi rufo-cupreis, antennis nigris. Thorax longitudine parum latior, apice productus fere bisi-nuatus, basi truncatus, lateribus nonnihil rotundatus, supra planus, antice posticeque transversim leviter impressus, obscure æneus, subtilissime punctulatus, lateribus parce albo-pilosus. Scutellum triangulare, obscure cupreum. Elytra thorace duplo latiora et fere quintuplo longiora, postice oblique attenuata, apice singulatim rotundata integra, supra fere plana, subtilissime punctulata, fusco-ænea, macula minuta humerali, dein duabus parvis fere transversim positis, fascia media tenui sinuata descendente, versus suturam interrupta, pone illam puncto minuto rotundata et margine apicali tenue albidis. Corpus subtus obscure cyaneum. Pedes tenues, femoribus virescenti-æneis, tibiis cuprescentibus.

CICINDELA CHLOROCEPHALA

Viridi-cupreo-enea, subtus dense albo-pilosa, capite antice late viridi-eneo, elytris margine laterali lato, præsertim postice ibique sinuato, lunula humerali intus dilatata, fasciaque media tortuosa incumbente, albis.

Habitat in insula Porto Rico. D. MORITZ.

Longit. 4 lin. Latit. $4\frac{1}{2}$ lin.

Cette espèce ressemble beaucoup à la *C. trifasciata* Dej. mais elle est plus courte, les yeux sont plus gros et plus saillans, le front est d'un vert-brillant plus clair, le corselet est beaucoup plus court, plus large que long, les élytres sont plus fortement ponctuées, la ponctuation n'est pas aussi marquée sur les taches blanches que sur le fond et celles-ci sont beaucoup plus larges que dans la *trifasciata*.

OXYGONIA.

Labrum breve transversum, quinque—dentatum, dentibus tribus mediis approximatis minutis acutis, exterioribus obtusiusculis, supra trinodosum. *Mandibulæ* elongatæ porrectæ, apice nonnihil arcuatæ, intus dentibus sex validis, inter se fere æqualibus, armatæ ut fere pectinatæ appareant. *Maxillæ* lineares elongatæ, tenues, angustæ, intus parum inæquales longe ciliatæ, apice angulo fere recto introrsum curvatæ, apice ipso acutissimo. *Palpi* filiformes elongati, articulis sub-cylindricis; *maxillares* interiores

tenuissimæ, articulo primo brevissimo, secundo elongato, et ultimo præcedenti duplo brevior apice rotundato; exteriores longissimæ, articulo primo brevissimo, secundo valde elongato, tertio iterum triplo brevior et ultimo præcedenti paullo longior apice rotundato; *labiales* prælongæ, articulo primo brevissimo, secundo valde elongato et ultimo præcedenti duplo brevior, apice nonnihil dilatato rotundato. *Mentum* profunde emarginatum, medio denticulo armatum, laciniis exterioribus longis acutis. —

Antennæ articulo primo inflato arcuato, secundo brevissimo nodoso, tertio elongato, apice nonnihil dilatato. *Caput* haud dilatatum, fronte plana, oculis maximis globosis valde prominulis. — *Thorax* capite vix brevior, latitudine multo longior, sub-cylindricus, supra globosus, medio canaliculatus, basi apiceque truncatus ibique profunde transversim impressus, constrictus, margine ipso transversim strigoso vel plicato, lateribus ipsis rotundatis. *Elytra* thorace plus quam duplo latiora et quadruplo longiora, posterius nonnihil dilatata, supra modice convexa, tenue marginata, apice explanata, singulatim acute acuminata. *Abdomen* (maris) segmento penultimo valde profunde emarginato fere bilobo, lobis magnis rotundatis, ultimo per totam longitudinem bifido, laciniis acuminatis. *Pedes* tenues elongati, femora antica apice dente unico, quatuor posteriora duobus acutis armata; tarsi maris antici nonnihil dilatati, articulo primo elongato, secundo duplo brevior, tertio iterum parum brevior, extus, sub-appendi-

culato, quarto parvo brevissimo, ultimo elongato tenui, unguiculis incurvis muticis.

La seule espèce que je connaisse ne pouvant être placée dans aucun des genres des Cicindélètes décrits jusqu'à présent, j'ai été obligé d'en former un nouveau. Ce genre se rapproche par la forme des *Therates* et encore plus des *Euprosopus*, mais la conformation des parties de la bouche le distingue de l'un et de l'autre. Je le place avant l'*Euprosopus* dans le système de M. le Comte Dejean; et le nom est tiré des deux mots grecs *ὀξύς*, pointu, et *γόνυ*, genou, pour désigner les genoux terminés en pointes aigues, particularité tout-à-fait propre à ce genre et qu'on ne trouve dans aucun autre Cicindélète, mais bien dans quelques genres de Capricornes.

OXYGONIA SCHOENHERRII.

Elongata, supra obscure ænea, capite thoraceque subtiliter strigosis, elytris punctatis, postice et lateribus viridi-micantibus, maculis sex testaceis, corpore subtilus cupreo-aurato.

Habitat in Columbia, ad Antiochiam D. NISSER.

Longit 7 lin. Latit. 2 lin.

Caput inter oculos dense longitudinaliter, vertice transversim strigulosum, obscure æneum, antice viridi-æneum, oculis maximis globosis nigris. Antennæ nigrae. Thorax transversim subtiliter strigosus, nigro-æneus, basi cuprescente. Scutellum triangulare, rugulosum, viridi-æneum. — Elytra regulariter et sub-

tilitèr punctata, ad humeros utrinque impressa, humeris ipsis prominulis, supra nonnihil inæqualia, postice transversim impressa explanata, apice singulatim acute acuminata, sutura et lateribus anguste marginata, obscure ænea, margine et sutura anguste, apice nonnihil latius virescentia, in utroque maculæ tres testacæ, quarum, una oblonga in ipso margine mox pone humerum, secunda in medio rotundata margini propius et ultima prope apicem ad marginem oblonga. Corpus subtus cupreo-aureatum, subtilissime strigulosum. Pedes elongati parum pubescentes, femoribus viridi-æneis, tibiis tarsisque nigris.

Je dois cet intéressant insecte à l'amitié de M. Schoenherr qui me l'a cédé quoiqu'il fût unique dans sa collection, et j'ai voulu lui témoigner mon respect et ma reconnaissance en lui dédiant une aussi belle espèce des coléoptères, remarquable sous tant de rapports. — Je n'en possède qu'un individu mâle, la femelle m'est inconnue. —

CTENOSTOMA BREVIUSCULUM.

Nigro-æneum, elytris profunde punctatis, apice rotundatis, macula media transversa posticeque fulvis.

Habitat in Brasilia interiore. D. BESCKE.

Longit. 5 lin. Latit. 1 lin.

Elle ressemble beaucoup à la *C. ichneumoneum* Dej. mais elle est beaucoup plus courte, le corselet

est plus étroit et la partie entre les deux sillons est un peu plus retrécie postérieurement, les élytres sont beaucoup plus courtes, moins rugueuses à la base, plus dilatées vers l'extrémité qui est arrondie, tandis qu'elle est échancrée dans *Ichneumoneum*; la tache du milieu est plus large et l'autre remonte beaucoup moins de l'extrémité et toutes les deux sont d'un jaune plus obscur. Tout le reste est comme dans *Ichneumoneum*.

L'intéressant genre de *Ctenostoma* établi par M. Klug dans les Actes de la Société Leopoldino-Caroline (*) et dont ce célèbre naturaliste a depuis décrit trois espèces dans la monographie qu'il en a publiée (**) compte maintenant un plus grand nombre d'espèces.—Aux espèces *formicarium* Fabr, *trinotatum* Klug et *rugosum* Klug qui se trouvent dans cette monographie, M. le Comte Dejean a de plus ajouté les *Jacquieri*, *ichneumoneum*, *unifasciatum* et *bifasciatum* toutes quatre nommées par lui. M. de Laporte Comte de Castelneau a depuis formé un genre particulier de la *C. Jacquieri* Dej. sous le nom de *Procephalus* (***) en décrivant deux nouvelles espèces, savoir: *P. metallicus* et *P. succinctus*. Dans

(*) *Nova Acta physico-medica Acad. Cæs. Leop. Nat. Curios.* X. p. 304. Tab. XXI f. 7.

(**) *Entomologische Monographien von Dr. Fr. Klug.* Berlin. 1824 p. 3.

(***) *Revue entomologique, par M. Silberman II.* p. 35. *Etudes entomologiques par M. de Laporte,* Paris 1834. p. 38.

les *Jahrbücher der Insektenkunde* M. Klug vient de décrire encore deux nouvelles espèces, les *C. ornatum* qui est un *Procephalus* et *C. macilentum*. Ainsi, avec l'espèce que j'ai caractérisée ci-dessus nous connaissons déjà huit espèces de *Ctenostoma* et quatre espèces de *Procephalus*, qui sont toutes propres à l'Amérique du Sud.—

GALERITA MORITZII.

Nigra, thorace rufo, pubescente, cordato, elytris sub-sulcatis, pone medium latioribus, interstitiis bilineatis, subtilissime transversim striolatis, antennis pedibusque rufo-testaceis, geniculis infuscatis.

Habitat in Columbia D. MORITZ.

Longit. $9,9\frac{1}{2}$ lin. Latit. $3\frac{5}{6}$, $3\frac{2}{3}$ lin.

Elle est très-voisine de la *G. Americana* Linné (*geniculata* Dej.), mais je crois cependant que c'est une espèce réellement distincte. Elle est beaucoup plus grande et presque la plus grande espèce de ce genre. La tête est proportionnellement plus grosse, plus allongée et plus rugueuse, les yeux sont au contraire moins saillans, le premier article des antennes est en proportion beaucoup plus gros, le corselet est plus large, plus en cœur, beaucoup plus dilaté et plus arrondi antérieurement et la surface en est plus rugueuse et couverte d'un duvet assez serré de poils roussâtres; les élytres ne sont pas

parallèles comme dans l'*Americana*, mais bien plus larges au delà du milieu, plus convexes, et les intervalles des lignes élevées sont plus rugueux transversalement; enfin les pattes sont beaucoup plus fortes que dans l'*Americana*.

Je l'ai dédiée à M. Moritz qui l'a trouvée en Colombie à Maracay près du lac de Valencia. — Ne possédant de la *G. Americana* qu'un individu rapporté de la Guadeloupe par feu M. Forstroem, je ne puis juger si les individus qui viennent du continent d'Amérique diffèrent spécialement de ceux des îles, qui, d'après M. le Comte Dejean, doivent être d'une taille plus petite, mais nonobstant cette différence, la description que le Comte donne de sa *geniculata* ne convient pas aux individus que je possède de la Colombie. Si, en effet, je m'étais trompé, et que les individus de la Colombie fussent entièrement semblables à ceux de la *G. Americana* envoyés de Surinam et de Cayenne, il n'en faudrait pas moins séparer cette espèce des Antilles de celle du continent Américain, et alors la première pourra porter le nom de *geniculata* donné par Dejean, tandis que la seconde devra être désignée sous le nom qui lui fut précédemment imposé par Linné et que M. Klug vient de lui rendre (*)

(*) Jahrbücher der Insektenkunde 1. p. 64.

GALERITA CARBONARIA.

Aterrima, thorace margine acute elevato, dorso obsolete bilineato, elytris sulcatis, interstitiis bilineatis, antennis tarsisque fuscis.

Habitat in Brasilia interiore rarius. D. BESCKE.

Longit 9 lin. Latit. $3\frac{1}{5}$ lin.

Caput ovatum rugosum carinatum, supra depressum, collari angusto; oculi parvi haud prominuli; antennæ capite cum thorace multo longiores, articulo primo magno nigro, reliquis fuscis pubescentibus. Thorax latitudine duplo longior, apice emarginatus, basi truncatus, angulis anticis posticisque rotundatis, posterius nonnihil angustatus, lateribus impressione explanato-marginatis summo, margine elevato reflexo, supra rugoso-punctatus, dorso per totam longitudinem carinis duabus obsoletis. Scutellum triangulare, rugoso-punctatum. Elytra thorace plus quam triplo latiora et longiora, basi valde angustata, humeris rotundatis, pone medium dilatata, apice truncata singulatim late emarginata, supra sub-depressa, in singulo carinulæ novem satis elevatae et inter illas lineæ binæ obsoletæ ut in plerisque congeneribus. Corpus subtus nigrum punctatum. Pedes elongati nigri, tarsis fuscis.

Cette espèce se rapproche le plus des *G. striata* et *porcata* Klug, (*) ainsi que de la *G. Lacor-*

(*) *Jahrbücher der Insektenkunde*, p. 66.

dairei Dej. (*), mais cependant il est facile d'en saisir les caractères distinctifs. Le Musée de Berlin et celui du Comte Dejean (**) mentionnent chacun quinze espèces de *Galerita*; je n'en possède que onze de ce genre intéressant, dont la plupart des espèces connues sont assez rares. —

MORMOLYCE PHYLLODES HAGENBACH.

Depuis plus de quatre ans en possession de ce singulier insecte, par l'amitié de M. Sommer, qui m'en a envoyé trois exemplaires parfaitement bien conservés, j'ai cru rendre un service à la science, en publiant quelques observations pour en compléter la description. Je ne puis comprendre la raison qui a pu engager le premier entomologiste de notre siècle, feu M. Latreille, et à son exemple M. le Comte Dejean à le placer dans la tribu des *Feroniens* entre les genres *Taphria* et *Sphodrus*, avec lesquels il n'a certainement rien de commun. Depuis, M. Klug vient de lui assigner sa véritable place dans le système, l'ayant mis parmi les *Troncatipennes* près du genre *Agra* (***) auquel il ressemble par la forme, si l'on en excepte la dilatation du bord extérieur des élytres. C'est encore à la perspicacité

(*) *Species général des Coléoptères*, II p. 443.

(**) *Catalogue des Coléoptères de la collection de M le Comte Dejean*, 2^e édition, Paris 1833 p. 6.

(***) *Jahrbücher der Insektenkunde*. I. p. 54.

de M. Sommer que je dois des renseignemens sur les différences sexuelles, qui ont jusqu'ici échappé aux entomologistes. Selon lui, le mâle est toujours plus grand que la femelle, chez le premier la tête est plus allongée avec les yeux proportionnellement plus gros mais moins saillans, les antennes sont plus longues que le corps, le corselet est en dessous un peu plus courbé, la partie dilatée de l'extrémité des élytres très souvent se croise un peu, tandis que dans la femelle les élytres ne s'y touchent qu'à peine; dans celle-ci l'on voit une petite dent très-remarquable à l'endroit où cette dilatation s'approche le plus de l'une et de l'autre des élytres, et dans le mâle cette dent est presque effacée et à peine visible; dans le sexe masculin les pieds sont aussi plus forts et plus longs, les tarses sont un peu plus larges et les deux premiers articles sont en dessous hérissés de poils plus roides et plus serrés à peu près comme chez les *Graphipterus*. M. Hagenbach (*) paraît avoir figuré un mâle quoique les élytres à leur dilatation postérieure soient trop séparées, les antennes moins longues et plus grosses, ainsi que les pieds plus forts que ces parties ne le sont dans la nature. La figure qu'a donnée M. le Comte Dejean (**) se rapporte à la femelle

(*) *Mormolyce, novum coleopterorum genus*. Norimb. 1825.

(**) *Iconographie et histoire naturelle des coléoptères*. II. pl. 113.

CYMINDIS APICALIS.

Rufo-picea, punctata, parce pubescens, elytris marginæ exterioræ, macula elongata humerali apiceque ferrugineis, ore, antennis pedibusque rufopallidis.

Habitat in Rossia meridionali. D. HUMMEL.

Longit. 4 lin Latit. $1\frac{2}{3}$ lin.

Elle ressemble beaucoup à la *C. binotata* Fischer, et elle n'en est peut être qu'une variété. Elle est proportionnellement un peu plus courte, la ponctuation de la tête et du corselet est moins forte et moins serrée, ces parties sont d'une couleur plus foncée, la tache humérale des élytres est plus allongée en forme de bande et leur extrémité est assez largement colorée d'un rouge ferrugineux. Le reste est comme dans la *binotata*.

CALLEIDA SUB-AENEA.

Rufo-picea, elytris rufescenti-viridibus metallicis, foveolis numerosis in lineas sub-ordinatis impressis, antennis pedibusque ferrugineis.

Habitat in Brasilia interiore. D. BESCKE.

Longit. $3\frac{1}{4}$ lin. Latit. $\frac{3}{4}$ lin.

C. æruginosa Dej. multo minor, angustior, alias forma assimilis, punctura elytrorum vero abunde distincta. Caput ovatum, rufopiceum, nitidum, antice biimpressum; oculi globosi vix prominuli; anten-

næ capite cum thorace longiores, ferrugineæ pubescentes.—Thorax latitudine paullo longior, basi apiceque truncatus, lateribus nonnihil rotundatus, postice angustatus, angulis rectis, supra subdepressus, medio tenue canaliculatus, lateribus marginatus, intra basin utrinque foveola obliqua sat profunde impressa, supra rufo-piceus nitidus, impunctatus. Scutellum minutissimum triangulare, rufo-piceum. Elytra thorace vix duplo latiora sed triplo longiora, linearia, basi rotundata, apice truncata vel late emarginata, tenue marginata, supra subdepressa, foveolis numerosis profunde impressis et striis abruptis obsoletis in lineas dispositis. Corpus subtus rufo-piceum, ano pedibusque ferrugineis.

CALLEIDA LACUNOSA.

Pallide testacea, capite thoraceque rufescentibus, oculis nigris, thorace elongato, antice bisfoveolato, intra marginem impresso, elytris interrupte striatis, nigro-lineatis, foveolis duabus dorsalibus impressis.

Habitat in Brasilia interiore. D. BESCKE.

Longit. $3\frac{3}{4}$ lin. Latit. 1 lin.

Præcedente haud latior sed multo longior. Caput rufoferrugineum nitidum, fronte biimpressa et foveolis duabus inter oculos notatum; oculi nigri, parum prominuli; antennæ capite cum thorace longiores, pallide ferrugineæ pubescentes. Thorax latitudine baseos duplo longior, lateribus anterieus parum ro-

tundatus, posterius angustatus, angulis rotundatis, supra subdepressus, rufo-ferrugineus nitidus, impunctatus, medio canaliculatus, lateribus tenue marginatus, intra marginem a basi ad apicem usque linea et antice utrinque foveola sat profunde impressis. Scutellum minutum triangulare, rufo-ferrugineum. Elytra thorace plus quam duplo latiora et longiora, anterieus valde rotundata, sublinearia, apice truncata vel singulatim late emarginata, tenue marginata, supra depressa, pallide testacea, striis impressis hinc inde abruptis nigro-lineata, in interstitio tertio foveolæ duæ, una in medio, altera paullo ante apicem profunda, etiam nigræ, et ad marginem series e punctis nigris impressis. Corpus subtus cum pedibus pallide testaceum. —

STÉNOCNEMUS.

Labrum quadratum, truncatum. *Mandibulæ* elongatæ, apice acutissimæ. *Maxillæ* breves, apice acuminatæ *Palpi* elongati, articulo ultimo oblongo-ovato, nonnihil curvato. *Mentum* tridentatum, dente medio parvo, lateralibus valde acutis protensis. —

Antennæ capite cum thorace multo longiores, tenues, articulo primo crassiore oblongo, secundo brevi obconico, tertio præcedente quadruplo longiore, apice nonnihil crassiore, his omnibus glabris, quarto paullo breviora cum sequentibus longitudine æqualibus pubescentibus. *Caput* ovatum, antice productum. *Thorax* antice emarginatus, lateribus

explanatis, vix rotundatis, **versus** basin nonnihil angustatus, basi ipsa truncatus. *Elytra* thorace duplo latoria, et plus quam triplo longiora, sub-linearia, supra subdepressa, apice sinuata, sub-acuminata. *Pedes* tenues elongati, tarsi anticis articulis tribus primis brevibus triangularibus, in mare dilatatis, penultimo profunde bilobo, quatuor posterioribus articulo primo elongato, secundo triangulari brevior, tertio iterum brevior et penultimo bilobo, in omnibus unguiculi longiusculi omnino mutici. —

Ce nouveau genre est, ainsi que l'*Onypterygia* Chevrolat, par son *facies* assez voisin des *Dolichus* et *Anchomenus*, mais cependant j'ai cru devoir le placer dans la tribu des Troncatipennes près de l'*Onypterygia*, à l'exemple de M. le Comte Dejean. Mon *Stenocnemus* diffère de celui-ci par plusieurs caractères et surtout par les crochets des tarses qui ne sont pas dentelés en dessous. Le nom est tiré des mots grecs στενός, étroit, mince, et κνήμη, κνήμους, jambe.

STENOCNEMUS JAEGERI.

Nigro-piceus, palpis, tarsi antennisque extrorsum rufo-piceis, elytris cæruleo-virescentibus striatis, dorso punctis duobus impressis.

Habitat in insula St. Domingo. D. JÆGER.

Longit $5\frac{2}{3}$ lin. Latit. 2 lin.

Caput nigro-piceum, fronte bifoveolata; oculi magni prominuli; antennæ articulis basalibus nigris,

apice rufis. Thorax nigro-piceus, depressus, impunctatus, nitidus, lateribus late explanatis, medio tenue canaliculatus, antice posticeque transversim leviter impressus, intra basin utrinque foveola obliqua sat profunde impressa et ultra medium protensa. Scutellum minutum triangulare, nigro-piceum. — Elytra tenue marginata, humeris rotundatis, apice sinuata sub-acuminata, coeruleo-virescentia, impunctata, nitida, regulariter striata, striis omnino impunctatis, in interstitio tertio a sutura puncta duo impressa, unum in medio, alterum multo ante apicem, et ad ipsum marginem series e punctis impressis versus apicem densioribus. Corpus subtus cum pedibus nigro-piceum nitidum, pectore abdominisque medio, femorum basi et tarsis rufo-piceis.

J'ai voulu, par la dédicace de ce joli insecte, rendre un hommage de reconnaissance à M. Jæger qui a entrepris un voyage à St. Domingue, pour explorer cette île en fait d'histoire naturelle. Depuis des années nous manquons de renseignemens sur le sort de ce naturaliste et nous avons lieu de croire qu'il n'existe plus. Il est beaucoup à regretter qu'il n'ait pu continuer ses recherches, surtout pour l'entomologie, science qu'il a enrichie de nombreuses découvertes; il m'a transmis plusieurs envois d'insectes très-considérables et très-bien soignés. Je crois aussi que je possède la collection la plus complète de coléoptères ramassés par lui, et l'insecte que je viens de décrire doit être un des plus rares, car je n'en ai vu aucun exemplaire dans

les envois de M. Jæger à d'autres amateurs de la science entomologique.

CHELONODEMA (*) ELEGANS.

Fulva, antennis extrorsum, oculis thoracisque margine nigris, elytris albidis, summo margine, fasciis duabus latis transversis punctisque quatuor posticis atris.

Habitat in Brasilia interiore. D. BESCKE.

Longit. 6 lin. Latit. $2\frac{1}{2}$ lin.

Caput parvum, fulvum, depressum, inæquale, oculis magnis prominulis nigris. Antennæ capite cum thorace multo longiores pubescentes, articulis tribus baseos fulvis, reliquis nigrofuscis. Thorax ut in congeneribus semicircularis, vel antérieus rotundatus et basi sub-rectus, medio baseos nonnihil productus, supra depressus, subtilissime rugulosus, in medio tenuissime canaliculatus, basi utrinque foveola rotundata sat profunda et inter illas transversim impressus, margine explanato-reflexo, totus fulvus, summo margine antico et postico nigro. Scutellum minutissimum, triangulare, fulvum. Elytra thorace plusquam duplo latiora et quadruplo longiora, humeris rotundatis, pone medium vix dilatata, apice singulatim oblique et profunde emarginata, lateribus anguste marginata, supra modice convexa, tenuissime punctato-striata, albescentia, fascia antica mox pone

(*) Laporte, *Etudes entomologiques* I, p. 4.

scutellum , lata , suturam et marginem haud attingente , altera fere in medio , ad suturam contigua , valde dilatata , versus marginem nonnihil angustiore et illum non attingente , et intra apicem maculis quatuor minutis oblongis in lineam transversam positis , summoque margine laterali et apicali , nigris. Corpus subtus cum pedibus fulvum.

LEBIA GENICULATA.

Capite elytrisque viridi-smaragdinis , thorace pedibusque fulvo-testaceis , femoribus apice nigris , pectore abdomineque cyaneis , elytris profunde punctato-striatis , interstitiis punctatis.

Habitat in Armenia D. Scowitz. A. D. Faldermann sub nomine *L. cyanocephalæ* communicata.

Longit $2\frac{1}{2}$ lin. Latit. $1\frac{1}{4}$ lin.

Elle est très-voisine de la *L. cyanocephala* , mais je crois que c'est réellement une espèce distincte , intermédiaire entre celle-ci et la *chlorocephala*. La tête et les élytres sont d'une couleur encore plus verte que dans la *chlorocephala*, la poitrine est d'un bleu-verdâtre comme dans la *cyanocephala* , de laquelle cette espèce se rapproche le plus par la forme et la grandeur , mais le corselet est beaucoup moins large , plus fortement ponctué , les élytres sont un peu plus allongées , les stries sont encore plus profondes et la ponctuation des intervalles est plus fortement marquée. Le premier article des antennes est ferrugineux et l'écusson est de la couleur

des élytres comme chez la *cyclocephala*, mais la couleur du corselet et des pattes est beaucoup plus pâle qu'elle ne l'est dans l'une et l'autre des deux espèces susmentionnées.

LEBIA HASTATA.

Fulvo-testacea, capite thoraceque rufis, elytris sulcatis nigris, pone medium late maculaque magna reniformi humerali utrinque pallidis.

Habitat in Brasilia interiore. D. BESCKE.

Longit. $3\frac{1}{2}$ lin. Latit. $1\frac{2}{5}$ lin.

Caput triangulare, depressum, rufum, ante oculos in triangulum subtiliter strigulosum; oculi obscuri globosi, valde prominuli; antennæ capite cum thorace longiores, pallide testaceæ. Thorax transversus vel longitudine fere duplo latior, lateribus rotundatis, late explanato-marginatis, apice truncatus, basi parum productus, angulis posticis obtusis, supra disco modice convexus, medio canaliculatus, subtilissime punctulatus, rufo-testaceus. Scutellum triangulare, rufo-testaceum. Elytra thorace duplo latiora et fere quintuplo longiora, humeris rotundatis; pone medium nonnihil dilatata, tenue marginata, apice oblique truncata, supra sub-depressa, profunde sulcata, in sulcis punctulata, maxima parte pallide testacea, cæterum nigra, vel basi, margine toto et postice ad tertiam partem oblique et in nigridine antica macula magna reniformi utrinque posterius valde dilatata versus suturam flexa ibique rotundata,

pallidis, seu si ex inverso respexeris, pallide testacea, macula cordiformi scutellari et fascia magna media ad suturam valde dilatata ibique connexa et cum macula scutellari cohærente, nigris. Corpus sub-tus cum pedibus fulvo-testaceum.

LEBIA LEBASII DEJEAN.

Pallide testacea, capite thoraceque rufo-fulvis, oculis nigris, elytris sub-sulcatis pallidis, macula scutellari communi fasciæque postica transversa dentata, nigris.

Lebia Lebasii Dejean Catalogue des Coléoptères, 2-ème édition, p. 10. Habitat ad Carthagenam Americæ meridionalis. Misit. D. SCHÖNHERR.

Longit. 3 lin. Latit. $1\frac{1}{3}$ lin.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, mais elle est plus petite, les yeux sont plus gros et plus saillans, le corselet est plus court, proportionnellement plus large, assez rétréci postérieurement et les angles de la base sont presque droits, les élytres sont beaucoup moins profondément sillonnées, et simplement striées vers l'extrémité, qui est largement échancrée, la bande est plus étroite, plus dentée et plus éloignée en arrière de la tache près de l'écusson qui est aussi moins en cœur et presque carré. Enfin le dessous du corps et les pattes sont d'une couleur beaucoup plus pâle.

LEBIA CONTAMINATA.

Pallide testacea, capite thoraceque fulvis, oculis magnis nigris, elytris sulcatis, macula communi scutellari, linea laterali antice fasciaque media angusta tessellata, brunneis.

Habitat in Brasilia interiore D. BESCKE.

Longit. $2\frac{1}{2}$ lin. Latit. $1\frac{1}{2}$ lin.

L. angulatæ Dej. similis. Caput subdepressum, fulvum, oculis magnis nigris, valde prominulis, antennis fulvo-testaceis pubescentibus, articulis tribus ultimis majoribus fuscescentibus. Thorax capite cum oculis haud latior, transversus, antice truncatus, basi transversim impressus parum productus, angulis rectis, lateribus vix rotundatus, late explanato-marginatus, in medio tenue canaliculatus, dorso modice convexus, subtilissime punctulatus, fulvus, margine dilutiore et in dorso utrinque nonnihil infuscatus. Scutellum triangulare, pallide testaceum. Elytra thorace triplo latiora et quintuplo longiora, humeris rotundata, tenue marginata, apice oblique truncata, profunde sulcata et in sulcis leviter punctata, pallide testacea; in regione scutellari macula communis triangularis, ad humerum producta et deinde in lineam marginalem rectam continuata, quæ iterum attingit fasciam mediam communem transversam e maculis tessellatis, omnibus fusco-brunneis. Corpus subtus cum pedibus pallide testaceum.

HELLUOMORPHA (*) CORACINA.

Aterrima, depressa, antennis moniliformibus extrorsum incrassatis, capite antice bifoveolato, thorace varioloso, medio canaliculato, elytris parallelis, profunde sulcatis, in sulcis punctatis et gemellato-lineatis.

Habitat in Brasilia interiore D. BESCKE.

Longit. $6\frac{1}{2}$ lin. Latit. $2\frac{1}{3}$ lin.

Helluo Lacordairei Dej. et *nigerrimo* Klug vicina, sed in multis ab illis diversa. Caput sub-quadratum, nitidum, pone labrum transversim impressum, ante oculos foveola profunda inæquali utrinque notatum; oculi globosi valde prominuli; collare nitidum, antice rugoso-punctatum. Antennæ pubescentes, articulo primo magno oblongo, secundo, tertio et quarto subglobosis minoribus, 5—10 sub-quadratis sensim majoribus, ultimo ovato, apice rotundato. Thorax sub-cordatus antice parum, basi vero profunde emarginatus, lateribus anterieus rotundato-dilatatus, posterius sinuato-angustatus, angulis basalibus sub-rectis, tenue marginatus, supra depressus, in medio profunde canaliculatus, undique punctis profundis hinc inde adpersus. Scutellum minutum, triangulare, impunctatum. Elytra thorace nonnihil latiora et plusquam duplo longiora, sub-quadrangularia, angulis

(*) Laporte, *Études entomologiques*. I. p. 52.

ipsis rotundatis, supra depressa, in singulo sulci novem profunde exarati in fundo punctati et lineis gemellatis undulatis instructi, marginata, ad ipsum apicem valde rugoso-punctata. Corpus subtus cum pedibus nitidum, disperse punctatum.

BRACHINUS AEGYPTIACUS.

Capite, antennis, thorace, pectoris medio pedibusque pallide ferrugineis, elytris costatis nigris, fascia media abbreviata apiceque flavo-ferrugineis.

Habitat in Ægypto D. ALEX. LEFEBVRE.

Longit. $7\frac{1}{2}$ lin. Latit. $2\frac{1}{2}$ lin.

Il m'a été envoyé par M. Schoenherr comme une variété de l'*Africanus* Leach, auquel il ressemble beaucoup. Ayant reçu en même temps de M. Schoenherr un individu trouvé en Barbarie et qui lui a été communiqué par M. le Comte Dejean, j'ai cru que celui d'Égypte devait constituer une espèce distincte. Il est proportionnellement beaucoup plus allongé, les impressions du front sont moins marquées, les yeux sont pâles, le corselet est un peu plus étroit, les petites stries du bord antérieur sont moins apparentes et moins serrées, les élytres sont plus allongées et plus parallèles, les côtes sont moins élevées et les intervalles plus finement ponctués; la couleur des antennes, de la tête, du corselet et des pattes est d'un ferrugineux très-pâle et la couleur des taches des élytres est jaunâtre; enfin la tache

de l'extrémité est plus tranchée et plus distincte que dans l'*Africanus* de la Barbarie.

BRACHINUS GENICULARIS.

Capite thoraceque rufis, thorace cordato, elytris obsoletissime costatis, nigro-fuscis, lateribus griseo-pubescentibus, pedibus antennisque ferrugineis, articulis duobus femorumque apice infuscatis.

Habitat in Brasilia interiore D. BESCKE.

Longit. 4, $4\frac{1}{2}$ lin. Latit. 2, $2\frac{1}{3}$ lin.

Caput ovatum rufum, nitidum læve, sub-convexum, fronte utrinque inæqualiter foveolata, oculis prominulis nigris; antennæ capite cum thorace duplo longiores, rufo-ferrugineæ, pubescentes, articulis 3 et 4 infuscatis. Thorax latitudine longior, basi apiceque truncatus, antè nonnihil rotundatus, postè angustatus, angulis acutis, lateribus tenue marginatus, in medio canaliculatus, nonnihil convexus, rufus nitidus lævis. Scutellum minutissimum, triangulare, nigrum. Elytra thorace quadruplo latiora et longiora, humeris rotundata, postè nonnihil dilatata, apice oblique truncata, supra convexiuscula, vix punctulata et obsoletissime costata, nigro-fusca, versus latera griseo-pubescentia. Pectus et abdomen picea. Pedes rufo-ferruginei, femoribus apice late nigro-infuscatis

BRACHINUS VENTRALIS.

Rufo-ferrugineus, thorace oblongo, angustato, oculis fuscis, elytris nigris obsolete costatis.

Var. *b. Antennarum articulis quatuor baseos, tibiis abdominisque medio infuscatis,*

Habitat in Columbia ad Maracay D. MORITZ.

Longit. $3\frac{3}{4}$ lin. Latit. 2 lin.

Caput oblongo-ovatum, rufo-ferrugineum, opacum, fronte utrinque tenue longitudinaliter foveolata, vertice sub-convexo, oculis majusculis prominulis nigro-fuscis; antennæ dimidio corporis longiores, crassiusculæ, rufo-ferrugineæ. Thorax latitudine sesqui longior, basi apiceque truncatus, antè parum rotundatus, postè valde sinuato-angustatus, angulis acutis prominulis, lateribus tenue marginatus, in medio canaliculatus, dorso sub-convexus transversim strigulosus, rufo-ferrugineus opacus. Scutellum minutum, triangulare, rufo-ferrugineum. Elytra thorace plus quam triplo latiora et longiora, humeris rotundata, postè dilatata, apice oblique truncata, supra modice convexa, obsolete costata, nigra opaca. Corpus subtus cum pedibus rufo-ferrugineum opacum.

BRACHINUS ATRAMENTARIUS.

Niger, palpis antennisque extrorsum tarsisque brunneis, thorace cordato, elytris obsolete costatis.

Habitat in Brasilia interiore D. BESCKE.

Longit. $6\frac{1}{2}$ lin. Latit. $2\frac{3}{4}$ lin.

Statura et magnitudo *B. marginelli* Dej. Caput

ovatum, in fronte utrinque foveola oblonga, inter oculos punctis duobus minutis et in vertice puncto majore impressis, nigrum nitidum, oculis magnis, modice prominulis, ore palpisque extrorsum brunneis. Antennæ capite cum thorace longiores crassiusculæ, articulis quatuor baseos nigris apice rufis, reliquis brunneis pubescentibus. Thorax capite angustior, latitudine multo longior, basi apiceque truncatus; antè parum rotundatus, postè valde angustatus, angulis acutis prominulis, lateribus tenuè marginatus, in medio canaliculatus, supra modice convexus, obsolete transversim strigosus, niger nitidus. Scutellum minutum triangulare acutum. Elytra thorace plus quam quadruplo longiora et latiora, humeris et angulis posticis rotundata, pone medium parum dilatata, tenuissime marginata, apice fere rectè truncata, supra sub-convexa, obsolete costata, interstitiis leviter transversim rugulosis, nigra obscura. Corpus subtus nigro-piceum pubescens. Pedes nigri, extrorsum pubescentes, femorum basi tarsisque brunneis.

BRACHINUS GILVIPES.

Nigro-piceus, antennarum basi pedibusque ferrugineis, thorace oblongo, sub-cordato, elytris obsolete costatis, pubescentibus.

Habitat in insula Porto Rico; a D. MORITZ captus et a

D. Sommer communicatus.

Longit. $3\frac{3}{4}$ lin. Latit. $1\frac{3}{4}$ lin.

Statura fere præcedentis, sed multo minor. Caput

ovatum, fronte foveola utrinque elongata impressa, et inter illas subcarinata, nigro piceum nitidum, antèrius rufescens, ore palpisque ferrugineis, oculis modice prominulis, obscuris. Antennæ capite cum thorace multo longiores, articulis quatuor baseos pallide ferrugineis, reliquis obscurioribus. Thorax capite cum oculis angustior, latitudine fere duplo longior, apice leviter emarginatus, basi truncatus, antèrius parum rotundatus, posterius valde angustatus, angulis omnibus acutis prominulis, lateribus tenuè marginatus, in medio canaliculatus, supra convexiusculus, obsolete transversim strigosus, nigro piceus nitidus. Scutellum minutissimum, triangulare, nigropiceum. Elytra thorace fere quintuplo latiora et plus quam triplo longiora, humeris rotundatis, pone medium valde dilatata, postice angustata, apice oblique truncata, lateribus tenuissime marginata, supra nonnihil convexa, obsolete costata, subtilissime punctulata, nigro-picea opaca, brunneo-pubescentia. Corpus subtus brunneo-piceum pubescens. Pedes pallide ferruginei.

PHILOTECNUS BISIGNATUS.

Cymindis bisignata Dejean, *species général des coléoptères*. V. p. 322.

Cet insecte, à cause de caractères trop importans et entr'autres à cause des crochets des tarses simples, ne pouvant être réuni aux *Cymindis*, en a été séparé par M. le Comte Castelleau sous le nom gé-

nérique de *Cymindoidea* (*). Je le place près du genre *Corsyra*; mais le nom de *Cymindoidea* étant assez étrange et peu convenable à un genre, j'ai cru qu'il serait mieux de lui garder celui de *Philotecnus* donné par M. Schoenherr et cité par M. le Comte Dejean dans son *Species*. L'individu, que j'ai reçu de M. Schoenherr et qui a été trouvé à Sierra Leona par M. Afzelius, diffère un peu de la description de M. le Comte Dejean en ce que les pattes sont entièrement d'un noir obscur.

H O L O L I S S U S.

Labrum quadratum breve, apice emarginatum. *Mandibulae* validae arcuatae, apice acuminatae. *Palpi* omnes articulo ultimo elongato, sub-cylindrico. *Mentum* lateribus laciniis validis acutis, medio acute dentatum, labio bifido. *Antennae* capite cum thorace multo breviores, articulo primo magno sub-cylindrico, secundo brevi obconico, tertio praecedente fere duplo longiore, quarto iterum nonnihil brevior obconicis, 5—40 brevibus sub-lenticularibus, ultimo oblongo-ovato.

Corpus valde deplanatum, glaberrimum, nitidissimum. *Caput* latum, mandibulis porrectis, oculis valde prominulis. *Thorax* capite duplo latior, transversus, apice late emarginatus, basi truncatus, latitudini anticae aequalis. *Elytra* basi latitudine thora-

(*) *Annales de la Société entomologique de France*. I. p. 390.

cis, oblonga, posterius parum angustiora, apice truncata. *Pedes* breves, validiusculi, tarsorum articulis quatuor prioribus breviusculis æqualibus obconicis, ultimo multo longiore apice incrassato, unguibus validis muticis.

J'ai reçu de M. Bescke un insecte trop remarquable sous plusieurs rapports pour ne pas m'engager à en former un nouveau genre. Sa forme aplatie à peu près comme les *Hololepta*, et sa surface très-polie et bien lisse lui donnent en quelque sorte le *facies* d'un Lucanide voisin des genres *Platycerus* ou *Figalus*; mais les antennes filiformes et les pattes indiquent de suite les caractères d'un véritable Carabique. Ce genre doit trouver place dans le système de M. le Comte Dejean après le genre très-paradoxe de *Drepanus*. Son nom a été tiré des mots grecs, ὄλος, tout, et λισσός, lisse, pour désigner son apparence très-lisse et très polie.

HOLOLISSUS LUCANOIDES.

Nigro-piceus, depressus, nitidissimus, glaberrimus, thorace basi bifoveolato, elytris lateribus et apice striatis, antennis extrorsum pedibusque rufescenti-piceis.

Habitat in Brasilia interiore. D. BESCKE.

Longit. 7 lin. Latit. $2\frac{3}{4}$ lin.

Caput nigro-piceum, ante oculos utrinque foveola oblonga profunde impressa, linea antica exarata transversa conjunctis, oculis globosis valde prominu-

lis, antennis extrorsum palpisque rufopiceis. Thorax medio obsolete canaliculatus, nigro-piceus, lævissimus, lateribus parum rotundatis, marginatis, angulis omnibus obtusis, in basi utrinque foveola magna sat profunde impressa et altera parva ante apicem utrinque, vix conspicua. Scutellum minutissimum, breve, latum. Elytra nigro-picea, lævissima, ad latera utrinque striæ tres obsoletissimæ, et ad apicem quinque satis conspicuæ sed mox antèrius evanescentes, tenue marginata et intra marginem abrupte punctata. Corpus subtus nigro-piceum, lævissimum. Pedes rufescenti-picei.

DYSCOLUS CAERULEO-MARGINATUS CHEVROLAT.

Supra viridi-æneus metallicus, subtus cum pedibus obscure violaceus, capite nigro-piceo, antennis brunneis, thorace rotundato, limbo elevato reflexo, elytrorumque margine cæruleo, elytris obsoletissime punctato-striatis, punctis tribus impressis.

Habitat in MEXICO.

Longit. 6 lin. Latit. $2\frac{1}{3}$ lin.

Caput ovatum, nigro-piceum, in fronte foveola utrinque oblonga profunda et inter oculos utrinque altera minuta obliqua impressis, oculis rotundatis brunneis modice prominulis. Antennæ capite cum thorace longiores tenues, extrorsum nonnihil crassiores, brunneæ. Thorax capite multo latior, latitudine parum brevior, apice profunde emarginatus,

angulis prominulis acutis, lateribus valde dilatatus et fere æqualiter rotundatus, basi truncatus angulis sub-rectis, supra modice convexus, antè transversim triangulariter impressus, impressione cum canalicula media satis profunda ad basin usque producta convexa, basi iterum transversim nonnihil depressus ibique utrinque ad ipsum angulum foveola oblonga profunda, viridi-æneus metallicus, margine laterali valde elevato-reflexo, cyaneo. Scutellum minutissimum, triangulare, viridi-æneum. Elytra thorace sesqui latiora et triplo longiora, basi sub-truncata, humeris rotundatis, ante medium parum sinuata, apicem versus nonnihil angustata ibique etiam sinuata, ad suturam producta, apice ipso rotundato, supra modice convexa, obsoletissime punctato-striata, in singulo punctis tribus minutis impressis, primo pone basin ad striam tertiam a sutura, secundo paullo pone medium et tertio ante apicem ad striam secundam; in ipso apice foveola rotundata majuscula et intra marginem series e foveolis sat profunde impressis; viridi-ænea, metallica, nitida, margine omni elevato-reflexo, cæruleo. Corpus subtus cum pedibus obscure violaceum.

Cet insecte faisait partie d'une petite collection de coléoptères du Mexique que j'ai achetée de M. Chevrolat, de moitié avec M. Schoenherr, et il y portait le nom que je lui ai conservé.

CATASCOPIUS AURATUS CHEVROLAT.

Supra viridi-æneus nitidus, subtus obscure violaceus, thoracis margine explanato rugoso, elytris striatis, interstitiis æqualibus, antennis brevibus brunneis, pedibus nigro-piceis.

Ozæna aurata Chevrolat in litteris.

Habitat in MEXICO.

Longit. $3\frac{1}{4}$ lin. Latit. $1\frac{1}{2}$ lin.

Caput breve viridi-æneum nitidum politum, inter oculos antè quadrifoveolatum, oculis magnis prominulis glaucis. Antennæ capite cum thorace multo breviores, tenues, brunneæ, extrorsum dilutiores. Thorax latitudine duplo brevior, apice late emarginatus, angulis rotundatis, lateribus antè rotundatus, postè nonnihil angustatus, basi truncatus, angulis rectis supra in disco modice convexus, transversim strigosus, medio canaliculatus, antè oblique leviter et basi profundius transversim impressus, margine laterali late explanato transversim valde rugoso, viridi-æneus nitidus. Scutellum minutum triangulare nigro-piceum. Elytra thorace latiora et plus quam quadruplo longiora, subquadrata vel antè et postè vix angustata, apice sinuato-truncata, supra modice convexa, striata striis impunctatis, tenue marginata, viridi-ænea nitida, ad striam tertiam mox post scutellum puncto et altero ad secundam paullo ante apicem, ut etiam intra marginem serie contigua e punctis parvis, impressis. Corpus subtus obscure violaceum. Pedes nigro-picei.

J'ai reçu cet insecte de M. Schoenherr à qui M. Chevrolat l'avait envoyé sous le nom d'*Ozæna aurata*; mais c'est évidemment un *Catascopus*, genre très-différent de celui d'*Ozæna* qui, dans toutes les espèces que nous en connaissons, se distingue par un caractère bien que très-facile à saisir, échappé cependant à tous les entomologistes prédécesseurs de M. Klug (*), savoir : que la marge des élytres, à l'endroit où elle se courbe vers l'extrémité, est assez fortement échancrée ou comme repliée et forme presque une petite dent après ce pli.

ANTHIA CRUORICOLLIS SCHOENHERR.

Atra, thorace femoribusque sanguineis, elytris oblongis profunde quadri-sulcatis, macula humerali et margine obsolete albo-tomentosis.


Habitat ad Caput bonæ Spei, a D. Schoenherr communicata.

Longit. 12 lin. Latit. 4 lin.

A. decemguttatæ affinis, sed minor et magis elongata. Caput magnum, inter oculos depressum inæquale, carinatum, vertice profunde punctatum atrum; labrum magnum, basi transversim impressum, antérieur sub-convexum, utrinque fere emarginatum vix denticulatum; oculi modice prominuli, glauci; antennæ capite cum thorace parum longiores, articulis quatuor baseos nigris, reliquis fusco-pubescentibus.

(*) Jahrbücher der Insektenkunde I. p. 78.

Thorax capite paullo latior, apice truncatus ibique triangulariter impressus, extus mox dilatatus, sed ad tertiam partem abrupte introrsum flexus ibique angulum fere rectum formans, posterius valde angustatus, basi transversim impressa rugoso-punctata subemarginatus, angulis ipsis prominulis acutis, lateribus tenue elevato-marginatus, dorso valde convexus disperse et obsolete punctatus, medio profunde et late canaliculatus, rufo-sanguineus, glaberrimus, nitidus, summo margine anguste nigro. Scutellum breve, triangulare, nigrum. Elytra thorace paullo latiora, sed fere triplo longiora, humeris valde angustata, apice sinuato, singulatim acuminata, in singulo carinae quatuor argute elevatae, in quarum interstitiis series binæ e punctis parvis impressis, sed carinula nulla interjecta ut in *A. 10-guttata*, atra, macula utrinque humerali oblonga et ad carinam quartam extus linea marginalis e pilis albidis, lateribus ipsis nonnihil explanatis, tenue marginatis. Corpus subtus nigro-piceum, disperse punctulatum. Pedes longiusculi, femoribus cum trochanteribus rufo-sanguineis, tibiis piceis, tarsis atris.



CONCHYLIA

TAM TERRESTRIA, QUAM FLUVIATILIA ET E MARIBUS ADJACENTIBUS IMPERII ROSSICI INDIGENA, QUÆ PRO MUTUA OFFERUNTUR HISTORIÆ NATURALIS CULTORIBUS COMMUTATIONE

A J. KRYNICKI

PROFESSORE CÆSARÆ UNIVERSITATIS CHARKOVIENSIS.

ANIMALIA MOLLUSCA

1. GASTEROPODA.

A.) TERRESTRIA.

GEN. 1 VITRINA. DRAP.		Loc. nat.	R. C.
1	Pellucida. Fer. Beryllina. Pf.	(a)	20
2. SUCCINEA. DRAP.			
2	Amphibia Drp. a. Putris. Sturm. β. Amphibia Brard. γ. Lutescens. m. δ. Succinoides. m. ε. Taurica. m.	Ch. id. Polt. Taur.	20 20 25 30

(a) Locum natale talium non est indicatum, quæ magnum Rossicæ spatium occupant.

Obs. Desiderantibus varias habere species, sed propria carentibus ad commutandum collectione, offeruntur illæ pro indicato valore, quo notatas asterisco ipse auctor lubenter accipiet.

		Loc. nat.	R.	C.
3	{ Oblonga. Drp.	Ch.		20
	{ <i>Elongata</i> . Fer.			
	3. HELIX Lam. (a)			
	1.) HELICOGENA . Fer.			
4	{ Lucorum. Müll.	Georg.	1	
	{ <i>β. taurica</i> . m.	Taur.	1	50
5	{ Pomatia. L.			
	{ <i>Cinerascens</i> . Andr.			75
6	{ Ligata. Müll.	Taur.		
	2.) ACAVUS Montf.			
7	{ Arbustorum L.	Podol.	1	
8	{ Atrolabiata m.	Cauc.	1	
9	{ Arvensis. Ziegl.			25
	{ <i>Vindobonensis</i> . Pf.			
10	{ Nemoralis.	Volh.		50
11	{ Hortensis. Müll.	id.		50
	3) HELICODONTA Fer.			
12	{ Bidentata Gmel.	Vol. Lith.		50
13	{ Fulva. Müll.			25
14	{ Contortula. m. (Bul. N° II.)	Cauc.		75
	4.) HELICOGONA . Fer.			
15	{ Planata. Chem *	Taur.	1	
	5.) HELICELLA . Ter.			
	a) <i>Peristomate reflexo</i> .			
16	{ Faustina Ziegl.	Volh.		50
	{ <i>Volhyniensis</i> . Andr.			
17	{ Narzanensis. m.	Cauc.		75
18	{ Pulchella. Drp.			
	{ <i>Costata</i> Müll.			

(a) Vide Helicum descriptio Bull. des Natur. de Moscou, Tom. IX p. 150 et sequ.

	<i>b.) peristomate marginato.</i>	Loc. nat.	R.	C.
	<i>a) corneæ.</i>			
	X UMBILICATÆ.			
19	Fruticum. Mül.			20
20	Strigella Drp.			20
21	Aristata. m.	Cauc.		75
22	Hispida. L.	Taur.		50
	XX. PERFORATÆ.			
23	Fruticola. m.	Taur.		25
24	Montana. Stud.	Tomsk.		75
25	Ravergii Ter.	Cauc. Georg.		75
26	Flaveola. m.	Cauc.		75
27	Carthusianella Drp.	Taur.		20
28	Carthusiana. Drp.	Cauc.		25
29	Olivieri? Ter *	Volh.	1	
30	Globula m.	Cauc.		75
31	Sericea. Müll.			20
32	Depilata. Pf.	Kursk.		75
	<i>b) Calcareæ.</i>			
33	Filimargo. Parr.	Taur.		50
34	Crenimargo. m.	Cauc.		75
35	Ericetorum. Mül.			20
	<i>β. Alba.</i>			20
	<i>γ. Derbentina.</i> Andr.	Georg.		25
36	Neglecta Drp.			75
37	Krynckii Andr.	Taur.		50
38	Arenosa. Ziegl.	id.		75
39	Nivalis. Ménétr. *	Cauc.		
	<i>Alpina.</i> Mén.			
40	Thymorum. Meg.			
	<i>a) candidula</i> stud.			25
	<i>b) taniata.</i> Meg.			25
	<i>c) radiata.</i> Andr.			25
41	Striata. Drp.	Iberia.		75
42	Lunulata. m.	Odessa.		50
	<i>c) peristomate simplici</i>			
	X.) HYALINÆ. Fer.			
43	Filicum. m. *	Georg. Taur.	1	
45	Cellaria. Mül.	Cauc. Taur.		50

		Loc. nat.	R.	C.
45	Diaphanella. m. *	Taur.	1	
46	Nitidosa. Fer.	Ch.		25
47	Lucida. Drp.	id.		20
48	Nitidula Pf.	id.		50
XX VERTICILLI Fer.				
49	Rotundata Müll.	Vollh.		75
50	Ruderata. Stud.	Ch.		75
4.) BULIMUS. Lm.				
a) <i>Ovales.</i>				
51	Hohenackeri. m.	Georgia.		75
52	{ Montanus Drp.			
	{ <i>B. rupestris.</i> m. *	Taur.		75
53	Obscurus. Müll.	Cauc. Lith.		50
b) <i>peristomatides.</i>				
54	{ Merduenianus m.	Taur.	1	
	{ <i>Fragilis.</i> Parr.			
c) <i>turriculati.</i>				
55	Turritella Andr. *	Podol.		75
d) <i>sinistri.</i>				
56	{ Gibber. m.	Taur.		75
	{ <i>Revolutus.</i> Parr.			
e) <i>Nitidissimi.</i>				
57	Nitidissimus. m. *	Taur.	1	
58	Lubricus. Müll.			20
59	Acicula. Müll.	Cauc.		50
5) CHONDRUS. Cuv. (a)				
a) <i>integri.</i>				
60	Fasciolatus. Oliv.	Taur.		25
	{ <i>Lineatus.</i> m.			
	{ <i>Obsoletus.</i> Parr.			
	{ <i>β. turgidus.</i> m.	id.		50

		Loc. nat.	R. C.
61	<i>Fusilabrus</i> . m.	id.	25
	<i>Tauricus</i> . Parr.		
	<i>Cylindricus</i> . Menke.		
	<i>β</i>). <i>Concolor</i> . m.	id.	50
	<i>b) In fundo lamellati.</i>		
62	<i>Bidens</i> . m.	id.	25
	<i>Clausilie formis</i> . Parr.		
	<i>Appendiculatus</i> . Jan.		
	<i>Zebrinus</i> . Ziegl.		
63	<i>Attenuatus</i> . m.	id.	75
	<i>β</i>) <i>Hammeus</i> . Parr.	id.	75
64	<i>Secale</i> Drp.	Volh.	30
	<i>c) Marginibus dentalis.</i>		
65	<i>Major</i> . m.	Caucas.	1
	<i>Pupa 5 dentata</i> . Meg.		
66	<i>Unicallosus</i> . m. *	Taur.	1
	<i>Assimilis?</i> Parr.		
67	<i>Tridens</i> . Müll.		20
	<i>a) Tricallosus</i> Par.		
	<i>b) Elatus</i> . Andr.		
68	<i>Microstomus</i> . Andr. *	Podolia.	1
	6.) VERTIGO. Müll.		
69	<i>Ovularis</i> . Oliv.	Cauc.	75
	<i>Ch. pupoides</i> . m.		
70	<i>Pygmæa</i> Drp.	id. Char.	30
71	<i>Septemdentata</i> . Fer.	id. Kursk.	30
	<i>6. Dentata</i> . Pf.		
72	<i>Pusilla</i> . Müll.	Ch.	25
	7.) PUPA. Cuv.		
73	<i>Umbilicata</i> . Drp.	Cauc. Lith.	50
74	<i>Muscorum</i> Lam.		
	<i>d.) Marginata</i> . Drp.		25
	<i>β.) Unidentata</i> . Pf.	Cauc.	50
75	<i>Minutissima</i> . Pf.	id. Char.	50
	<i>Vert. cylindrica</i> . Fer.		

8.) CLAUSILIA. Drp.		Loc. nat.	R. C.
SINISTRÆ.			
A.) <i>Glabræ, striis oculis nudis inconspicuis</i>			
a.) <i>Margine peristomatis superne adnato.</i>			
76	{ <i>Bidens</i> Drp.		20
77	{ <i>Derugata.</i> Fer.	Volh.	75
	<i>Cornea.</i> Zieg.		
b) <i>Margine per soluto.</i>			
78	<i>Gravida.</i> m.	Cauc.	30
79	<i>Acridula.</i> Par.	Taur.	1
80	<i>Glabrata.</i> m. *	Georgia.	1
B.) <i>Striatæ aut costulatæ</i>			
b.) <i>Mar. per. soluto.</i>			
81	{ <i>Plicata.</i> Drp.	Char.	25
	{ <i>Plicosa.</i> Fer.		
82	<i>Gravidula.</i> m.	Cauc.	30
83	<i>Gracilicosta.</i> m. *	Taur.	75
84	<i>Biplicata?</i> Pf.	Ch.	30
85	<i>Taurica</i> m.	Taur.	40
86	<i>Semilamellata.</i> m.	Cauc.	75
87	<i>Plicatula.</i> Drp. *	Lithua.	50
88	{ <i>Rugosa</i> Drp.	Cauc.	40
	{ <i>β. Subventricosa.</i>	id.	30
89	<i>Crenilabra.</i> m.	id.	75
90	<i>Pumila?</i> Pf.	id.	75
9.) CARYCHIUM. Mül.			
91	<i>Minimum.</i> Mül.	Chark.	30
10.) CYCLOSTOMA Drp.			
92	<i>Costulata.</i> Fer.	Cauc.	25
	{ <i>Rivularis.</i> Eichw.		

B. FLUVIATILIA**X. PULMONATA.****11. PLANORBIS. Brug.***a) Anfractu ultimo rotundato.*

93	Corneus. Drp.		20
94	Contortus. Müll.	Char.	30
95	Hispidus. Drp.	Kursk.	30
96	Complanatus. Eichw. *	Curonia.	75
97	Spirorbis. Müll.	Char.	20
98	Placentula. m.	Kursk. Volh.	75

b.) Anfr. ultimo carinato vel marginato.

99	Marginatus. Drp.		20
100	Carinatus. Müll. *	Cauc.	50
101	Vortex. Müll.	Char.	20
	{ β .) Planissimus. Andr.	id. Volh.	20
102	Nitidus. Müll.	Ch. Lith.	50

12. PHYSA. Drp.

103	Fontinalis. Drp.	Ch.	25
104	Hypnorum. Drp.	Lithu.	40

13. LYMNÆA. Lam.*a) Superficie striata.*

105	Stagnalis. L.		20
106	Auricularia. Lm.		25
107	Ovata. Lm.		20
108	Vulgaris Pf.	Ch. Lith.	20
109	Succinea Nilss. *	Lith.	50

*b) Superficie alutacea, denudata (matte)**d) Apertura mediocri aut spiram superante.*

110	{ Rustica. Andr. *	Volh.	40
	{ β . meridionalis. Andr.	Ch.	40

		Loc. nat.	R.	C.
111	Peregra. Drp.	id.		40
112	Delicatula. Andr.	Ch. Polt.		30
113	Pumila. m.	Ch. Georg.		50
<i>β.) Spira aperturam superante.</i>				
114	Palustris. Drp.	Ch.		20
115	Fusca. Pf.	id. Toms.		25
	<i>β. Longispira.</i> Andr.	id. Lith.		25
116	Minuta. Lm.	Toms.		30
	<i>Longula.</i> Parr.	Faur.		
XX. PECTINIBRANCHIATA.				
14. MELANOPSIS. Fer.				
117	Esperi. Fer.	Borysth.		20
	<i>β. picta.</i> Andr.	id.		20
118	Acicularis. Fer.	id.		20
119	Cornea? Meg.	id.		20
120	Aud. bardii. Prev.	Hypanis.		75
15. VALVATA. Müll.				
121	Piscinalis. Lm.	Ch. Lith.		20
	<i>Obtusa.</i> Pf.			
122	Depressa. Pf.	id.		30
123	Cristata. Müll.	Kursk.		40
	<i>Planorbis.</i> Drp.			
16. PALUDINA Lam.				
124	Vivipara. Lm.			20
	<i>Anatina.</i> Parr.	Taur.		
125	Achatina. Lm.	Ch.		20
	<i>β. Fluviatilis.</i> m.	Ekat. Chers.		20
126	Impura. Lm.			20
	<i>Elongata.</i> Parr.	Taur.		
127	Elevata. m.			20
128	Hypanica. Andr.	Hyp.		25
129	Acuta. Drp.	Taur. Georg.		40
130	Ornata. Andr.	Chers. Taur.		40
131	Eichwaldi m. *	Hyp.		75
	<i>Balthica.</i> Eichw.			
17. LITHOCLYPUS. Meg.				
132	Naticoides. Fer.			20

		Loc. nat.	R.	C.
133	{ Andrzejewskii. m.	Hypan.		50
134	{ <i>Fuscus</i> . Andr.			
134	{ <i>Caspicus</i> . m.	Kisilag.		75
18. NERITINA . Lam.				
135	{ <i>Fluviatilis</i> . L.			20
136	{ <i>Danubialis</i> . Pf.	Podol.		50
	{ <i>d. minor</i>	m. casp.		30
137	{ <i>Prevostiana</i> ? Partsch.	Pod.		25
XXX. SCUTIBRANCHIATA.				
19. ANCYLUS . Geoffr.				
138	{ <i>Lacustris</i> . Mül.	Ch.		40
II. ACEPHALA.				
1. MYTILACEA.				
20. MYTILUS . Lam.				
139	{ <i>Polymorphus</i> . Pall.	Bor. Hyp.		20
	{ <i>Hagenii</i> . Baer.	Az. Casp.		
	{ <i>d.) Oblongus</i>	Chark.		
21. ANODONTA . Brug.				
140	{ <i>Cygnea</i> . Lam.	Kursk.		75
141	{ <i>Cellensis</i> . Pf.	Ch. Astrach.		50
142	{ <i>Ventricosa</i> . Pf.	Ch.		40
143	{ <i>Anatina</i> . L.	Ch. Lith.		40
144	{ <i>Borysthenica</i> . m.	Chers. Ekath.		50
145	{ <i>Intermedia</i> . Lm.	Ch.		25
146	{ <i>Ponderosa</i> ? Pf. *	Casp. Orient.		
22. UNIO . Brug.				
x.				
147	{ <i>Pictorum</i> . Lam.	Ch.		40
	{ <i>Rostrata</i> . Pf.			
148	{ <i>Limosa</i> . Nilss.	id.		30
	{ <i>Pictorum</i> . Pf.			

		Loc. nat.	R.	C.
xx.				
149	Tumida Nilss.			25
	<i>β. Radiolata.</i>			25
xxx.				
150	Batava. Lm. *	Curonia?		75
151	Steveniana. m.	Taur.		50
	<i>β. Batava?</i> Nils.	Ch.		60
152	Riparia. Pf. *	Astrach.		50
153	Atra. Nils. *	Lith.		50
23. CYCLAS. Lm.				
154	Rivicola. Lm.	Ekat. Vollh.		30
	<i>β. Sabulicola.</i> m.	Ch.		20
155	Cornea. Lm.	Kurs. Tomsk.		30
	<i>β. Fossarum.</i> m.	Ch.		50
156	Tumida. Fer. *	Vollh.		70
157	Lacustris. Drp.	Ch. Ekath.		25
24. PISIDIUM. Pf.				
158	Obliquum. Lm.	Ch.Ek.Tomsk.		25
159	Obtusale. Pf.	Ch.		50
160	Fontinale. Pf.	Kurs. Lith.		30
25. CYRENA. Lm.				
161	Fuscata. Lm. *	Georgia.		75
	<i>Fluminalis.</i> Mül.	(Lenkoran)		
G. MARINA.				
I. GASTEROPODA.				
1. Entomostoma.				
26. CERITHIUM. Brug.				
162	Vulgatum. Brug.	Euxinus.		50
163	Ferrugineum. Brug.	id.		20
	<i>Exile.</i> Eichw.			
27. BUCCINUM. Lm.				
164	Linnei (Mitra) Risso. *	Eux.		75
165	Steveni (Pleurotoma) Andr.	id.		75

		Loc. nat.	R.	C.
28. NASSA. Lm.				
166	Reticulata. Lm.	id.		20
167	Cancellata? Gm. *	id.		75
168	Neritea. Lm. (Cyclope). . . .	id.		25
II. ANGYOSTOMA.				
29. COLUMBELLA. Lm.				
169	Rustica. Lm.	id.		50
30. CONUS. L.				
170	Adansonii? Lm.	id.		50
31. MITRA. Lm.				
171	Semistriata. m. *	id.	1.	
III. GONIOSTOMA.				
32. FROCHUS. Lm.				
172	Tessellatus. Gm.	id.		40
173	{ Cinerarius. Lm. Versicolor. Andr.	id.		60
174		id.		30
175	Euxinicus. Andr.	id.		30
IV. ELLIPSOSTOMA.				
33. LITTORINA. Fer.				
176	Melanostoma. m.	Eux.		25
34. RISSOA. Frem.				
177	Violæstoma. m.	id.		20
178	Cylindræa. m. *	id.		75
35. PHASIANELLA. Lm.				
179	Vicuxii. Riss.	id.		50
180	Pullus. Gm.	id.		20
V. RETIFERA.				
36. PATELLA. Lm.				
181	Vulgata. L.	id.		20

		Loc. nat.	R.	C.
	37. CALYPTRÆA . Lm.			
182	Mamma. m.	id.		40
	I. ACEPHALA.			
	1. <i>Ostracea</i> .			
	38. OSTREA Brug.			
183	Taurica. m.	id.		20
	{ <i>Adriatica</i> ? Lm.			
	{ <i>Edulis</i> . Auct. nostr.			
	II. SUBOSTRACEA.			
	39. PECTEN . Brug.			
184	Unicolor? Lam.	id.		30
185	Griseus. Lm.	id.		60
	III. MYTILACEA.			
	40. MYTILUS . Lam.			
186	{ <i>Edulis</i> . L.	id.		30
	{ <i>Præmæus</i> . Andr. (junior). . . .			
187	Pes pecoris. m.	id.		60
188	Abbreviatus? Lm.	id.		75
189	Lineatus. Gm.	id.		50
190	Scaber. m.	id.		30
	IV. CONCHACEA.			
	41. CARDIUM . L.			
191	Edule. L.	id.		40
192	Rusticum. L.	id. Az. Casp.		20
193	Trigonoides. Pall.	Casp.		25
194	Eichwaldi. m.	id.		40
	<i>Crassum</i> . Eichw. (a).			

(a) Gmelin Syst. Nat. 3254. n. 35. aliam speciem. *C. Crassum* nominavit.

		Loc. nat.	R. C.
42. DONAX. L.			
<i>Margine Crenato.</i>			
195	Anatinum. Lm.	Eux.	20
196	Julianæ. Andr.	id.	75
197	{ Fabagella. Lm.	id.	75
	{ Radiata. Andr.		
<i>Margine Integro.</i>			
198	{ Elliptica. m.	id.	60
	{ Vittata? Lm.		
43. FELLINA. Lm.			
199	Fragilis. Gm.	id.	60
200	Angusta. Gm. *	id.	1.
201	Donacina. Lm.	id.	75
202	Incarinata. L.	id.	20
203	Solidula. Lm.	id.	60
	<i>Loripes roseus. Andr</i>		
204	Balthica. L.	Balt.	30
44. LUCINA. Lm.			
205	Lactea. Lm. (<i>Loripes Poli</i>).	Eux.	20
206	Trifaria. m. *	id.	75
45. AMPHIDERMA. Lm.			
207	Lactea. Lm.	id.	30
208	Caspia. m. (a). *	Casp.	1.

(a) C'est la même coquille, que je connais déjà depuis quelques années, et que j'ai reçue nouvellement de M. Ménétrés sous le nom d'*Hypanis plicata*. Pander. Ménétr. Cat. rais. p. 271. n°. 1307, où il cite comme synonyme *Glicimeris plicata* Eichw. Zool. spec. I. 279. V. 2. Mais c'est une vraie *Amphidesma* Lam. ou à cause de sa superficie externe treillissée *Corbis* ejusdem. Il faut seulement observer que, dans les genres *Lucina*, *Amphidesma* et dans quelques autres, les coquilles jeunes montrent très souvent les dents latérales, qui s'ef-

		Loc. nat.	R. C.
46. MACTRA. Lm.			
209	{ Euxinica. m.	Eux.	60
	{ <i>Crassatella</i> ? Lm.		

facent avec l'âge; c'est ce qui se présente précisément dans notre coquille. La fossette interne ligamentaire est très petite et raccourcie, ce qui dépend de la petitesse de la coquille. Je doute qu'elle soit la même que la *Glyc. plicata*. Eichw. Elle est plus petite, pas blanche, mais constamment rose-intense, son bord inférieur est parfaitement lisse, point dentelé, la ligne supérieure pas droite, comme la montre la figure, mais courbée au sommet. etc. En voici la description.

Amphidesma caspia. Mihi.

Testa ovato-subtrigona, compressa, subæquilatera, tenui, fragili, pellucida, longitudinale striata, verticaliter radiatim sulcata, sordide rosea; inferne et in extremitatibus fere æqualiter rotundata, postice parum attenuata; ad umbones tumidula; natibus medianis, elevatis, acutiusculis; dente cardinali unico, cum foveola adjecta brevissima, laterali postico manifesto.

long. $6\frac{1}{2}$ alt. $5\frac{1}{4}$ crass. $2\frac{1}{2}$.

Incola...

Hypanis plicata. Pand. Ménétr. l. c.

Superficies conchæ uti in *Cardiis* costulis verticalibus, acutis minime deplanatis, circiter 30, exarata, quæ in pagina interna etiam bene sunt conspicuæ. Pubes distincta, parum compressa et carinata, clathrata rugosiuscula; inter stria longitudinales observantur adhuc sulci inæquales, unde superficies clathrata, quasi subantiquata. Ligamentum externum breve, sordide flavescens. Impressio musculi postici rotundata, cum sinu adjecto elongato et satis largo *Lucinis* proprio. Cardinis dentes communiter in junioribus evidentes in adultis plus minusve evanescent. Postice hians.

		Loc. nat.	R.	C.
	47. VENUS . Lm.			
210	Gallina. L.	Eux.		20
211	Corrugatula. m.	id.	1.	
	<i>Gallinoides</i> . Andr.			
212	Ochropicta. m.	id.		60
	48. VENERUPIS . Lm.			
213	Irus (Donax. L.).	Eux.		50
	49. CORBULA . Lm.			
214	Caspia? Eichw.	Casp.		40
	V. PYLORIDEA.			
	50. SOLENI . Lm.			
215	Vagina? Lin. *	Eux.		75
	51. GLYCIMERIS . Lm.			
216	Colorata. Eichw.	Azov. Hyp.		50
217	Læviuscula. Eichw.	Casp.		50
218	Edentula. Pall.	id.		50
	VI. NEMATOPODA.			
	52. BALANUS . Lm.			
219	Miser. Lm.	Azov.		25
220	Euxinicus. Andr.	Eux.		60
	<i>Eichwaldi</i> ? Dwig.			

SÉANCES

DE LA

SOCIÉTÉ IMPÉRIALE DES NATURALISTES

DE MOSCOU.

SÉANCE DU 20 JANVIER 1837.

Ouvrages offerts.

Du Système de l'Histoire russe pragmatique par M. OUSTRIALOFF; de la Théorie Générale de l'équilibre appliquée à l'équilibre des fluides et à la détermination de la figure de la terre par M. TCHJOFF; par l'Université Impériale de St. Pétersbourg.


Le Bulletin de la Société géologique de France, par la Société.

Ischl und seine Soolenbäder 3 vol in-8; par M. VERING de Vienne.

Catalogue d'oiseaux empaillés, à vendre, par l'auteur M. Boissonneau de Paris.

Objets offerts.

M. WUNDERLICH de Sarepta envoie une collection de plantes sèches recueillies dans les environs de cette ville.



BULLETIN

DE LA

Société Impériale

DES NATURALISTES

de Moscou.


ANNÉE 1837.

N° III.

Moscou,

DE L'IMPRIMERIE D'AUGUSTE SEMEN,
IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE MÉDICO-CHIRURGICALE.

1837.



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,
съ шѣмъ, чшобы по оппечашаніи предспавлены были въ Ценсур-
ный Компшешъ шрд экземпляра. Москва, Марша 5 дня, 1837 года
Ценсоръ и Кавалеръ *И. Снегиревъ*.

DESCRIPTION

DE

QUELQUES GENRES NOUVEAUX

ET

DE QUELQUES ESPÈCES NOUVELLES OU INÉDITES

DE

CARABIQES,

par M. le Baron M. de CHAUDOIR.



1. CICINDELA DREGEI. NOBIS;

C. Subcylindrica, obscure ænea, lunulis humerali interrupta, apicali abbreviata, striga media transversa arcuata, punctisque disci tribus albidis, tibiis fulvescentibus.

Elle ressemble beaucoup à *l'ægyptiaca* KLUG, elle est plus petite, et d'une couleur plus obscure, la tête est moins grosse, et les yeux sont moins saillants; le corselet est moins long, et les élytres présentent un dessin fort différent; la lunule humérale et le point qui la suit, sont les mêmes que dans cette espèce; au milieu de leur longueur, on voit une petite ligne arquée, dont la partie convexe est tournée vers la base; un peu au dessous de la pointe qui

regarde la suture on remarque un point blanc, formant comme la partie inférieure de la bande du milieu; derrière ce point, un peu plus près du bord extérieur, un autre point blanc; enfin la lunule de l'extrémité s'arrête à l'angle extérieur; le dessous du corps est comme dans *l'ægyptiaca*, les jambes seules sont d'un jaune clair avec quelques reflets verdâtres.

Cette jolie petite espèce a été rapportée du Cap de Bonne Espérance par M. Drège, qui a dernièrement exploré avec succès cette riche contrée, et en a rapporté nombre d'espèces rares ou même entièrement nouvelles.

2. CALLEIDA AFFINIS. NOBIS.

Rufoferruginea, subtus dilutior, elytris viridibus, striatis, oculis geniculisque nigricantibus.

Elle est de la forme et de la grandeur de *l'Angustata* DEJ. dont elle diffère par la tête, qui est entièrement d'un rouge ferrugineux; par le corselet, dont les points sont remplacés par des rides transversales; et par les élytres, dont le bord inférieur est de la couleur du dessus. Les stries sont plus marquées et plus fortement ponctuées, les intervalles sont plus relevés, et le dessous du corps est entièrement d'un rouge ferrugineux, beaucoup plus pâle que le dessus de la tête et du corselet.

Elle a été rapportée du Cap de Bonne Espérance par M. Drège, qui me l'a envoyée sous le nom

d'angustata, mais c'est évidemment une espèce distincte.

Elle se placera entre la *fasciata* et l'*angustata* DEJ.

COPTOPTERA. NOBIS. Nov: gen:

Caractères du genre:

Crochets des tarsi dentelés en dessous; lèvre supérieure carrée, plane, légèrement échancrée antérieurement. Une forte dent pointue au milieu de l'échancrure du menton. Palpes avancés, dernier article ovalaire, légèrement tronqué. Antennes filiformes, minces, premier article beaucoup plus court que la tête, à peine plus gros que les suivants, le second assez court, le 3-ème un peu plus long que le premier. Pattes assez fortes, cuisses postérieures renflées; tarsi cylindriques. Tête en ovale allongé, unie au corselet par un col peu marqué. Corselet carré, élytres allongées, tronquées et échancrées à l'extrémité.

3. COPTOPTERA BRUNNEA. NOBIS.

Brunnea, elytris crenatostriatis.

Elle a quelque rapport de forme avec le *Dromius longiceps* DEJ.

La tête est en ovale allongé, lisse, avec deux impressions longitudinales entre les yeux; ceux-ci ne sont nullement proéminents. Le corselet est un peu plus large que la tête, peu arrondi sur les côtés, aussi long que large, échancré antérieurement, à

angles postérieurs arrondis; bords relevés, et largement déprimés, les 3 impressions assez marquées, une fossette peu marquée de chaque côté de la base. Elytres alongées, un peu rétrécies antérieurement, planes, striées, à stries crénelées, coupées carrément et fortement échancrées à l'extrémité.

Elle a aussi été rapportée du Cap de Bonne Espérance par M. Drège.

Ce nouveau genre doit être placé entre les *Démétrias* et les *Dromius*.

4. APTINUS HALTERI. DREGE.

Niger, elytris costatis, capite pedibus thoraceque nigrocincto, rufis.

Il est un peu plus grand que le *Nigripennis* FABR : auquel il ressemble beaucoup; il n'en diffère que par le corselet, qui est un peu plus long que large, moins arrondi sur les côtés, plus lisse, moins convexe et dont les bords sont noirs.

Il a été rapporté du Cap de Bonne Espérance par MM. Drège et Ecklon. Le premier me l'a envoyé sous le nom que je lui ai conservé; le second, l'a nommé *rufipes*, dans son Catalogue imprimé.

Il doit être placé après le *Nigripennis*, et semble former le passage entre cette espèce et le *Ballista*, ILL:

5. BRACHINUS CONVEXUS. NOBIS.

Capite, thorace, antennarum basi pedibusque ferrugineis, thorace longiore cordato, postice coarctato, angulis baseos acute prominulis, elytris dilatatis, majoribus, parallelis, valde convexis, subcostatis, virescentibus, antennis abdomineque piloso, obscuris.

Il est un peu plus grand que le *Mexicanus* DEJ. auquel il ressemble beaucoup, et avec lequel il a été confondu. Il en diffère par les yeux plus proéminents, et par les élytres proportionnellement plus grandes, moins rétrécies antérieurement, plus convexes, à angles postérieurs plus rabattus, enfin par les pattes plus longues.

Il se trouve au Mexique, et doit être placé avant le *Mexicanus*. DEJ.

6. BRACHINUS CINCTIPENNIS. CHEVR:

Capite thoraceque ferrugineis, elytris lateviridibus, sutura latius, margine subtus ferrugineis, antennarum basi, pedibusque rufis, geniculis, corpore que subtus obscuris.

Il ressemble un peu au *Sclopeta*, mais, il est de la taille du *Bombarda*.

La tête est à peu près comme dans le *Sclopeta*. Le corselet est moins allongé, carré, moins rétréci postérieurement; les angles de la base sont très-saillants, les impressions très-fortement marquées,

surtout la postérieure. Les élytres sont plus larges, et moins arrondies près de l'angle huméral; elles sont d'un beau vert bleuâtre, avec une large suture, et tout le bord extérieur en dessous d'un rouge ferrugineux, les côtes des élytres sont à peine sensibles; le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les deux premiers articles des antennes sont rouges, les autres manquent dans l'individu que je possède; les pattes sont d'un jaune rougeâtre, avec l'extrémité des cuisses noires.

J'ai reçu cette espèce de M. Chevrolat, comme venant du Mexique et sous le nom que je lui ai conservé.

Il doit être placé entre le *Bombarda* ILL: et le *Sclopeta* FABR:

7. DYSCOLUS NITIDUS. NOBIS.

Nigro æneus, nitidus, thorace elongato, postice subangustato, elytris apice sinuatis, striatis, punctisque duobus pone medium impressis pedibus piceis.

De la taille du *Brunneus*. DEJ., proportionnellement plus allongé, d'une couleur d'acier foncée en dessus. La tête est comme dans cette espèce, les palpes et les antennes sont bruns. Le corselet est plus marqué et les angles de la base sont arrondis au sommet. Les élytres sont un peu plus sinuées à l'extrémité, et les points sont tous deux placés

après le milieu de leur longueur. Les pattes sont d'un brun rougeâtre.

Il se trouve au Mexique et doit être placé après le *Brunneus*. DEJ.

8. CATASCOPIUS RUFIFEMORATUS. NOBIS.

Supra viridis, subtus nigrocyaneus, abdominis medio dilutior, elytris striatopunctatis, punctisque tribus impressis, antennarum basi, femoribusque rufis.

La description que donne M. Gory de son *C. rufipes* dans les Annales de la société entomologique de France 1833 p. 204, paraîtrait convenir à mon insecte, mais celui-ci est plus grand, sa couleur entièrement verte, avec le dessous du corps d'un noir bleuâtre, et le milieu de l'abdomen d'un rouge ferrugineux ; les antennes sont brunes avec le premier article d'un rouge ferrugineux ; les cuisses sont de cette dernière couleur, les jambes et les tarses d'un brun foncé.

Il m'a été envoyé par M. Drège, comme venant du Cap de Bonne Espérance. Il doit être placé après le *Senegalensis*. DEJ.

AXINOPSOPHUS. NOBIS.

Caractères du genre :

Crochets des tarsi sans dentelures. Dernier article des palpes aplati, tronqué obliquement, sécuriforme, surtout dans les labiaux. Antennes filiformes.

mes, beaucoup plus courtes que le corps. Lèvre supérieure presque transverse, coupée carrément antérieurement. Mandibules avancées, arquées et aigues. Menton échancré carrément, sans dent visible. Tête allongée, jointe au corselet par un col très-large. Yeux proéminents. Corselet transversal, cordiforme, prolongé à la base. Elytres en carré allongé, sans échancrure. Articles des tarses décroissants vers l'extrémité; dernier article très-long.

9. AXINOPSOPHUS QUADRISIGNATUS. NOBIS.

Niger, capitis collo, thorace, elytrorumque maculis quatuor ferrugineis, antennis nigropiceis, basi rubris, corpore subtus fulvescente, abdominis apice piceo, femoribus rubris, geniculis, tibiis tarsisque nigropiceis pagina superiore punctata, elytris striato punctatis.

Cet insecte a le port d'une LEBIA, mais il en diffère beaucoup par ses caractères génériques. La tête est noire, avec la partie postérieure et le col d'un rouge ferrugineux; elle est presque carrée, fortement ponctuée, avec deux impressions entre les yeux. Les yeux sont noirs. Les antennes d'un brun noirâtre, avec le premier article d'un rouge ferrugineux. Les palpes sont de la même couleur, avec le dernier article d'un brun beaucoup plus clair. Le corselet est plus large que la tête, assez court, échancré antérieurement, fortement arrondi sur les côtés antérieurement, un peu rétréci postérieure-

ment, à angles postérieurs droits presque saillants, prolongé au milieu de la base comme dans le genre *LEBIA*, fortement ponctué en dessus, peu convexe, à bords fortement relevés, et avec les 3 impressions, et les fossettes de la base bien marquées; sa couleur est, tant en dessus qu'en dessous, d'un rouge ferrugineux. Les élytres sont plus larges que le corselet, plus longues que larges, presque parallèles, coupées carrément à l'extrémité avec l'angle extérieur bien arrondi, peu convexes, ponctuéées et striées, à stries fortement ponctuéées, et à intervalles un peu relevés. Elles sont d'un noir assez brillant, avec deux taches d'un jaune testacé sur chacune d'elles; ces taches sont assez grandes, ovales en longueur; la première est placée près de la base entre la 2^e et la 6^e strie, la seconde près de l'extrémité, touche presque à la suture et s'étend jusqu'au milieu du 5^e intervalle. Le dessous du corps est d'un jaune rougeâtre avec le bord extérieur et postérieur des 3^e, 4^e, et 5^e segments, et tout le dernier segment de l'abdomen d'un brun noirâtre. Les cuisses sont rouges, avec l'extrémité, les jambes et les 4 tarsi postérieurs d'un brun noirâtre. Ceux de la première paire sont d'un brun roussâtre.

Ce joli insecte a été aussi rapporté par M. Drège du Cap de Bonne Espérance.

Ce nouveau genre doit précéder le genre *Eucheila* DEJ. et tous deux me paraîtraient convenablement placés avant les *Eurydera* LAPORTE, ou les *Thyreopterus* DEJ.

10. THYREOPTERUS MACULATUS. NOBIS.

Nigropiceus, subpubescens, thorace breviori, coleoptris tenue striato-punctatis, maculis angulatis sinuatis tribus, femoribusque flavis.

Il ressemble beaucoup au *Flavosignatus*. DEJ. La tête est comme dans cette espèce, à l'exception que les yeux sont tous blancs, la lèvre supérieure et les mandibules d'un brun noirâtre. Le corselet est plus court, presque transverse, plus arrondi sur les côtés; les bords sont plus relevés, et l'impression transversale antérieure est plus marquée. Les élytres sont plus larges, plus échancrées à l'extrémité, et la suture est terminée par une dent obtuse.

Cette espèce se rapproche tellement du *Flavosignatus*, que je ne l'en aurais pas séparée, si je n'en avais vu un individu parfaitement semblable au mien, dans la belle collection de M. Reich, à Berlin. Il a été rapporté du Cap de Bonne Espérance par M. Drège, et doit être placé après le *Flavosignatus* DEJ.

11. GRAPHIPTERUS RECTILINEATUS. NOBIS.

Niger, thoracis margine albido, elytris nigris, margine latissime, lineaque recta juxtasuturali ad basim cum eo conjuncta, albopilosis.

Il est plus petit que le *Trilineatus*. FABR., d'un plus beau noir; la tête est un peu plus petite que dans cette espèce. Le corselet est un peu plus court et plus découpé à la descente postérieure des côtés.

La ligne blanche des élytres, parallèle à la suture, est droite et partout également large. Le crochet qui termine inférieurement le bord extérieur, remonte moins le long de la suture.

Il m'a été envoyé comme venant du Cap de Bonne Espérance. Je l'ai aussi reçu de M. Klug, sous le nom de *bilineatus*. Il doit être placé après le *Trilineatus* FABR :

12. SCARITES TAURICUS. NOBIS.

Niger, tibiis anticis 3 dentatis, postice bidenticulatis, capite rugosissimo, elytris ovatis, convexioribus, distincte striatopunctatis, punctis duobus impressis.

Il est un peu plus petit que le *Lævigatus*, auquel il ressemble beaucoup. La tête est plus fortement rugueuse dans toute sa longueur. Le corselet est moins échancré antérieurement, moins prolongé à sa base. Les élytres sont plus courtes, plus ovales, plus convexes, et les stries ponctuées plus distinctes.

Il a été rapporté de Crimée par M. Wavre, à la bonté duquel je le dois. Sa place est après le *Lævigatus*.

13. MORIO CORDATUS. NOBIS.

Niger, nitidus, thorace cordato, elytris elongatis, postice subattenuatis, profunde striatis.

Il est presque de la forme et de la grandeur du *Monilicornis* LATR. La tête est un peu plus étroite

derrière les yeux. Le corselet plus rétréci postérieurement, plus plane ; ses côtés sont plus sinués près de la base, les angles postérieurs plus aigus et plus saillants. Les élytres vont un peu en se rétrécissant vers l'extrémité, la punctuation des stries est aussi plus fine.

Il se trouve au Mexique. Il doit être placé avant le *parallelus* KLUG, et après le *Monilicornis*. LATR.

14. CYCHRUS PYGMAEUS. NOBIS.

Niger, capite thoraceque punctulatis, hoc postice leviter transversim impresso, angulis baseos omninorotundatis, minime que reflexis, elytris angustioribus, granulatis, lineis elevatis vix distinctis.

Il ressemble beaucoup au *Rostratus*, Fabr. mais il est plus petit. La tête est à peu près comme dans cette espèce, les impressions entre les yeux sont plus marquées. Le corselet est un peu moins rétréci postérieurement, plus convexe dans sa partie antérieure, l'impression transversale de la base est moins profonde, la longitudinale l'est au contraire davantage; les angles postérieurs sont encore plus arrondis, et nullement relevés. Les élytres sont proportionnellement plus petites et plus étroites, et les lignes élevées sont à peine visibles.

Il habite les monts Carpaths. J'en ai reçu un exemplaire de M. Parreyss sous le nom d'alpinus. Il doit être placé après le *Rostratus*. FABR.

15. CYCHRUS SCHMIDTII. PARR :

Nigro piceus, supra æneo micans, rugosopunctatus, capite longissimo, thorace fere globoso, postice producto, lateribus vix carinato, angulis posticis rotundatis, elytris magnis, disco depressiusculis, profunde rugoso punctatis, carina laterali vix perspicua.

Long : , 7 lign : , larg : , 2, $\frac{5}{2}$. lign.

Cette espèce ne ressemble à aucune des espèces connues, et paraît se rapprocher des *Sphæroderus* par la forme du corselet. La tête est très allongée et très mince, dilatée postérieurement, finement granulée, avec deux impressions bien marquées entre les antennes; les mandibules sont parallèles, et les yeux sont aussi saillants. Le corselet est ovale, plus long que large, coupé carrément antérieurement, un peu arrondi sur les côtés et postérieurement; la carène est si peu marquée que, de dessus, on aperçoit les bords inférieurs du corselet; il y a une impression transversale peu marquée près du bord antérieur, une autre près de la base, qui l'est beaucoup plus; les angles postérieurs, quoique marqués, sont arrondis. Les élytres sont grandes, ovales, peu convexes, surtout dans leur milieu, beaucoup plus fortement granulées que dans le *Rostratus*, moins fortement carénées sur les bords; le dessus du corps est d'un brun noirâtre un peu bronzé. Le dessous, les pattes, les antennes et les palpes sont de

la même couleur, sans reflet bronzé; les mandibules sont d'un brun roussâtre.

Il m'a été envoyé par M. Parreyss, comme venant des mêmes pays que le précédent, et sous le nom que je lui ai conservé. Il doit être placé avant *l'Angusticollis*. FISCHER.

16. CARABUS. BUGNIONII. NOBIS.

Elongato ovatus, subdepressus, supra auro-cupreus, thorace quadrato, lateribus vix rotundatis; elytris subconvexis, obsolete crenato-striatis, margine foveolisque triplici serie aureis, antennarum basi, tibiis tarsisque rufis.

Il ressemble beaucoup au *Fabricii*. MEGERLE, et n'en diffère que par la tête qui paraît un peu plus renflée postérieurement, par le corselet dont les côtés sont beaucoup moins arrondis, un peu sinués près de la base; par les angles postérieurs plus alongés et les fossettes de la base plus effacées; enfin par les élytres dont les points et le bord sont d'une couleur dorée brillante, comme dans *l'Irregularis*. FABR :

Plusieurs exemplaires de cette jolie espèce ont été trouvés par M. Lasserre et moi dans les Alpes de la Suisse, au sommet du Faulhorn, sous des pierres. Il doit être placé après le *Fabricii*. MEC :

17. *NEBRIA LUGDUNENSIS*. NOBIS.

Rufopicea, subdepressa, elytris leviter crenatostratis, stria tertia. 3 — 4 punctata, angustioribus, subparallelis, antennis pedibusque rufis.

Elle est plus petite que la *Brevicollis*, et sa couleur est moins foncée. La tête est un peu plus étroite et plus lisse; les parties de la bouche et les antennes sont entièrement d'un rouge ferrugineux. Le corselet est un peu plus long, moins arrondi sur les côtes, plus échancré à la base, moins fortement ponctué à la base, et nullement sur les bords latéraux, et sur le bord antérieur, les bords latéraux sont aussi plus relevés. Les élytres sont plus en ovale, plus étroites, plus déprimées, l'angle huméral est tout à fait arrondi, les stries sont moins fortement crénelées et les intervalles sont plus planes. Les pattes sont entièrement d'un rouge ferrugineux.

Je l'ai reçue de M. Lasserre comme venant des environs de Lyon. Elle doit être placée après la *Brevicollis*.

18. *NEBRIA CORDICOLLIS*. NOBIS.

Nigra, thorace cordato, elytris elongato ovatis, striatopunctatis, punctisque quinque impressis, antennis tarsisque nigropiceis.

Elle est plus longue et plus étroite que la *Laticollis*, BON: La tête est comme dans cette espèce, les derniers articles des antennes sont plus foncés. Le corselet est plus étroit, plus long, et plus rétréci postérieurement; l'impression transversale pos-

térieure est moins marquée, les angles de la base sont moins pointus, et celle-ci est moins échancrée en arc de cercle. Les élytres sont beaucoup plus étroites, plus allongées, un peu rétrécies antérieurement; les stries sont distinctement ponctuées, et les intervalles sont plus relevés. Le dessous du corps et les pattes sont noirs, les tarses seuls ont une teinte rougeâtre.

Elle habite à 6—7000 pieds d'élevation les montagnes qui avoisinent le mont Rose. Elle doit être placée après la *Laticollis*, BONELLI.

19. *NEBRIA PLANIUSCULA*. NOBIS.

Nigra, nitida, elytris elongatis, postice dilatatis, crenato striatis, antennis tarsisque piceis.

Elle est plus étroite que la *Castanea*, BONELLI, et presque entièrement d'un noir brillant. La tête est comme dans cette espèce, les yeux sont plus saillants; les antennes d'un brun rougeâtre, avec les 3 et 4 articles plus obscurs. Le corselet est un peu plus plane, plus allongé, plus rétréci postérieurement; les bords latéraux sont plus relevés près des angles postérieurs, et la base est moins échancrée en arc de cercle. Les élytres sont très planes, assez allongées, et vont en s'élargissant de la base, où elles sont assez étroites vers l'extrémité. Le dessous du corps et les pattes sont d'un noir brillant, les tarses d'un brun rougeâtre.

Elle habite les mêmes endroits que la précédente, et doit se placer après la *Castanea*, BONELLI.

20. PANAGAEUS PRETIOSUS NOBIS.

Niger, thorace hexagono, breviori, profunde punctato, elytris oblongo-ovatis, striatis, maculis duabus, altera baseos majori, altera minori apice, subtransversis.

Il est de la grandeur du *Nobilis*. DEJ. : mais la description et la figure que donne M. Klug de son *P. festivus* dans son ouvrage sur les insectes de Madagascar, lui conviennent beaucoup plus. Il en diffère seulement par l'impression longitudinale du corselet plus marquée, par les côtés de celui-ci formant un angle arrondi au sommet, par les élytres qui ne sont point pubescentes, dont les stries sont ponctuées et crénelées, les points des intervalles disposés en series longitudinales, enfin par les taches qui paroissent moins larges et plus arrondies.

Il a été rapporté par M. Drège du Cap de Bonne Espérance, et doit être placé après le *Nobilis*. KLUG.

21. CHLAENIUS GRATIOSUS. NOBIS.

Supra laete viridis, pubescens, capite thoraceque viridiæneis; thorace subquadrato, punctulato, elytrorum striis punctulatis, interstitiis granulatis, antennis basi pallidis, apice nigris, palpis pedibusque testaceis, abdomine piceo.

Il ressemble beaucoup au *terminatus*. DEJ. mais il n'a pas de bordure jaune. Il est d'une couleur verte plus dorée sur la tête et sur le corselet, et plus claire sur les élytres; le corselet est un peu plus arrondi sur les côtés, et ses angles postérieurs

sont plus relevés. Les trois premiers articles des antennes sont d'un jaune plus clair que les pattes, et les suivants d'un noir obscur.

Il se trouve à Kiew et en Volhynie, et doit se placer avant le *C. Schrankii*. DUFTSCH :

22. OODES SIMILIS NOBIS.

Oblongus, niger, thoracis margine postice pellucido; elytris elongatis, parallelis, tenue punctatostriatis.

Il est un peu plus grand que l'*Helopioides*, plus allongé, plus parallèle; le corselet est plus arrondi sur les côtés, et un peu moins rétréci antérieurement; les élytres sont plus longues, en forme de rectangle dont les angles sont arrondis; les intervalles sont moins relevés.

Cet insecte est, je crois originaire d'Allemagne. Il doit être placé avant l'*Helopioides*. FABR.

23. BADISTER DILATATUS. NOBIS.

Supra obscure nigroæneus; thorace brevi latiore, marginibus postice minus reflexis, foveola utrinque ad basim impressa, elytris latioribus, ad scutellum excavatis, striatis, striis lævibus, parum profundis.

Il est un peu plus grand que le *Peltatus*, et proportionnellement beaucoup plus large. Le corselet est plus court, plus large, et les angles postérieurs sont moins relevés; la couleur des pattes est plus foncée et moins mélangée de vert.

Il habite l'Allemagne et doit se placer avant le *Peltatus*.

NOTICE

SUR LES AVANTAGES

DES MICROMÈTRES

AU Foyer de L'OCULAIRE

DANS

LES MICROSCOPES COMPOSÉS,

ET

SUR LA MANIÈRE DE LES Y PLACER;

PAR

LE PROFESSEUR ALEXANDRE FISCHER.

4. Quelqu'ingénieux qu'aient été les moyens employés par nos aïeux pour mesurer les dimensions des corps microscopiques, ils ont dû cependant, et à juste titre, céder la place au verre et à la vis micrométriques, qui, seuls à notre époque, restent en usage, vu la facilité de leur emploi et l'exactitude des résultats obtenus par leur secours. Les grands progrès, faits de nos jours dans les arts mécaniques, n'ont pas médiocrement contribué à porter ces instrumens à ce haut degré de perfection, qui seul pouvait leur garantir ce succès.

2. Et ils le méritent en effet, car leur usage combiné nous met à même de mesurer toute espèce

de corps microscopiques, quelque'exigus qu'ils soient, transparens ou opaques, immobiles ou en mouvement. Cependant ils ne sont pas exempts de défauts; l'insuffisance de l'un d'eux pour tous les cas, est déjà par elle-même une des imperfections les plus essentielles.

3. En effet, si d'abord nous arrêtons notre attention sur la vis micrométrique (ou le micromètre à vis) nous trouverons qu'à un usage facile elle unit un très haut degré d'exactitude, car elle donne avec facilité la mesure d'un cent-millième de pouce directement, et avec l'œil on pourra y apprécier même encore la quatrième et peut être une moindre partie; de plus elle est propre à mesurer les corps transparens et opaques, ce qui la rend surtout précieuse pour l'anatomie végétale.

4. Mais en revanche elle a aussi de grands défauts. Les corps doués d'un mouvement quelconque, spontané, comme les Infusoires; automatique, comme les graines polliniques et les atômes de presque tous les corps; oscillatoire, comme les corps immotiles de la nature, observés nageant dans une goutte d'eau souvent tremblante sur le porte-objet; ne sauraient être mesurés par son aide. Ajoutez-y la grande perfection d'art que sa construction demande, et qui fait doubler le prix d'un instrument même achromatique; ajoutez-y le détériorement qu'elle peut subir par un fréquent usage dans des mains inhabiles, et vous trouverez que ses avantages sont plus que contrebalancés par ses imperfections.

5. Le verre micrométrique (ou micromètre en verre), au contraire, sur lequel on place l'objet à mesurer, et que l'on met sur le porte-objet ou sur la table du microscope, est d'un prix infiniment moindre, et par là d'une acquisition facile; il peut servir pour les corps fixes et mobiles transparens, et même pour les opaques, s'ils sont isolés. Voilà les avantages qui le rendent surtout propre à mesurer les Infusoires.

6. Mais les corps opaques ou même demi-transparens unis entr'eux, recouvrant ainsi l'échelle qu'on ne peut plus distinguer, ne peuvent être mesurés avec son aide; et même les corps isolés et les transparens, s'ils ont besoin d'être humectés, ne le sauraient être souvent que très imparfaitement; car nageant alors dans l'épaisseur de la goutte d'eau, ils se trouvent sur un plan plus rapproché de l'objectif que l'échelle gravée sur le verre, et ne peuvent se trouver à son foyer en même temps que l'échelle, au point que, avec un objectif d'un court foyer, il n'y aura de visible que l'un à la fois; et puis, si même, quoique imparfaitement, on les voit en même tems, la mesure ne sera pas exacte; elle sera trop grande, et le sera d'autant plus que le foyer de l'objectif sera plus court. Au surplus, une échelle où la ligne serait divisée en mille parties, ce qui ne donnerait encore que des dix-millièmes de ponce, est un véritable chef-d'œuvre de l'art; et on en trouve rarement. Puis, si l'objet est tant soit peu grand, il couvre trop de traits pour qu'il soit facile de les compter, surtout

rapidement (ce qui est indispensable pour beaucoup d'Infusoires) et sans se tromper. Alors il faudrait recourir à un autre verre d'une échelle moins fine, ou en avoir plusieurs. — Car le dessin de l'échelle, que nous allons indiquer plus bas (§ 8) ne saurait être d'aucune utilité pour un micromètre objectif, à cause de la petitesse du champ visuel de la lentille objective, qui, à moins qu'elle ne soit bien faible, ne laissera jamais voir à la fois l'échelle tout entière. Ce micromètre est de même très sujet à être gâté par un emploi trop fréquent et trop rude, car en l'essuyant après l'expérience, surtout si les corps observés devaient être tenus dans l'eau, on ne pourra guère éviter d'y faire des bavures et des raies, lesquelles, se multipliant par la suite, lui ôtent d'abord sa beauté, et le rendent enfin sans usage.

7. Mais que l'on place un pareil verre micrométrique dans un microscope, là où se forme l'image de l'objet, c'est à dire au foyer de l'oculaire, ces défauts disparaîtront, et l'on trouvera, qu'il réunit à la fois les avantages du verre et de la vis micrométriques, sans participer à leurs imperfections. En effet, il devient dès lors apte à mesurer les parties des corps opaques continues, tout comme le micromètre à vis, et les corps en mouvement, tout comme le verre micrométrique ordinaire ou objectif; donnant en même temps une mesure plus exacte que ce dernier, car avec son aide on ne mesure plus l'objet mais bien son image déjà amplifiée. Enfin il est à l'abri de tout endommagement, par sa position même.

8. Il paraîtrait seulement que, (ce qui arrive avec un verre micrométrique objectif) les objets un peu grands ne sauraient être mesurés par le micromètre oculaire; mais en réalité ils pourront toujours l'être, à moins que leur volume ne surpasse le champ du microscope à un grossissement donné; cas dans lequel en général la mesure par un verre devient naturellement impossible, où la vis micrométrique est indispensable, et où, pour mesurer, l'on devra substituer un grossissement moins fort. Car le champ visuel de l'oculaire étant généralement beaucoup plus grand que celui de l'objectif, on pourra toujours apercevoir l'échelle tout entière; or, en la traçant de sorte que chaque cinquième trait soit un peu plus long et chaque dixième encore un peu plus que les autres, comme on le fait pour les échelles des plans et des cartes géographiques, on pourra toujours aisément, et même presque en un clin d'œil, compter tous les traits couverts, quelque grand qu'en soit nombre. On peut aussi ajouter à côté de l'échelle micrométrique plusieurs traits distants entr'eux de toute cette échelle, jusqu'aux bords du champ visuel de l'instrument, et se procurer ainsi à l'avance la facilité de mesurer des corps d'un volume plus considérable, qui couvriront plusieurs de ces traits plus quelques uns de ceux du micromètre. Il peut aussi devenir très utile, comme nous le prouverons ailleurs, de traverser tous les traits de l'échelle par une ligne sous un angle droit.

9. On pourra objecter au surplus que la mesure

n'est pas exacte, puisque tous les points de l'objet devant être à la même distance du centre de l'objectif, ou même les extérieurs plus près que les autres, son image se forme sur une surface sphérique, tandis que le micromètre est plan, et que par cette raison la mesure obtenue serait trop petite, n'étant exacte que pour les points les plus proches de l'axe; mais il est à observer que, dans un microscope tant soit peu long, l'angle formé par le centre de l'objectif avec les bords du champ visuel devient peu considérable, et que pour lors on peut, sans erreur sensible, substituer la tangente à l'arc, et ainsi accepter la mesure pour juste.

10. Après ces avantages bien avérés du micromètre oculaire, il paraîtra étrange, sans doute, qu'il ne soit pas d'un usage général, puisque, de tous les instrumens que nous avons eu occasion de voir, nous ne l'avons trouvé que dans un seul, de très ancienne date, ayant été fait par Dollond père; instrument déjà tout brisé et dont le micromètre, à en juger par ses restes, n'était pas divisé assez soigneusement pour avoir pu être d'une grande exactitude, et nous soupçonnons même que la vraie mesure n'y était trouvée qu'au moyen du calcul. Il est même très probable que dans tout l'Empire de Russie il n'existe pas un seul microscope muni du micromètre oculaire (*). Nous ne saurions

(*) Cependant, après la lecture de cette Notice, nous avons vu chez M. Cohny, l'un de nos plus habiles Opticiens, un microscop-

expliquer ce phénomène autrement que par la grande difficulté que les artistes Opticiens ont dû éprouver dans la construction, vu qu'ils manquaient de données suffisamment claires pour obtenir dans leurs travaux à ce sujet des résultats satisfaisants, et que, rebutés par des difficultés qui leur paraissaient insurmontables, ils ont cessé de s'en occuper.

Voilà en même temps les raisons qui nous ont déterminés à entreprendre la recherche des principes sur lesquels la construction de ces instrumens doit être basée, et les résultats satisfaisants que nous avons eu le bonheur d'obtenir nous ont décidés à les détailler ici.

41. Le problème de placer le micromètre au foyer de l'oculaire peut être résolu différemment, selon la particularité des cas spéciaux; et l'on devra en distinguer trois principaux. Ou bien on veut le mettre dans un instrument tout fait, que l'on ne veut et ne sait pas remonter à neuf, et alors le tube oculaire est tantôt mobile, l'instrument pouvant être allongé, tantôt immobile; ou bien, en montant l'instrument neuf qu'il confectionne, l'artiste peut vouloir y placer un pareil micromètre.

42. Pour commencer par le cas le plus simple, supposons que, dans un microscope à tube oculaire mobile comme dans les lunettes d'approche, ou à

pe de M. Charles Chevalier muni d'un micromètre oculaire; mais aussi d'un grossissement peu considérable.

l'aide d'un pignon et d'une crémaillère ou simplement avec la main, on pose un micromètre en verre, d'une certaine échelle, sur le porte-objet p. e. de cent traits sur une ligne anglaise, et un autre tout semblable au foyer de l'oculaire, on observera alors que l'image grossie d'une partie de l'échelle sur le micromètre objectif couvrira un certain nombre de traits du micromètre oculaire. Supposons que ce soit $44\frac{1}{2}$ ou 42 traits : ce qui prouvera que l'image est $44\frac{1}{2}$ ou 42 fois aussi grande que l'objet ; donc, pour trouver la vraie mesure de celui-ci par le moyen du micromètre oculaire, il faudra diviser la mesure observée par $44\frac{1}{2}$ ou 42, ce qui donnerait dans cet exemple la valeur de chaque trait du micromètre oculaire de $\frac{1}{100} : 44\frac{1}{2}$ ou 42 $= \frac{1}{1150}$ ou $\frac{1}{1200}$ de ligne. On trouve donc que pour connaître la véritable valeur de chaque partie de l'échelle micrométrique oculaire, il faut diviser sa valeur réelle par le grossissement de l'image. Voilà la théorie du micromètre oculaire.

43. Or, observer et calculer ne s'accordent guère, l'astronome même calcule ses observations plus tard et à l'aise ; il est donc à désirer que le micromètre donne directement une certaine valeur convenable ou *raisonnable* pour ainsi dire, c. à. d., facile à saisir, ou décimale. Pour cela il faut que le grossissement de l'image soit décimal ou au moins tel, qu'il soit l'un des diviseurs de cent : or ces diviseurs sont 2, 5, 10, 20, 25, et 50, dont les deux premiers sont peu valables à cause de leur petitesse.

Pour obtenir un de ces nombres, il faudra donc allonger l'instrument en retirant dehors le tube oculaire : de la sorte, dans l'exemple cité, on pourra facilement obtenir le nombre 20 pour l'amplification de l'image. Alors on n'aura qu'à marquer par un trait au burin l'endroit jusqu'où le tuyau oculaire doit être retiré, pour que les traits du micromètre indiquent les $\frac{1}{2000}$ de ligne ou $\frac{1}{20.000}$ de pouce ; on pourra graver à gauche du trait le numéro de la lentille objective avec laquelle on a obtenu le résultat, et à droite la mesure de chaque trait ou $\frac{1}{2000}''$. P. e. N° 5 — $\frac{1}{2000}''$. Puis si avec une autre lentille on trouve également une valeur raisonnable, on agira tout de même. Ainsi p. e. N° 3 — $\frac{1}{5000}'''$; ailleurs N° 4 — $\frac{1}{10000}'''$.

44. Mais ce micromètre ainsi arrangé pour un presbyope, ne se trouvera plus au foyer de l'oculaire pour un myope : il faudra donc remonter l'oculaire (simple ou multiple) à part et mobilement, pour qu'il puisse être rapproché ou éloigné du micromètre, selon la portée de la vue des différens observateurs ; condition toujours essentielle à remplir, et que nous avons voulu indiquer ici une fois pour toutes.

45. Que si, au contraire, le microscope ne peut être alongé, cas déjà plus compliqué que le précédent, on devra disposer de même les deux micromètres et observer le nombre des traits couverts par un trait du micromètre objectif sur celui placé au foyer de l'oculaire, et alors confectionner un

nouveau micromètre où cette mesure soit divisée en un nombre raisonnable de parties. Supposons qu'on ait trouvé, comme alors, qu'un trait en couvrirait 12; alors faites un micromètre où $\frac{12}{100}$ de lignes soient divisées en 20, 40, 50 ou autant de parties que convenablement possible, il vous donnera, disposé au foyer de l'oculaire, des 2-, 4-, 5-millièmes de ligne. Ainsi, dans ce cas, on devra suivre cette règle: Divisez l'espace couvert sur le plan du micromètre oculaire en un nombre convenable de parties raisonnables par un trait de celui posé sur le porte-objet. — Notez bien que ces parties ne seront le plus souvent aucunement des quotièmes d'aucune mesure usitée, et gardez vous bien de briser ce verre; sa restitution, à moins que vous ne connaissiez à fond le principe que nous venons d'énoncer, ne saura être faite que par l'artiste intelligent qui a originairement tracé votre instrument.

16. Nous jugeons presque superflu, du reste, d'observer qu'une pareille division de l'échelle du micromètre oculaire est toujours possible, quoique souvent non sans peine, même avec le diviseur qui a servi pour l'échelle du micromètre objectif; mieux encore et plus facilement avec un instrument micrométrique arrangé comme un diviseur linéaire en miniature. Au surplus, nous avons imaginé nous même un arrangement fort simple pour un pareil diviseur micrométrique, dont nous réservons la description pour une autre fois.

47. Après tout ce que nous venons de dire sur l'arrangement du micromètre oculaire dans les deux cas précédens, il est clair que la question d'en placer un dans un nouvel instrument que l'on veut confectionner, se réduit à la recherche de l'endroit où, par un certain assemblage de verres, se formera l'image multiple définie (et raisonnable) de tout objet.

48. Pour y parvenir il faut se rappeler des formules dioptriques principales.

De la formule dioptrique fondamentale (*):

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{D} = \frac{a}{R} + \frac{a}{r} \dots (1) \text{ on obtient :}$$

$$\frac{r R}{a(R+r)} = \frac{D d}{D+d} \dots (2); \text{ de même, si } d = \infty, \text{ c. à.}$$

dire si les rayons tombants sur la lentille sont parallèles, et que $\frac{1}{d} = \frac{1}{\infty} = 0$, on aura $\frac{1}{D} = \frac{a}{R} + \frac{a}{r}$;

$$(D=)f = \frac{r R}{a(R+r)} \dots (3); \text{ de là (2 et 3):}$$

$$f = \frac{D d}{D+d} \dots (4); D = \frac{d f}{d-f} \dots (5) \text{ et } d = \frac{D f}{D-f} \dots (6).$$

(*) Nous avons désigné par D et d les deux foyers coordonnés, c. à d. que les rayons venant d'un point à la distance D de la lentille seront réunis de l'autre côté de la lentille en un point à la distance d et *vice versa*; réservant f pour le cas spécial de la distance focale des rayons parallèles. R et r indiquent les rayons des courbures des deux surfaces de la lentille; a l'index de la réfraction moins 1.

19. Ainsi, dans un microscope composé uniquement de l'objectif et d'une simple lentille oculaire on n'aura qu'à déterminer selon la nécessité le rapport $\frac{D}{d}$.

Que l'on désire p. e. une image centuple de l'objet, où donc $\frac{D}{d} = \frac{100}{1}$, on aura, mettant la distance focale de l'objectif $f = 1''$

$$\text{de (6) } d = x = \frac{100 x}{100 x - 1}; \quad 100 x^2 - x = 100 x;$$

$$100 x^2 = 101 x;$$

$$100 x = 101 = D; \quad x = \frac{101}{100} = d$$

$$(\text{ou de 4}) \frac{x \cdot 100 x}{x + 100 x} = 1; \quad \frac{100 x^2}{101 x} = 1; \quad 100 x^2 = 101 x;$$

$$100 x = 101 = D; \quad x = \frac{101}{100} = d.$$

20. Ou en général, mettant $\frac{D}{d} = \frac{M}{m}$

$$\frac{x \cdot \frac{M}{m} x}{x + \frac{M}{m} x} = f; \quad \frac{M}{m} x^2 = \left(x + \frac{M}{m} x\right) f; \quad \frac{M}{m} x = \left(\frac{M}{m} + 1\right) f = D;$$

$$x = \frac{M + 1}{M} f = d$$

ou, en posant $m = 1$, en tant que l'on désire une image multiple,

$$D = \left(\frac{M}{4} + 1 \right) f = (M + 4) f; \quad d = \frac{M + 4}{M} f = f + \frac{f}{M}$$

posant enfin, pour plus de commodité, $f = 1$ on aura : $D = M + 4$; $d = \frac{M + 4}{M} = 1 + \frac{4}{M}$.

C'est à dire, l'image multiple définie se trouve à autant de fois qu'il est multiple, plus une fois la distance focale de la lentille objective ; loix éminemment importante pour la construction des micromètres oculaires, et que nous avons été assez heureux pour trouver, quoique les principes bien constatés sur lesquels elle repose soient connus depuis fort longtems, et exposés sous différentes formes, selon la diversité des buts que l'on se proposait ; mais, énoncée comme nous venons de le faire, nous ne l'avons trouvée dans aucun des ouvrages que nous avons eu occasion de parcourir. C'est faute de l'avoir connue, que l'arrangement des micromètres oculaires a dû présenter des difficultés insurmontables.

Mettez donc là votre micromètre (et dans l'exemple cité c'est à 401 lignes de l'objectif) et il se trouvera posé juste pour vous donner dans ce cas, avec une échelle de cent traits sur la ligne, des 40 millièmes de ligne ou des 400 millièmes de pouce ; et ainsi en proportion avec d'autres échelles, ou d'autres multiples de l'image.

21. Mais un microscope d'une composition aussi simple que celui que nous venons d'analyser a de grands défauts. il vaut infiniment mieux ajouter

encore une troisième lentille convexe collective, que l'on mettra entre l'objectif et l'image de l'objet. C'est ainsi que, quoique l'image soit réduite à une moindre grandeur, on gagne pour la grandeur du champ visuel et la netteté des images. L'endroit le plus convenable pour le collectif sera, en général, à la moitié de sa longueur focale audessous de la première image, qui serait formée par le seul objectif (*). Alors la nouvelle image qui se formera, se trouvera au tiers de cette même longueur focale audessus de la lentille collective, et se trouvera réduite aux deux tiers de la première image; or, il est clair que pour l'avoir égale à celle-ci, il faudra que la première image soit calculée pour être, sans le concours du collectif, une fois et demi aussi grande, c'est à dire il faut la prendre $\frac{3}{2}$ aussi grande, ou la multiplier par $\frac{3}{2}$, c. à d. par le rapport de la première image à la seconde.

22. Qu'en demande p. e. une image centuple avec un collectif de 3" et un objectif de 4" de longueur focale; on aura :

(*) On admet généralement qu'il faut que la distance focale de l'objectif soit trois fois aussi grande que celle de l'oculaire, et leur distance double du foyer de l'oculaire, et qu'alors l'image se formera juste au milieu des deux lentilles; c'est pourquoi on suppose qu'un pareil tube oculaire est achromatique, et avec des lentilles de la *meilleure forme* (ou même approximativement plano-convexes) qu'il est aplanatique; mais nous espérons bientôt pouvoir prouver ailleurs qu'il n'en est pas tout à fait ainsi.

$\frac{3}{2} 100''' + 1''' - 1\frac{1}{2}'' + 1'' = D$; c. à d. à la distance de l'image de l'objectif.

$$151''' - \frac{1}{2}'' = 146''' = D.$$

Ou en général, mettant le grossissement de l'image $= v$, les distances focales de l'objectif et du collectif $= f$ et F , on aura pour la grandeur de la première image $= G = \frac{3}{2} v$; pour la distance de cette image de l'objectif $= E = (\frac{3}{2} v + 1) f$; pour la distance du collectif de l'objectif $= E' = E - \frac{F}{2} = (\frac{3}{2} v + 1) f - \frac{F}{2}$;

pour la distance de la seconde image $= E'' = E' + \frac{F}{3} = D$
 $= (\frac{3}{2} v + 1) f - \frac{F}{2} + \frac{F}{3}.$

23. Ou d'une manière générale (c. à d. également avec tout autre rapport entre le collectif et les distances des images) soit la longueur focale du collectif $= C$, de l'objectif $= F$, la distance de la seconde image du collectif $= A$, on trouvera (d'après 6) la distance de la première image $= \frac{A C}{A - C}$, grandeur, qui, quoique négative ici, comme aussi dans l'exemple précédent, parce que la première image se trouve du même côté du collectif que la seconde, devra toujours, en comparant les grandeurs des deux images, être prise positivement. On aura donc :

$$G = \frac{\frac{A C}{C-A}}{A} v = \frac{C}{C-A} v \text{ pour la grandeur requise de}$$

la première image, afin que
par le collectif elle fût ré-
duite au v -ple de l'objet ;

$$E = \left(\frac{C}{C-A} v + 1 \right) f \text{ pour la distance de la première}$$

image de l'objectif ;

$$E' = \left(\frac{C}{C-A} v + 1 \right) f - \frac{A C}{C-A} \text{ pour la distance du col-}$$

lectif de l'objectif ;

$$E'' = \left(\frac{C}{C-A} v + 1 \right) f - \frac{A C}{C-A} + A \text{ pour la distance}$$

de la seconde image
de l'objectif.

24. Ou bien, au lieu de celle de la seconde, soit donnée la distance de l'image primaire du collectif $= A$; on aura (d'après 6), (puisque les rayons seront convergents et, par conséquent D négatif)

$$d = \frac{-D C}{-D - C} = \frac{D C}{D + C}; \text{ ainsi la distance de l'image}$$

secondaire du collectif sera $\frac{A C}{A + C}$; donc le rapport

$$\text{des images} = \frac{A}{\frac{A C}{A + C}} = \frac{(A + C) A}{A C} = \frac{A + C}{C} \text{ avec lequel}$$

on devra multiplier v ; on aura donc :

$$G = \frac{\Delta + C}{C} v;$$

$$E = \left(\frac{\Delta + C}{C} v + 1 \right) f;$$

$$E' = \left(\frac{\Delta + C}{C} v + 1 \right) f - \Delta;$$

$$E'' = \left(\frac{\Delta + C}{C} v + 1 \right) f - \Delta + \frac{\Delta C}{\Delta + C}.$$

25. Mais on peut, pour obtenir un grossissement plus fort, composer aussi un microscope d'un objectif convexe et d'un *dispersif* concave, plus l'oculaire.

La lentille dispersive devra de même y être placée avant la réunion des rayons, qui ont traversé l'objectif, en image, qu'elle projettera plus loin, en rendant les rayons moins convergens, et aggrandira par cette raison.

26. Soit la distance focale du dispersif = F , la distance de la seconde image du dispersif = B , on aura pour la distance de la première image de la même lentille, parceque F est négatif (puisque la lentille est concave) $\frac{-BF}{B+F}$ (grandeur négative, puisqu'elle est formée par des rayons convergens); et pour le rapport des images :

$$\frac{D}{d} = \frac{\frac{BF}{B+F}}{B} = \frac{F}{B+F}; \text{ — de là :}$$

$$G = \frac{F}{B+F}v;$$

$$E = \left(\frac{F}{B+F}v + 1 \right) f;$$

$$E' = \left(\frac{F}{B+F}v + 1 \right) f - \frac{B F}{B+F};$$

$$E'' = \left(\frac{F}{B+F}v + 1 \right) f - \frac{B F}{B+F} + B.$$

27. Cet instrument a les mêmes désavantages que celui du § 20, que l'on éloigne de même (§ 21) en ajoutant, avant la formation de l'image secondaire, une lentille collective, qui réunira les rayons plus près en une image réduite.

Dans les instrumens de M. Selligue on trouve cette combinaison de verres.

28. On aurait (§ 23) alors :

$$G = \frac{C}{C-A} \cdot \frac{F}{B+F}v, \text{ grandeur requise de la première image ;}$$

$$E = \left(\frac{C}{C-A} \cdot \frac{F}{B+F}v + 1 \right) f, \text{ endroit de l'image primaire ;}$$

$$E' = \left(\frac{C}{C-A} \cdot \frac{F}{B+F}v + 1 \right) f - \frac{B F}{B+F}, \text{ endroit du dispersif ;}$$

$$E'' = \left(\frac{C}{C-A} \cdot \frac{F}{B+F}v + 1 \right) f - \frac{B F}{B+F} + B, \text{ lieu de la 2 image ;}$$

$$E''' = \left(\frac{C}{C-A} \cdot \frac{F}{B+F} v + 1 \right) f - \frac{B F}{B+F} + B - \frac{A C}{A-C},$$

endroit du collectif;

$$E^{iv} = \left(\frac{C}{C-A} \cdot \frac{F}{B+F} v + 1 \right) f - \frac{B F}{B+F} + B - \frac{A C}{A-C} + A,$$

endroit de l'image tertiaire ou effective.

29. Ou d'après le § 24:

$$G = \frac{A+C}{C} \cdot \frac{F}{B+F} v, \text{ grandeur requise de la 1 image;}$$

$$E = \left(\frac{A+C}{C} \cdot \frac{F}{B+F} v + 1 \right) f, \text{ endroit de la première image;}$$

$$E' = \left(\frac{A+C}{C} \cdot \frac{F}{B+F} v + 1 \right) f - \frac{B F}{B+F}, \text{ endroit du dispersif;}$$

$$E'' = \left(\frac{A+C}{C} \cdot \frac{F}{B+F} v + 1 \right) f - \frac{B F}{B+F} + B, \text{ endroit de la 2 image;}$$

$$E''' = \left(\frac{A+C}{C} \cdot \frac{F}{B+F} v + 1 \right) f - \frac{B F}{B+F} + B - A, \text{ endroit du collectif;}$$

$$E^{iv} = \left(\frac{A+C}{C} \cdot \frac{F}{B+F} v + 1 \right) f - \frac{B F}{B+F} + B - A + \frac{A C}{A+C},$$

endroit de la troisième ou effective image.

30. Mais comme aussi dans un instrument muni d'un dispersif, au lieu de la distance de la seconde

image du dispersif, aurait (analogiquement au § 24) pu être donnée la distance de la première image du même dispersif $= \delta$, les formules du § 26 changeraient, (parce que la distance de la seconde image de la même lentille deviendrait $= \frac{-\delta(-F)}{-\delta + F} = \frac{\delta F}{F - \delta}$), en celles-ci:

$$\frac{D}{d} = \frac{\delta}{\frac{\delta F}{F - \delta}} = \frac{(F - \delta)\delta}{\delta F} = \frac{F - \delta}{F};$$

$$G = \frac{F - \delta}{F} v;$$

$$E = \left(\frac{F - \delta}{F} v + 1 \right) f;$$

$$E' = \left(\frac{F - \delta}{F} v + 1 \right) f - \delta;$$

$$E'' = \left(\frac{F - \delta}{F} v + 1 \right) f - \delta + \frac{\delta F}{F - \delta}$$

34. Ce qui donnerait au lieu du § 28 :

$$G = \frac{C}{C - A} \cdot \frac{F - \delta}{F} v, \text{ grandeur requise de la première image,}$$

$$E = \left(\frac{C}{C - A} \cdot \frac{F - \delta}{F} v + 1 \right) f, \text{ endroit de l'image première,}$$

$$E' = \left(\frac{C}{C - A} \cdot \frac{F - \delta}{F} v + 1 \right) f - \delta, \text{ endroit du dispersif,}$$

$$E'' = \left(\frac{C}{C-A} \cdot \frac{F-\delta}{F} v + 1 \right) f - \delta + \frac{\delta F}{F-\delta}, \text{ endroit de}$$

l'image secondaire,

$$E''' = \left(\frac{C}{C-A} \cdot \frac{F-\delta}{F} v + 1 \right) f - \delta + \frac{\delta F}{F-\delta} - \frac{A C}{C-A}, \text{ lieu}$$

du collectif,

$$E^{iv} = \left(\frac{C}{C-A} \cdot \frac{F-\delta}{F} v + 1 \right) f - \delta + \frac{\delta F}{F-\delta} - \frac{A C}{C-A} + A,$$

endroit de la 3 ou effective image.

32. Et au lieu du § 29:

$$G = \frac{A+C}{C} \cdot \frac{F-\delta}{F} v;$$

$$E = \left(\frac{A+C}{C} \cdot \frac{F-\delta}{F} v + 1 \right) f;$$

$$E' = \left(\frac{A+C}{C} \cdot \frac{F-\delta}{F} v + 1 \right) f - \delta;$$

$$E'' = \left(\frac{A+C}{C} \cdot \frac{F-\delta}{F} v + 1 \right) f - \delta + \frac{\delta F}{F-\delta};$$

$$E''' = \left(\frac{A+C}{C} \cdot \frac{F-\delta}{F} v + 1 \right) f - \delta + \frac{\delta F}{F-\delta} - A;$$

$$E^{iv} = \left(\frac{A+C}{C} \cdot \frac{F-\delta}{F} v + 1 \right) f - \delta + \frac{\delta F}{F-\delta} - A + \frac{A C}{A+C}.$$

33. On peut enfin, comme nous l'avons déjà imaginé autrefois, et comme M. (Ch.?) Chevalier à Paris le paraît avoir eu en vue dans la construction d'au moins quelques uns de ses instrumens, on peut composer un microscope en mettant, au lieu de la lentille dispersive concave de la construction précédente, un *imaginif*, comme nous l'avons nommé, qui

soit convexe, et que l'on mettra audelà de l'image produite par l'objectif à une distance δ' plus grande que son propre foyer $= F$.

34. On aura alors pour la distance de la seconde image (§ 28) $\frac{\delta' F}{\delta' - F}$, pour le rapport des ima-

$$\text{ges } \frac{D}{d} = \frac{\delta'}{\delta' - F} = \frac{(\delta' - F) \delta'}{\delta' F} = \frac{F - \delta'}{F};$$

$$E^{iv} = \left(\frac{C}{C - A} \cdot \frac{-F + \delta'}{F} v + 1 \right) f + \delta' + \frac{\delta' F}{F + \delta'} - \frac{A C}{C - A} \\ + A \text{ pour l'endroit de l'image effective;}$$

et au lieu du § 29:

$$E^{iv} = \left(\frac{A + C}{C} \cdot \frac{-F + \delta'}{F} v + 1 \right) f + \delta' + \frac{\delta' F}{-F + \delta'} - A + \frac{A C}{A + C}.$$

Comme pour avoir dans ce cas l'image aussi grande que dans celui du § 31 (si les foyers des verres correspondants sont les mêmes) il faut que $\delta' - F = F - \delta$, on aura $\delta' + \delta = 2 F$ pour la grandeur dont, dans ce cas, l'endroit de l'image, et, par conséquent, la longueur de l'instrument, surpassera ceux du microscope du dit paragraphe.

35. Le résultat général de tous ces calculs est que :

Pour trouver dans un microscope composé quelconque l'endroit de l'image multiple-définie, il faut:

Multiplier ce multiple (v) par le produit des rapports consécutifs des images primaires et secondaires produites l'une après l'autre par le concours des

collectifs, des dispersifs, et des imaginifs, s'il y en a (et sans prendre garde aux signes de ces images) et de la distance focale de l'objectif (ce qui donnera la grandeur requise de la première image); et puis ajouter la somme du foyer de l'objectif, et de toutes les distances des images primaires et secondaires de leur lentilles respectives (en observant bien leurs signes, qui, pour les images secondaires, seront toujours positifs, pour les primaires, négatifs, excepté pour l'imaginif ou lui aussi sera positif).

C'est donc là que l'on placera le micromètre oculaire, dont on trouvera la valeur comme il a été dit plus haut.

36. Nous ne prétendons aucunement au reste, pour ne pas être mal compris, que l'endroit de l'image multiple-définie, se trouve rigoureusement au lieu indiqué: non, puisque les corrections nécessaires à cause des aberrations sphérique et chromatique, qui du reste n'ont que fort peu d'influence sur ce cas (surtout comme on peut se servir de lentilles, objectives au moins, aplanatiques) et surtout à cause de l'épaisseur des verres, n'ont pas été prises en considération, pour ne pas rendre le calcul trop compliqué.

37. C'est pourquoi l'opticien, ayant calculé l'endroit du micromètre d'après les règles indiquées, devra s'assurer d'abord de la grandeur de la faute, qui, à ce que nous supposons, ne surpassera presque jamais une ligne anglaise, pour la réparer avant de fixer à tout jamais le diaphragme sur lequel repose

le micromètre ; il faut donc que ce diaphragme (seul, ou conjointement avec le collectif, audessus duquel il se trouve) soit monté à part et d'abord mobilement pour pouvoir être haussé ou baissé d'un petit espace (d'une ligne tout au plus); et alors ayant trouvé le véritable endroit de l'image multiple-définie on le fixera pour toujours. D'un autre côté, en changeant la monture des objectifs, on pourra de même corriger la petite erreur de ces calculs.

38. Comme, pour la mesure de corps un peu plus grands et dont les images à un grossissement donné peuvent surpasser le champ de l'oculaire, il peut devenir utile d'employer un objectif moins fort, il est à observer finalement, que l'image qu'il produira ne sera pas réduite proportionnellement à sa longueur focale, si on le met exactement à la place du premier objectif, mais que pour cela il faut le mettre d'autant plus bas, que sa longueur focale surpasse celle du premier. Que par exemple on ait un instrument où avec un objectif d'une ligne de foyer, dont la monture est haute de deux lignes, on obtient une image centuple sur le plan du micromètre; en substituant un objectif de deux lignes de foyer, on ne l'aura exactement cinquanteuple, que si l'on monte cet autre objectif dans un tuyau de trois lignes de hauteur; de même la monture d'un objectif de quatre lignes de foyer devra recevoir une hauteur de cinq lignes, pour donner sur le plan même du micromètre une image 25-ple de l'objet.

39. Au surplus il sera très convenable de graver sur la monture de ces objectifs la valeur de chaque trait du micromètre, qui dans cet exemple, si sa valeur réelle est $\frac{1}{100}$ ''' , serait pour le premier objectif $\frac{1}{10000}$ ''' , pour le second $\frac{1}{5000}$ ''' , et pour le troisième $\frac{1}{2500}$ ''' .

40. Si pour les grossissements forts on visse plusieurs objectifs l'un sur l'autre, comme on le fait ordinairement dans les instrumens achromatiques, on pourra graver sur le bout du corps du microscope la valeur de chaque trait du micromètre pour l'assemblage des trois ou quatre objectifs les plus forts; puis faire plusieurs anneaux d'une hauteur requise, pour que, les ayant vissés au bout du microscope, et ayant placé à leur bout inférieur quelques unes de ces lentilles, on obtienne exactement sur le plan du micromètre des images proportionnellement multiples. On gravera de même sur chacun de ces anneaux les N^{os} des lentilles et la valeur de chaque trait du micromètre; p. e. N^{os} 4, 3, 2, 1 — $\frac{1}{10000}$ ''' , N^{os} 4, 3, 2 — $\frac{1}{5000}$ ''' , N^{os} 4 et 3 — $\frac{1}{2500}$ ''' ,.

OBSERVATIONES

QUÆDAM

DE REPTILIBUS INDIGENIS

AUCTORE

J. KRYNICKI.

Pauci Auctores, qui apud nos de istis animalibus tractabant, magnam eorum copiam, præsertim in meridionalibus plagis, inveniri itineribus suis descriptionibusque ostenderunt; sed quis, cui eorum consulendorum fuit necessitas, confusionem illam non sensit, quæ in determinandis speciebus multas adhuc parat difficultates. Ut alios (*) prætermittam, summus noster Zoographiæ Rosso-Asiaticæ Auctor non omnium characteres, eorum imo quæ propria cura indagavit, satis distincte et ex exacta comparatione illustravit; quæ autem a Gûldenstaedtio descripta

(*) Лепехинъ Дневныя записки—Acta Petropolitana—Bulletin des Nat. de Moscou T. IV. p. 68 et VIII. p. 317—Lichtenstein in: Eversmannii Reise nach Buchara—etc.

fuere eo majore ambiguitate laborant. Vir cel. Eichwald (Zoologia Spec. Vol. III.) succincte quasdam orientalis plagæ species novas describit, cujus descriptionem D. Ménériés ipsis iis locis in usum vocabat, sed non omnia ex ea facile dignoscere potuit. Hic catalogo suo (Catalogue raison. 1830) plurima etiam ut nova edidit, sed icones nullas adjecit nullamque proximorum comparisonem instituit. D. Andrzejowski (Mém. II. p. 324. Amphibia Nostratia) ad resolvenda quædam dubia animum appulit, interdum nonnullorum novas denominationes adtribuit. Denique Cell. Eversmann (Mém. T. III. p. 337.) in hoc genere Monographia sua de Lacertis optime elaborata nostrorum Scrutatorum claudit seriem. In tanta re adeo, tam parum explicata, ac fere in cunabulis versante, brevioribus etiam observationibus qualemcunque utilitatem afferri posse, credo.

1. LACERTA. CUV.

A.) LACERTA WAGL.

- 1.) *Lacerta viridis*. Daud. III. 441—Sturm. III. 4 n. 6 — Eversm. l. c. p. 339 — Andr. p. 325 — Squamæ subcaudales ovato-acutiusculæ, post quartam jam seriem carinatae; scuta abdominalia intermedia parum angustiora; verrucis femoralibus 49.

In Rossia meridionali usque ad 48 lat. inter saxa et dumeta non rara.

- 2.) *Lacerta agilis* Meer. Tent. 67. 43 — Andr. 426.
 XXII. 40 — Eversm. 344 2—sturm. III. 2 n. 3—
Lac. stirpium. Dd. III. 455—Méné. 64 242.

Species capite crasso, pyramidalī, obtuso, collare margine denticulato, squamis dorsi angustis granulorum instar per lineas dispositis, ad latera latioribus, rhombeis, planis, scutis abdominalibus ordinum 6, intermediis multo angustioribus a congeneribus facile recognoscenda. Squamæ subcaudales quadrangulæ, postice angustatæ.

In individuis junioribus maculæ fuscae dorsi aut nullæ aut oblitteratæ, sed vittæ longitudinales tres viridescenti-albidæ guttæque similes in lateribus, minime adhuc ocellatæ, evidentissimæ. Supercilia eorum satis convexa, qua nota reptilia juvenca sæpe ab adultis deversa. *L. sylvicola* Eversm. 344 XXX. 4 admodum suspecta, eo magis Cel. Auctor pullos *L. agilis* investigasse nulibi addit.

3.) *Lacerta montana*.

Supra virescenti-fusca maculis parvis, ocellatis, subseriatis, subtus coerulescenti nigro-punctata; squamis dorsi planis, oblongohæxagonis, carinatis, subcaudalibus ad basin fere semiotundis, imbricatis.

Lacerta montana? Mikan in: sturm III. 4 n 4 Meer.
 Tent. 69. 26.

Quoad colorum picturam et partium conformationem nostra *Lacerta* magnam refert similitudinem cum *L. montana* Mik., sed descriptio ejus superfi-

cialis ultimum dubium non resolvit. Forma capitis et dispositione scutorum cranii, proxima *L. saxicolæ* Ev. at rostro brevior magisque obtuso et scutis temporum magnis ab illa uti a *L. murali* diversa. Color ejus superne fusco-virescens, sub epidermide pallide cœruleus, capitis magis fuscus, punctis sparsis nigris permixtus. Dorsum seriebus subquaternis, macularum nigri coloris parvarum cum pupilla alba ornatum. Artus superne et inferne nigro maculati. Subtus pallide cœrulea, scutis in medio puncto nigro notatis. Pone anum magnam caudæ partem tegunt scutellæ planæ, imbricatæ, apice rotundæ, basi nigrae postea albæ. Squamæ dorsi planæ, oblongo hæxagonæ, medio carinula parva notatæ, cum lateralibus subæquales. Scuta abdominalia fere octo seriebus longitudinaliter digesta, nam ad utrumque corporis latus se cernitur adhuc unus ordo minorum, intermedia parum angustiora. Collare squamis 44. Cauda longiuscula, verticillata, verticillis ad 55, scutellarum carina parum elevata. Pori femorales 40 Plantæ, quam in congeneribus, parum latiores.

$$\text{long. } \frac{\text{Caudæ}}{\text{Corporis}} = \frac{2'', 8'''}{4'', 40'''} = 1,45....$$

Certe nescio ubinam hæc species habitare posset, sed verosimile rossica est. Duo tantum individua, singulari modo inventa licuit mihi observare. Unum ante tres annos hieme valde mutilatum Charkoviæ ad viam ipse reperi, alterum anno currente (1837 10 Febr) etiam simili loco detectum et mihi statu

sicco, attamen bene conservato adlatum; ex quo supponere conatus sum quod plebecula nostra adinstar *Ranæ temporariæ* eam exsiccet et pro aliquo remedio conservat.

b.) ZOOTOCA. WAGL.

- 4) *Lacerta saxicola* Evers. 349. 6 XXX. 4 *L. taurica* Pall. Zoogr. III. 30. 25.

Ex accuratissima plurimorum individuorum comparatione persuasus sum cell. Auctores unam eandemque speciem sub variis denominationibus descripsisse, ita ut de hac re nulla dubitatio existere debeat; nomen tamen *L. saxicolæ* ante *L. tauricam*, quoniam illa extra Tauriam etiam invenitur, præferendum. Color ventris fulvus non in omnibus individuis, imo tauricis adultisque adesse solet, multo stabilius cernitur pallide cœruleus in seriebus scutorum externis, scil. quinto et sexto, quas Pallasius ab abdominalibus separavit. Scutella subcaudalia pone anum subquadrata.

Juniores ab adultis distinguuntur: maculis obsoletioribus, strigis longitudinalibus quaternis, id est utrinque ad latera fasciam nigram limitantibus, dilutis, rostro obtusiori, superciliis convexioribus, scutello temporum medio squamulis circumdantibus vix majori, et scutis occipitalibus abbreviatis latioribusque.

Longitudo caudæ admodum variat, examinavi unum exemplum cujus corpus 2'', 4''', cauda vero 4'' 9''' adæquabant.

- 5.) *Lacerta crocea* Wolf in : Sturm III. 4 n. 7 — Eversm. 347 5 XXXI. f. 4 2 — *L. chrysogastra*. Andr. 357 c — Pall. Zoogr. III. 34 in nota.

Species habitatione sua magnum spatium occupans, a mare balthico usque ad nigrum etiam in Sibiria passim occurrit, præsertim frequenter eam observavi in Lithuania.

c.) PODARCIS. WAGL.

- 6.) *Lacerta variabilis* Eversm 351 7 XXIX — Pall. Zoogr. III. 34. 26 — in parte —

Non solis tantum plagis orientalibus peculiaris, indefessus noster Naturæ scrutator excel. Steven anno 1835 detexit eam ad Paludem Maeotidem (Молочные воды) et benevole mihi communicavit.

2. ANGUIS. Cuv.

- 1.) *Anguis fragilis*

Capite brevi ovato acutiusculo, planulato, scuto verticali antice truncato; corpore supra lineato, sub epidermide grisescenti albido, inferne toto plumbeo-nigro; cauda mucrone obtuso.

Anguis fragilis Lin. Faun. Svec. 105. 289 — Sturm. III. 3. 5 — Daud. VI. 327 — Pall. Zoogr. III. 55. 54 — An. Besseri Andr. 338 XXII. 7 et XXIV.

Typus *A. fragilis* constanter distingui videtur capite suo brevi antice attenuato, obtusiusculo, subtriangulari, a collo crassiori indiscreto et superne

depressiore, qua nota præsertim feminæ eminent. Scutis verticalibus duobus, quorum posterius triangulare angulis anticis sectis, alterum vero suboctogonum, antice truncatum. Colores ejus admodum variant: generatim occurrit superne pallida aut saturate fusca vel grisea, præcipue dum senectam exuit, sæpissime linea dorsi interdum duplicata nigricante, a nucha usque ad extremitatem caudæ percurrente, et alia laterali utrinque ab oculis incipiente et punctis subconfluentibus, ornata. Harum numerus plerumque augetur. Subtus et ad latera plus minusve obscura, plumbeo nigricans; nam et gulæ puncta nigra ulterius in colorem communem deliquescunt. Cauda apice abbreviato, conico, obtusiusculo, undique squamis tecto, superne puncto impresso.

Anguis ab amicis. Andrzejowskio sub nomine *Beseri* descripta, nil aliud esse videtur nisi vera *A. fragilis* L. Nam accurata comparatio ex indigenis multorum speciminum cum descriptione et icone, imo ejus qui præsto est mihi quoque ex Europa occidentali, nulla præbuit insignem differentiam.

long. corp: caudæ = 4'', 4''' : 5'', 2''' = 5 : 5, 96....
 = 7'', 2''' : 7'', 10''' = 5 : 5, 46....
 = 6'' 4''' : 5'' 9''' = 5 : 4, 61....

Cauda omnium integra fuit.

2.) *Anguis incerta*. mihi. Tab. 4.

Capite oblongo-ovato, superne tereti-convexo, scuto verticali antice acuto; corpore supra unicolore,

fuscescenti-olivaceo, sub epidermide cœruleo, sub-
tus flavescenti albido, fascia media lata, plumbea;
cauda mucrone submamillato.

Anguis fragilis Andr. 337 1.

Anguis hæc an diversam omnino a præcedenti speciem constituit, aut solummodo constantem ejus varietatem, vel forsân ætatis statum adultæ, ex ulterioribus observationibus resolveant alii. Mihi tantum examinare bina specimina fuit occasio: alterum an. 1823 quod in Lithuanie sylvis circa Vilnam reperi, alterum Charcovie an. 1830 adiatum. Notæ ejus peculiare, ne dicam tamen constantes, videntur esse sequentes: Caput magis elongatum quam in *A. fragili* undique fere latitudinis æqualis, antice obtusiusculum, magis semicylindricum quam tetragonum, vertice scutello anteriori antice acuminato, dentibus oculisque quodammodo majoribus, rictu oris longius pone oculos prostrato caudaque mucrone corneo, obtusiusculo, squamulis destituto, terminata. Color corporis superne æqualis, fusco-olivaceus, decem phalanges squamarum longitudinales occupans, sed sub epidermide eodemque loco læte cœruleus, fere cœlestinus; unde si singulæ squamæ senectam exuunt, deteguntur maculæ istius coloris, plerumque per series distributæ. Subtus flavescente-albidus vel pallide stramineus, fascia lata, longitudinali, plumbeo nigra a gula ad anum medio abdominis percurrente. In altero individuo fascia hæc summum caudæ apicem tetigit. Squamarum in cir-

cuitu ad 32 ordines enumeravi, quarum caudales majores sunt quam in præcedenti et evidentius hæxagonæ. Squam. abd 124 caud. 124.

long. corp : caud = $7'' 5''' : 7'' 2''' = 5 : 4$, 83.

= $6'' 6''' : 5'' 6''' = 5 : 4$, 23....'

3.) *Anguis lineata*.

Capite brevi, ovato, corpore latiori, superne plano, scutis occipitalibus cum antica frontali æqualis latitudinis; corpore supra candido, linea crassa medio dorsi ad apicem caudæ excurrente, aterrima, subtus et ad latera plumbeo-nigro

Anguis lineata Laurent. Rept. 68—Sturm III. 3 n. 6—

Wolfius (Fau. Sturmii) post descriptionem hujus *Anguis* addit «similis *A. fragili* cujus forte nil aliud nisi individuum junius» etsi alio loco in *A. fragilis* historiæ delineatione se exprimit, vidisse pullos ejus matri simillimos, pictura tantum dilutiores. Nostram *A. lineatam* omnino diversam constituere ab *A. fragili* speciem vix dubito. Apud nos in regione caucasica præcipue ad balneas sub lapidibus haud rara, in Europa vero occidentali ubi quoque *A. fragilis* frequens, vix aliquoties reperta.

Corpus ejus fere totum plumbeo-nigrum, in dorso tantum fascia lata, quæ sex cum dimidio phalanges squamarum occupat, pulchre candida, linea aterrima a scato verticali, ubi plerumque maculis binis cruciforme dilatata est, ad caudæ apicem usque percurrente, longitudinaliter divisa. Caput brevius et

latius quam in congeneribus, rotundato-ovatum, superne planiusculum, antice obtusum. Scutellum frontis anticum oblongo-subtetragonum cum binis occipitalibus æqualis latitudinis. Corpus a capite latiori sensim sensimque attenuatur; cauda indiscreta, apice conulo brevissimo, obtuso, non squamato terminata. Squam. abd. 442 — 429 subcaud. 438—434. Long. corporis 2" 5"', caudæ 2" 4''.

COLUBER CUV.

a.) SQUAMÆ DORSI CARINATÆ.

1.) *Coluber Natrix*. L. *C. torquatus*. Meer. Tent. 424 n. 423 (haud n° 62.)

2.) *Coluber Hydrus*.

Corpore supra obscure olivaceo, maculis interdum saturatioribus, obsoletis, subtus pallido, colore plumbeo ad caudam magis magisque obscurato; squamis oblongo-hæxagonis, carinatis, apice submembranaceis, emarginatis; cauda subquadrantali, mucrone obtuso, bipartito.

Coluber Hydrus Pall. Zoogr. III. 36. 30—Gmel. 1103—Daud. VV. 439—Meer. 127. 135—Ménétr. 69. 234.

Species egregiis notis distincta, at in colorum dispositione minus constans; interdum superne minime maculata, unicolor, obscure, raro dilutius olivacea, subtus flavescens aut rubicunda, antice pallida, postice ad anum magis magisque obscurata, cum cauda plumbeo-nigra, sæpe etiam maculæ laterales pallidæ

ita sunt dispositæ, ut venter pone mediam partem tessellatus appareat. Caput oblongum, prismaticum, antice attenuatum, scuto verticali oblongo, quinque angulari; at feminæ fere quadrangulari. Rictus oris amplissimus, marginibus labiorum postice longe sursum adscendentibus. Squamæ dorsi valde elongatæ, lanceolato-hæxagonæ, apice evidenter membranaceæ et emarginatæ, ordinum 19; carinæ earum admodum elevatæ in dorso 9 in cauda 6 lineas similes, fere rectas efformant. Squamæ caudales et seriei scutorum vicinæ, glabræ, abbreviatæ multo latiores.

Cauda loco styli elongati terminatur apice obtusiusculo, utrinque foveola impresso et squamula cum extremitate libera superne tecto, unde mucro subbifidus, appendiculis brevissimis, alter supra alterum.

$$\begin{array}{l}
 \text{♀} \quad \frac{\text{scutis}}{\text{scutell.}} = \frac{174}{62}, \quad \frac{\text{corp.}}{\text{caudæ}} = \frac{26''}{5'' 10'''} = 4, 45... \\
 \left. \begin{array}{l} \text{♂} \\ \text{♂} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \frac{\text{scutis}}{\text{scuteu}} = \frac{185}{72}, \quad \frac{\text{corp.}}{\text{caudæ}} = \frac{21'' 4'''}{5'' 10'''} = 3, 65... \\ \frac{185}{74} = \frac{20'' 8'''}{5'' 4'''} = 3, 875. \end{array}
 \end{array}$$

Femina crassior, cauda fere abrupte attenuata, at longiori, scuto anali bipartito, admodum dilatato.

Apud nos ad littora maris nigri vernali tempore circa Odessam non rarus.

b) SQUAMÆ DORSI INTEGRÆ

LATERALES LATIORES.

3.) *Coluber trabalis*. Pall. Zoogr. III. 42. 38 — *C. caspius* Lepech. Дневн. записки. 4. 513 Tab. XXII. f. 4 præcipue quoad expressionem capitis satis bona—Frivald. Serp. Hung. p. 44.—

Caput breve, parvum, haud distinctum, antice obtuse rotundatum, planum. Scutum verticale subhæxagonum, postice angustius, lateribus sinuatis; scuta superciliaria oblonga, supra oculos convexo elevata. Maxillarum dentes primores nulli. Squamæ ad nucham plano subgranulatæ, in antica dorsi regione angusto-oblongæ, postea rotundato obtusiusculæ, dein et ad latera evidenter latiores. Omnes lævissimæ, haud carinatæ, seriebus 49 dispositæ, fuscescentes, lineola mediana dilutiori, unde animal supra quasi longitudinaliter striatum, subtus unicolor, flavum.

Operculum anale bipartitum, cujus partes utrinque tegunt tres squamas caudæ adnumeratas. Præter has observantur adhuc ante primum par scutarum caudæ, utpote pone anum, fascia transversa e scutellis minutis vel potius e granulis planiusculis.

Cel. Andrzejowski sub nomine *C. trabalis* l. c. 332. 4 diversum animal (squamis carinatis, capite elongato etc.) describere videtur.

Occupat Zonam meridionalem fere ad 50 lat. ex. gratia Ekatherinosl (Славеносербскъ, Сѣверной До-нецъ). etc.

- 4.) *Coluber lævis* Meer. Tent. 101. 36—Frisvaldszky
Serp. Hungar. p. 39—*C. austriacus* Sturm. III. 2.
4. icon bona—Daud. VII. 49—*C. cupreus*. Pall.
Zoogr. III. 45. 42.

Species apud nos non rara et a Gùldenstædtio
sub nomine *C. cuprei* breviter descripta, binas offert
varietates :

Var. a) communis plus minusve fuscescenti aut
rubicundo obscura, sæpissime ludit cupreo colori,
præcipue in scutis per se nitidissimis. In dorso ma-
culæ semper obsoletæ, et magis e punctis coaduna-
tis saturationibus a nucha usque ad caudam utrin-
que in duas series dispositis ortæ. A naribus trans
oculum percurrit utrinque striga fusca, quæ ad an-
gulum rictus oris extenditur, et in fronte alia lon-
gitudinalis, interdum e punctis tantum saturationibus
constans. Subtus unicolor aut maculis determina-
tis obscurata. Apex caudæ oblongus, corneus, acu-
tus. Scuta abdom. 170—184, subcaud. 56—52.

$$1^{\circ} \text{ long. } \frac{\text{corp.}}{\text{caud}} = \frac{4'. 4''. 2'''}{3'' 6'''} = 3, 761....$$

$$2^{\circ} \frac{\text{corp}}{\text{caud}} = \frac{4'. 5'' 4'''}{3'' 4'''} = 5, 4.$$

Var. b.) Sordide fuscescenti-olivacea fere unicolor,
subtus stramineo flavescens, immaculata.

In omnibus notis cum antecedenti congruit, solis
coloribus diversa. Strigæ fuscae capitis uti in illa
apparent. Margo labii superioris pallidus, ventre
concolor. Scut. abd. 179. subc. 57.

$$\text{long } \frac{\text{corp}}{\text{caud}} = \frac{4', 5'', 40''}{4''} = 4, 45...$$

Patria: Don (in desertis circa Axaj mense septemb. 1835 an. inveni).

SQUAMÆ OMNES ÆQUALES.

5.) *Coluber mæota*.

Corpore dilute-cinero, maculis manifestis fuscis seriatim dispositis, medio dorsi oblique transversis; capite distincto, crasso, occipite parum convexo, scuto verticali sub-triangulari.

Animal pulchre et manifeste undique maculis fuscis, obscuris ornatum. Caput crassum, elevatum trunco multo latius, rostro brevi, obtuse-rotundato. In fronte ante oculos observatur fascia lata, fere nigra, lunata, cujus extremitates oblique extenduntur trans eos supra angulum rictus, et aliæ binæ, etiam latæ, longitudinales ad collum. Pone eas incipitur series dorsi e maculis majoribus, subtetragonis, oblique transversis, interruptis, et altera utrinque e minoribus, rotundatis. Pars inferior maculis punctisque inordinatis, stipata. Squamæ corporis undique fere æquales, ordinum usque ad 22, ad nucham tantum abbreviatæ rotundatæ, reliquæ vero magis ovatæ, apicibus rotundatis. Cauda attenuata acuta. Scut. abd. 218, subc. 6½, long $\frac{\text{corp}}{\text{caud}} = \frac{44'' 4''}{2'' 4''} = 5' 44$.

Habitat in Guber. taurico et chersonensi, ubi ad marium littora præsertim inter montes calcareos et

argillaceos occurrit. *C. ponticus* Güld seu *C. maota* Pall. Zoogr. III. 47. 45 ex uno specimine mutilato (cauda abrupta) descriptus, videtur hic referendus; forsán etiam a cell. Andrzejowskio sub nomine *C. laevis*. l. c. 332. 2 indicatus.

Conferendus cum. *C. Hermannii* Desmar. (haud Meer.) Faune Franç. Pl. 49 cujus descriptio mihi adhuc deest.

5.) *Coluber reticulatus*?

Supra striolis obscuris reticulatus, subtus pallidus unicolor, squamis medio punctis albis, creberrimis quasi pulverulentus; capite subdistincto, ovato, plano obscuriore; scuto verticali triangulare.

Corpus gracile, teres, collo attenuato; cauda brevi, tenui, mucrone oblongo, acuto. Squamæ omnes fere æquales, glabræ, ovato-latiusculæ, ad nucham quodammodo angustiores, coloris obscuri, punctis creberrimis, albis medio quasi pulverulosæ, unde a marginibus earum haud punctatis, animal superne et ad latera lineolis obscuris anastomosantibus pictum. Inferne unicolor immaculatum.

$$\frac{\text{scutis.}}{\text{scutell}} = \frac{192}{53}, \quad \frac{\text{corp.}}{\text{caud.}} = \frac{8'' 6'''}{4'' 7'''} = 5, 3...$$

Unum solummodo hujus speciei individuum examinaui, ab Amicis. Kaleniczenkowio in Caucaso (monte Maschuka) repertum spirituque vini conservatum, quod senectam exuit et colores naturales evidenter mutavit. Pictura corporis eadem fere sicuti in *C. reticulato* Ménétr. 71. 237. sed scutorum numero,

squamis punctatis etc. paulatim differt ab illo, æque ac a *C. caucasio* Pall. Zoog. III. 46. 43.

VIPERA. DAUD.

SCUTIS MAJORIBUS TRIBUS MEDIO FRONTIS.

1.) *Vipera chersea*.

Capite distincto, ovato, rostri scuto apicali profunde emarginato; corpore supra cinerascens, fascia dorsi utrinque sinuata maculisque lateralibus saturate fuscis; cauda unguiculo apicali brevissimo, arcuato.

Coluber Chersea L. Act. Stockh. 1749 p. 246 Tab VI.—*Vip. Chersea*. Cuv. 11 92—*Pelias Chersea*. Ménét. 73. 240
V. Berus Daud. VI. 144 Pall. Zoogr. III. 50. 48 etc.

A cell. Pallasio in Zoographia sub nomine *V. Beri* quoad dispositionem colorum aliasque notas optime delineata, circa Charkoviam haud rara, sed in desertis australioribus in herbidosi frequentissima. In utero feminae 8 julii an 1827 prope Nikolajew obviæ, inveni 13 pullos partim tegumento adhuc tectos, quorum maximus fuit superne unicolor, saturate fuscus, squamulis scutisque jam præditus et ultra 4 poll. longus.

2.) *Vipera prester*.

Capite indistincto; elongato, scuto apicali submarginato; corpore aterrimo, unicolori; cauda unguiculo brevissimo terminata.

Vipera Prester. L. Pall. Zoogr. III. 50. 49—Sturm. III. 5. 1—Desmar. Fau. Franç. Tab. 13.

A multis pro varietate *V. chersæ* habita, re vera distinctissima species. Distinguitur ab illa primo intuitu capite collo vix latiori, valde elongato, rostro rotundato, obtuso, minus elevato, scuto apicali minus emarginato, telis maxillarum tenuissimis, longissimis dentibusque palati fere setaceis, longis, caudæ unguiculo recto etc. Color undique æqualis, imo sub epidermide (*) aterrimus, in adultis, præsertim tempore autumnali, superne in brunescentem vergit. Tria specimina charcoviana, quæ investigare occasio fuit, præter summos margines scutorum paululum dilatiores, nullam aliam coloris variationem habuere. Squamæ ut in *chersæ*, tantummodo laterales magis ovatæ et caudales magis rhombeæ esse videntur.

Amat loca elevationiora in sylvis nemoribusque circa Charcoviam (Даниловка).

RANA. LAUR.

1.) *Rana cachinnans*.

Capite convexo late-ovato, superciliis gibbis; corpore supra vario, striga spinali flavo-viridi granulisque sparsis, minutissimis, subtus glaberrimo, maculato.

Rana cachinnans. Pall. Zoogr. III. 7. 1—*R. ridibunda* Pall. it I. 458. 14—Gmel. 1051. 25—Meer. 175 7—

(*) *V. chersæ* dum senectam exuit, ne nigricare, uti ajunt nonnulli, sed maculas vivacius ostendere, plures me docent observationes.

Caput antice rotundato-attenuatum, lateribus parum arcuatis. Corpus superne olivaceum, fusco maculatum, fascia dorsali a rostro ad anum viridescenti notatum, nitidum, glaberrimum, sub lente tamen granulis minutis, acutiusculis, sparsis, conspicuis, versus latera subrugosum; subtus flavescente albidum, glaberrimum, maculatum.

Species hæc apud nos vulgatissima habitat omnes aquas, quæ e *R. esculenta*. L. populatæ sunt, æqualimodo sicuti *Astacus leptodactylus*. Esch. qui loco *A. fluviatilis* Fabr. nonsolum nostram lineam isothermicam occupat, sed latius adhuc in Guber. Kurskiensi porrigitur.

2.) *Rana dentex*. mihi Tab. II.

Capite depresso, superciliis planis, dentibus maxillæ superioris exsertis; corpore undique creberrime punctulato, supra sordide griseo, fusco maculato, verruculoso et poruloso, subtus flavescente albo, subunicolore.

Inter *R. cachinnantem* et *R. temporariam* quasi intermedia, magnitudine et vitæ ordine ad primam accedit, pictura vero colorum, forma capitis, dorso gibbo, angustato etc. magis ultimam, præcipue grandævam, refert.

Caput nostræ antice angustatum, obtusiusculum, lateribus rectoribus, quam in præcedente, subtriangulum et magis depressum. Labium inferius abbreviatum, superius antice subsinuatum, dentibus maxillæ superioris conspicuis, exsertis, lateralibus parum

longioribus (*). Pedunculi dentium palati etiam evidentiores, magis ad apicem approximati. Rictus oris amplissimus, angulo suo longe pone oculum sub tympano locato. Lingua late ovato-cordata, apice excisa, ramulis retusis. Supercilia plana, margine laterali recto. Tympana plana, rugosiuscula. Vesiculæ paroticæ maris admodum magnæ ex membrana fusca.

Corpus elongatum, valde depressum, antice latius versus femora angustatum, lumbis angulatis, undique punctis creberrimis obsitum, *superne* sordide-griseum, maculis nigricantibus majoribus cum minoribus; artuum subfascieformibus, varie pictum lineaque interdum vertebrali albicante. Præter puncta jam memorata, dorsum præsertim parte posteriori cum pedibus adpersum est verrucis parvis, crebris, medio porulosis; latera verrucosa rugosaque, maculis aterrimis. Plica dorsalis utrinque obsoleta, crassa ab oculis ad femora. *Pars inferior* sæpissime unicolor flavescente alba, glabra ipsoque ventre cum femoribus haud granulosis, at confertissime concavopunctata. *Palmæ* tetradactylæ, fissæ, pollice divaricato, marium basi nimis incrassato, medio longiori, subtus biverrucoso. *Plantæ* maximæ, palmatæ membrana tenui, fusco nebulosa; pollex brevis, basi callo oblongo, parvo, quartus longissimus, quadriar-

(*) Dentes maxillares Ranarum, nisi tantum in scelecto, e gingivis inconspicui sunt.

ticulatus, subtus tripapillaris. Digiti, omnes acutiusculi, apicibus rotundatis.

Quoad colorum picturam in individuis diversi sexus et ætatis sequentes vidi variationes :

- a) Dilute grisea, maculis magnis cum minoribus intermixtis fasciisque tribus latis femorum et tibiæ nigris; linea vertebrali parum manifesta punctisque numerosissimis in tota superficie albicantibus subtus exalbida. Femina adulta.
- b.) Obscure grisea maculis fasciisque artuum minus conspicuis, linea per dorsum albicante, dilatata, ad anum excurrente manifesta. Subtus exalbida. *Femina* vix 4", 10" longa dentibus jam exsertis.
- c.) Dilute grisea, superne maculis plurimis rotundatis, subocellatis artibusque fasciis subquaternis, nigris. Subtus alba. Specimen 4" 5" long.
- d.) Obscure grisea, maculis nonnullis dorsi maximis cum minoribus artibusque subfasciatis. Subtus maculis et punctis sparsis griseis oblitteratis. *Mas adultus* species pictura colorum superne obscura a prima jam ætate a 10" longitudinis, insignis.

Long. corporis a rostro ad anum 3", 6" femor. ab ano 4" 7". tibiæ 4" 9". plantæ 2" 6". Rictus oris a summo rostro ad angulum 4" Latit. trans maxill. infer. inter angulos 4" 2".

Patria: Caucasus in amne Podkumok (Пампгорскъ) Adj. Kaleniczénkow—in lacu arundine tecto (Вшивое озеро) in circuitu Stauropolis. Ipse clamorem ejus non audivi.

A nonnullis auctoribus sub nomine *R. ridibunda* et forsan ab ipso Pallasio in itinere cum *R. cachinanti*, dein a Güldenstædtio sub *R. caucasica* cum *R. temporaria* grandæva, videtur confusa.

Nota. Descriptio Güldenstædtii (in Zoogr. p. 15) *Ranæ caucasicæ* optime cum specie nostra convenit, attamen ex propriis ejus schedis »Pone angulos rictus oris *sinus cæcus*, e duplicatura cutis ortus.... supra hunc *aures* etc» quædam incertitudo nascitur. Equidem mares adulti sub tympano utrinque commonstrant impressionem cum vesiculis paroticis, quæ sæpe post animalis mortem extra pendentes permanent, sed istæ minime e duplicatura cutis ortæ. Ceterum cel. Ménétries *R. causicam* 74. 244. (si tantum recte eam dignovit) inter *Bufones* enumeravit, cui tamen artuum proportio (long. corp. 3" 8". ped. poster. 6". Guld.) negari videtur. Nostra species omnibus notis *Ranarum* gaudet, et plane aquatilis est.

3.) *Rana temporaria*.

Capite deplanato, rostro acutiusculo, superciliis convexis; corpore supra e rufo vel griseo fusciscenti, subglabro, macula utrinque parotica, magna, liturisque sparsis nigris; abdomine inferne femoribusque granulosis.

Rana temporaria. Lin. Fau. Sv. 101. 278—Sturm III. 1. 5—

Pall. Zoogr. 10. 2. etc.

Sunt mihi præsto duo ejus individua, unum charcovianum, alterum e Caucaso, quorum pars inferior corporis simili modo punctulata quam in *R. Den-*

tici, cui etiam ex ultimo loco specimina adulta primo intuitu sat proxima esse apparent; sed vera *R. temporaria* coloribus superne dilutioribus, plicis dorsii angustis, elevatis, maculis paroticis constantibus, rictu oris parvo cum angulo sub extremitate postica oculi finito, dentibus haud exsertis, superciliis convexis et abdomine cum femoribus granulosis, facile distinguenda. Pars inferior abdominis et femorum in hac specie, quasi pro vita terrestri cute rudi et arcte granulosa tecta. In specimine caucasico plus quam tripollicare, longitudo rictus oris 8'', latitudo maxillæ infer. 44'' solummodo adæquant.

Habitat in locis umbrosis passim non raro. Charc. Poltava. Ekatherinosl. Caucas. etc.

HYLA. LAUR.

- 4.) *Hyla arborea*. Laur. Amph. 37 *Rana arborea* L. Pall. Zoogr. III. II. 4—Sturm. III. I. 7 etc.
Charcov. rara, in australioribus frequentior.

BUFO. LAUR.

- 4.) *Bufo variabilis* Pall. Zoogr. III. 43. 7 — Brandt und Ratzeb. Arzneithiere Bd. I. p. 197 tab. XXIII. f. 2 icon optima etc.

Apud nos per totam Ucrainiam, Kijoviam etc. usque ad littora marium vulgatissima species, circa pagos et domos etiam in caveis, ubi hieme torpet. In Caucaso mense septembre observavi illam frequenter meridiei tempore in agris ambulantem; ex hac regione individa communiter majora sunt, ma-

culis obscuris fere confluentibus. Ad mare nigrum locis apertis, torridis sæpe eam ex fissuris terræ profundis aqua expellebam, ubi gregatim tempore diurno in contubernio non raro Blapium delitescere solet. Denique species hæc in nostris regionibus sæpe sub pavimento intra domos hibernat simulque per totam hiemem vocæ morate sat clara et alta amoeni temporis futuri nuntia asservit.

- 2.) *Bufo fuscus*. Laur. 28—Merr. 183. 13—Sturm. III. I. 4—Cuv. II. 440—*Rana cruenta*? Pall. Hibernat in terra ad radices arborum haud precul ab aqua. Frequens.

BOMBINATOR. Merr.

- 4.) *B. igneus*. Merr. 479. 4. Cuv. II. III—*Rana Bombina* Lin—Sturm III. I. 3—etc. Frequens.

TRITON. LAUR.

- 4.) *Tr. cristatus*. Latr. Salam. 43. III. 3—*Molge palustris* Merr. 487. 8—Sturm. (Lacerta) III. 3 2—etc. Ex rarioribus.
- 2.) *Tr. punctatus*. Latr. 53. VI. 6—Merr. 486. 4—*Lac. tæniata*. Sturm. III. 3 n. 3 mas—etc. Frequens.
- 3.) *Tr. abdominalis*. Daud. VIII. 250—Latr. 50. V. 4—*Molge cinerea* Merr. 485 3—*Lac. tæniata* Sturm. III. 3. n. 3 femina—etc.

Corpus supra glabrum, subtus maculis parvis, rotundis, fuscis granulisque minutissimis creberrimis,

præcipue feminarum, notatum; cauda compressa, anceps, acuta, membrana integra circumdata, quæ apud marem a nucha fere incipit, at humilis et vix conspicua est ab initio. Vere et æstate in aquis stagnantibus vulgaris. *Lac. aquatica?* Pall. Zoogr. III. 34 28.

Primo vere et autumnno (cauda teretiuscula) in locis humidis sub cortice arborum frequens.



ЗАМѢЧАНІЯ

О

ПРОИСХОЖДЕНІИ ГРАДА

Д. Ч. Д. М. ПЕРЕВОЩИКОВА.

Въ 1829 году, въ одной изъ книжекъ журнала: *Новый Магазинъ Естественной Исторіи, Физики и Химіи*, издаваемого Г-мъ *Двигубскимъ*, я помѣстилъ небольшое разсужденіе о происхожденіи града, которое удостоилось вниманія *Общества Естествоиспытателей*, и переведенное на Французскій языкъ Г-мъ Профессоромъ Гейманомъ, было напечатано въ томъ-же году въ IV N° Бюллетеня общества. Въ этомъ разсужденіи, изъ охлажденія быстро испаряющейся жидкости (крѣпкаго виннаго спирта) *отъ прямаго на нее дѣйствія солнечныхъ лучей* я вывелъ заключеніе, что градъ образуется единственно отъ охлажденія паровъ въ верхнихъ слояхъ тучи, которая нижнею своею стороною пересѣкаетъ лучеобразное тепло земли (см. въ Бюллетенѣ стр. 134.), съ верхней-же теряетъ собственное тепло, истекающее также лучеобразно въ небесное пространство. Сіе истеченіе тепла, соединенное съ испареніемъ водяныхъ пузырьковъ, составляющихъ тучу, производившъ, по моему мнѣнію, такое пониженіе температуры, которое до-

спешно для образованія града. Вмѣстѣ съ симъ я замѣнилъ, что электричество атмосферное несколько не участвуетъ въ упомянутомъ явленіи, и поному Апостолевы соломенные громовые ошводы не могутъ принести предполагаемой пользы. Нѣкоторые изъ занимающихся Физикою возражали мнѣ, что градъ всегда сопровождается грозою, и слѣд. нельзя отвергать участіе электричества въ его образованіи. Это возраженіе я всегда считалъ немѣющимъ никакого вѣса, поному что современность двухъ явленій не доказываетъ ихъ взаимной зависимости. Припомъ многія причины заставляющъ меня думать, что Физика слишкомъ уже обобщаетъ дѣйствія электричества, причислая его къ основнымъ силамъ природы; мнѣ кажется, что оно есть *явленіе производное*, и только по всеобщей связи естественныхъ явленій спановится *причиною*. Впрочемъ, немоги съ надлежащею точностью объяснить независимость грозы и града при ихъ современности, я не былъ въ состояніи отвѣчать удовлетворительно на возраженіе: ибо въ наукахъ Физическихъ чисто умозрительные доводы не позволено считатьъ доказательствами положительными. Нынѣ, пересматривая книжки Женеваго Журнала *Bibliothèque universelle*—на 1836 годъ, въ 6-мъ N° я встрѣчилъ спашью извѣснаго Профессора *Lariva: Notice sur la formation de la grêle*, и нашелъ въ ней, что сей оплитный ученый о происхожденіи града имѣетъ мнѣніе, въ основаніи своемъ, совершенно сходное съ моимъ, и отъ

личающееся только подробностями. Въѣтъ съ нѣтъ онѣ предлагася новое, и какъ я думаю удовлетворительное объясненіе атмосфернаго электричества. Изъ этого объясненія во всей ясности открываея причина одной только современности града и грозы. Такимъ образомъ, въ запискѣ Г. Ларива содержится рѣшительное опроверженіе вышеупомянутого возраженія, и явленіе града, какъ слѣдствіе охлажденія въ тучахъ, приводишея къ истинной, указанной мною причинѣ.

Если Общество обратило свое вниманіе на предложенное мною мнѣніе; то полагаю, что конечное усовершенствованіе этой теоріи также можетъ занять его достойнымъ образомъ: вошъ почему представляю обществу извлеченіе изъ записки Ларива съ нѣкоторыми моими замѣчаніями.

Прежде всего надобно упомянуть, что Г. Ларивъ предложилъ свое разсужденіе по поводу описанія двухъ сильныхъ грозъ, бывшихъ 1835 года въ Іюль и Августѣ мѣсяцахъ, въ окрестностяхъ Клермона. Описаніе это составлено извѣстнымъ Географомъ *Лекокомъ*, который послѣднюю грозу наблюдалъ на вершинѣ Пюп-де-дома, гдѣ образованіе града совершалось предъ его глазами. Такимъ счастливымъ случаемъ Г. *Лекокъ* воспользовался, какъ опытный и безпристрастный наблюдатель, и сообщилъ ученымъ всѣ *данныя*, необходимыя для составленія точнаго понятія о столь многосложномъ и шемномъ явленіи; а потому сокращеніе его замѣчаній также должно имѣть здѣсь мѣсто.

Въ 6 часовъ ушра 2 Августа опираваля онъ изъ Клермона, и въ 10 часовъ доспигъ подошвы Шюп-де-дома. Погода была ясная, солнце свѣпило ярко; но вѣспрѣшвишесе съ нимъ пасухи предвѣщали грозу и совѣшновали ему заблаговременно искапъ убѣжища. Г. *Лекокъ* не принялъ совѣша; желаніе бытъ свидѣтелемъ великолѣпнаго зрѣлища повлекло его на вершину горы, на кошорую возшелъ онъ около полудня. Западный вѣспръ наносилъ шонкія облака, проходящія въ близкомъ разстояніи надъ его головою, не закрывая солнца. Потомъ другія облака опдѣлились онъ Мондора и приближались къ нему, будучи гонимы сильнымъ южнымъ вѣспромъ, начавшимся вскорѣ послѣ полудня. Такимъ образомъ составлялись два шолешыхъ слоя облаковъ, движущихся по двумъ различнымъ направлениамъ; идущія съ юга находились на малой высонѣ и соединяясь между собою, образовали шучу черную и шяжелую, кошорая двигалась къ сѣверу весьма медленно, и выгибалась снизу: изъ эшого выгиба вскорѣ полился шоннокъ воды, упавшій на весьма ограниченное проспранство, и облегчившій шучу: вѣспръ унесъ ее за предѣлы горизонша. Сіе явленіе возобновлялось нѣсколько разъ въ продолженіе часа; между шѣмъ западный вѣспръ скопиль большое количество облаковъ, покрывшихъ все небо. Подъ эшомъ покровъ южный вѣспръ приносилъ бѣлыя облака, кошорыя не составляли непрерывной массы, но въ видѣ ключевъ двигались быспро, съ разными скоростями и въ разныхъ одно

онъ другого разсояніяхъ; время онъ времени извивалась между ними молнія; иногда казалось, что она занимала все пространство между Пюи-де-домомъ и—мондоромъ, но ограничивалась только нижнимъ слоемъ паровъ, непроникая въ воздухъ, опдѣлявшій эшомъ слой онъ верхней тучи. На вершинѣ Пюи-де-дома вѣтеръ усилился и сдѣлалось весьма холодно; тогда изъ нижнихъ облаковъ выпалъ градъ, въ разстояніи 50-ти метровъ отъ вершины. Градъ падалъ изъ облака, имѣвшаго зубчатый край, въ конюрыхъ видно было особеннаго рода волненіе; казалось, что градины были выбрасываемы дѣйствіемъ электрическаго оппалкиванія: одніе изъ нихъ выпадали снизу, другіе-же сверху облака. Такое необыкновенное колебаніе продолжалось онъ 5 до 6 минутъ.

Г. Лекокъ ожидалъ повторенія того-же самаго явленія: но вдругъ онъ былъ окруженъ сильнымъ блескомъ молніи, возгорѣвшей въ нижнихъ облакахъ, конюры краями своими касались Пюи-де-дома. Опасность заставила его перемѣнить мѣсто наблюдений; онъ перешелъ на покатошь горы Пюи-де-кома. Тогда было при часа по полудни; состояніе неба почти не перемѣнялось, два слоя облаковъ еще существовали; южный, весьма холодный вѣтеръ дулъ сильно, и пригналъ новое облако обремененное градомъ. Это облако почти 5 минутъ окружало Г. Лекока; градины были мѣлки, не болѣе обыкновеннаго орѣха, состояли изъ концентрическихъ, болѣе или менѣе прозрач-

ныхъ слоевъ, овально окруженныхъ; всѣ они двигались горизонтально съ чрезвычайною скоростью; но ихъ направленіе измѣнялось нѣсколько припаженіемъ горы, на которую онѣ упали во множествѣ. Многія изъ нихъ касались наблюдателя, не причиняя ни малѣйшаго вреда. Большая часть облака проходила надъ его головою, и онѣ явственно слышалъ свистъ, безъ сомнѣнія, проходящій онѣ воздухомъ, попрысаемаго быстрымъ движеніемъ градинъ, которыя кромѣ того обращались еще на своихъ осяхъ по разнымъ направленіямъ, что замѣтилъ Г. *Лекокъ* принимая градины на свою шляпу подставляя ее горизонтально по возможности. Это явленіе продолжалось до четырехъ часовъ, когда оба облака слились въ одну массу.

Описаніе Г. *Лекока* оканчивается общими заключеніями касательно образованія града; изъ нихъ слѣдующія достойны особеннаго вниманія:

1). Два слоя облаковъ и два различныхъ вѣтра необходимы для образованія града.

2). Градины не переходятъ онѣ одного облака къ другому, какъ предполагалъ Вольфа; напротивъ, онѣ имѣютъ быстрое движеніе горизонтальное, будучи гонимы весьма холоднымъ вѣтромъ.

3). Весьма вѣроятно, что нижнее облако удерживается верхнимъ, по причинѣ ихъ противоположныхъ электричествъ.

4). Нѣтъ сомнѣнія, что причина образованія градинъ есть холодъ; объемъ ихъ увеличивается онѣ новаго охлажденія, производимаго испареніемъ

ихъ поверхностей; самое-же испареніе происходитъ отъ быстрого ихъ движенія.

Предложивъ наблюденія и заключенія Г. *Лекока*, которыя совершенно опровергають предложеніе Вольши, переходимъ къ объясненіямъ Г. *Ларива*; изъ нихъ увидимъ со всею ясносью, откуда рождается электричество въ атмосферѣ, сколько участвуетъ оно въ образованіи града, и для чего необходимы два слоя облаковъ, какъ замѣчаетъ Г. *Лекокъ*.

«Во всякомъ мѣстѣ нарушается равновѣсіе естественнаго электричества, какъ скоро тепло распространяется въ немъ неравномѣрно. Это физическое положеніе не подлежитъ нынѣ никакому сомнѣнію. И такъ вообразимъ вертикальную колонну атмосфернаго воздуха, въ тихое и ясное время, когда ни вѣтръ, ни облака не перемѣняютъ физическаго ея состоянія: эта колонна будетъ мѣло, въ которомъ температура уменьшается отъ основанія къ вершинѣ, находящейся на предѣлахъ атмосферы, гдѣ холодъ распространяется, по крайней мѣрѣ, до 50° столбатурнаго термометра.

«Сія большая разность температуръ на концахъ колонны увеличивается еще лѣтомъ и въ странахъ теплыхъ; потому что атмосфера нагревается не прямыми солнечными лучами, но тепломъ земнымъ, которое, распространяясь отъ основанія вертикальной массы воздуха, должно возбуждать естественное его электричество, коего сила увеличивается къ верху, по причинѣ возрас-

пающихъ разностей между температурами. Это теоретическое соображеніе подтверждается наблюденіями, показывающими, что въ тихое и ясное время атмосфера содержитъ электричество положительное, котораго сила увеличивается къ верху; отрицательное-же электричество, скопляющееся въ нижнихъ ея слояхъ, поглощается землею, которая электризуется всегда отрицательно, какъ, замѣтили *Соссюръ* и *Вольта*. »

Сіе простое и естественное объясненіе происхожденія атмосфернаго электричества, по моему мнѣнію, разрѣшаетъ одинъ изъ важнѣйшихъ физическихъ вопросовъ, который занималъ многихъ физиковъ, употребившихъ тщетныя усилія для открытія этой тайны. Всѣ они обращали вниманіе только на частныя явленія, и такъ сказать насильственно расширяли кругъ ихъ дѣйствія. На примѣръ, *Пулье* старался доказать, что атмосферное электричество происходитъ отъ испаренія и отъ органическаго дѣйствія растений. Сверхъ того замѣчаю, что начало, принимаемое *Г. Ларивомъ*, ясно доказываетъ, что электричество не есть сила первообразная, но явленіе производное. Впрочемъ этотъ важный вопросъ заслуживаетъ особенное изслѣдованіе и наиболее въ отношеніи къ химическимъ теоріямъ, такъ что его рѣшенію надобно ожидать именно отъ химиковъ, которые однакожъ не должны увлекаться духомъ какойнибудь системы и громкимъ именемъ ея основателя.

Принявъ изъясненное начало , *Г. Ларивъ* продол-
жаешъ : « когда часть воздуха , наполненная влаж-
ностью и приносимая въпрокъ , начинаешъ умень-
шаешъ прозрачность воздушной колонны и образо-
вашъ облака ; тогда состояніе ея электрическа
перемѣняешся ; пошому чшо облака раздѣляюшъ ее
на двѣ части , изъ коихъ въ нижней скопляется
земное тепло , которое не можешъ уже проникать
въ верхнюю ; слѣд. сія послѣдняя охлаждается болѣе
и болѣе , по мѣрѣ сгущенія облаковъ . Въснѣ съ
симъ очевидно , чшо нижняя поверхность облаковъ
должна пріобрѣтатъ высшую температуру , а верх-
няя несравненно низшую : отсюда происходитъ ,
чшо онѣ съ одной стороны электризуются отри-
цательно , съ другой же положительно , и такое
состояніе должно безпрестанно и уничтожаться
взаимнымъ соединеніемъ электричествъ , и возоб-
новляющъ дѣйствіемъ различныхъ температуръ .
Вопъ нѣ два слоя облаковъ , противоположно на-
электризованныхъ , о которыхъ упоминаешъ *Г. Ле-
кокъ* , и которые считаешъ онъ необходимыми для
образованія града . »


Изъ этого объясненія видимъ какимъ образомъ ,
одна и таже причина производяшъ два разныхъ
дѣйствія : возбуждаешъ электричество и охлаж-
даешъ верхнія части атмосферы , преграждая къ
нимъ доступъ земнаго тепла . Сіе охлажденіе , безъ
сомнѣнія , увеличивается еще лучеобразнымъ испе-
ченіемъ тепла изъ верхней стороны лучи и пспар-
еніемъ ея влажности , такъ чшо оно проникаешъ

даже внутрь массы облаковъ и дѣлается причиною холоднаго вѣтра, замѣченнаго Г. Лекокомъ. Но какъ велика можетъ быть степень охлажденія? — Ежели туча пріобрѣтаетъ такую густоту, что нимальшійшая часть земнаго шепла не проходитъ на верхнюю ея сторону; но первоначальное шепло, содержащееся вверху воздушной колонны до образования тучи, дѣйствіемъ лучеобразности, должно совершенно уничтожиться отъ чего температура ея понизится до температуры предѣловъ атмосферы, т. е. до -50° ; но такая крайность совсѣмъ не нужна для замерзанія водяныхъ капель; слѣд. градины на верхней сторонѣ тучи могутъ образоваться вскорѣ по наступленіи грозы, или вмѣстѣ съ грозой. Сославившійся градъ спускается внутрь тучи, въ предѣлы дѣйствія вѣтра, который сообщаетъ имъ горизонтальное направленіе до тѣхъ поръ пока онѣ переходя чрезъ разные слои паровъ, увеличивается по объему и массѣ, и по удѣльному вѣсу своему приметъ косвенное направленіе къ землѣ, т. е. діагональное между вертикальнымъ земной тяжестью и горизонтальнымъ вѣтра. Во время своего паденія градины могутъ еще увеличиваться или совсѣмъ уничтожаться; въ первомъ случаѣ они должны пролетать сквозь слои атмосферы, наполненные влажностью; во второмъ-же сквозь слои сухіе. Въ первомъ случаѣ приращеніе ихъ зависить отъ высоты паденія и отъ болѣе или менѣе низкой ихъ собственной температуры;

во вшоромъ же—ихъ уменьшеніе — опть степени сухости и температуры воздушныхъ слоевъ.

Такимъ образомъ всѣ явленія града объясняются безъ содѣйствія элекпричества, однимъ только необходимымъ охлажденіемъ; и послѣ сего на разсужденіе *Г. Ларива* мы осмѣемся сдѣлать только одно замѣчаніе.

Въ заключеніи своей записки онъ говоритъ: «Итакъ мы думаемъ, что градъ образуется въ высшихъ сферахъ атмосферы, гдѣ какъ извѣстно изъ наблюденій надъ кругами около солнца и луны (*halos*)—весьма часто плаваютъ ледяные кристаллики.» Предположеніе существованія ледяныхъ кристалликовъ, для объясненія круговъ около солнца, введено въ физику *Гугенсомъ*; но это неудовлетворительное предположеніе нынѣ оставлено; вмѣсто его *Фраунгоферъ* объяснилъ сіе явленіе непосредственными опытами, и вычисленіями опредѣлилъ всѣ условія и размѣры онаго. И такъ новаго подтвержденія предложенной теоріи града, точной и не подлежащей болѣе ни какому сомнѣнію, нынѣ надобности искать въ упомянутой произвольной гипотезѣ *Гугенса*.



SÉANCES

DE LA

SOCIÉTÉ IMPÉRIALE DES NATURALISTES

DE MOSCOU.

SÉANCE DU 20 JANVIER 1837.

Ouvrages offerts.

Mémoires de l'Académie IMPÉRIALE des Sciences de St. Pétersbourg. Sciences mathématiques et physiques T. IV livr. 4; et Sciences naturelles T. II livr. 3.; par l'Académie.

Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève, par la Société.

Geometrische Analysis, etc, par l'auteur M. PAUCKER de Mittau.

Objets offerts.

M. le Contre-Amiral Baron WRANCEL envoie quelques oiseaux du Brésil et un exemplaire de l'*Hystrix dorsata*. LIN.

Lectures.


M. le professeur PÉRÉVOSTCHIKOFF lit un projet sur une expédition qui aurait pour but de dé-

terminer le point le plus élevé des montagnes d'Alaounsk.

M. BIKHOVETZ lit un mémoire sur la présence des corps organisés fossiles dans la dolomie du district de Taroussa.

Membre élu.

Sur la proposition de M. le professeur HEIMANN, M. le Docteur GROOM à St. Pétersbourg.




ERRATUM

DU N° 2 DU BULLETIN.

Page 67 ligne 1 Stemodes lisez Sternodes.

BULLETIN

DE LA



Société Impériale

DES NATURALISTES

de Moscou.

ANNÉE 1837.

N° IV.

Moscou,

DE L'IMPRIMERIE D'AUGUSTE SEMEN,
IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE MÉDICO-CHIRURGICALE.

~~~~~  
1837.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,  
съ шѣмъ, чптобы по опшечашаніи были въ Ценсурный Комитетъ  
доставлено узаконенное число экземпляровъ.

Москва, Маіа 7 дня, 1837 года.

Ценсоръ и Кавалеръ *И. Снегиревъ.*

# NOTICE

SUR

## LES MÉLASOMES.

*Lue à la Société le 20 Janvier 1837.*

PAR

G. FISCHER DE WALDHEIM.

---

Les Mélasomes composent une famille de coléoptères hétéromères, caractérisée suivant LATREILLE par la présence d'une dent cornée aux mâchoires. Quoique ce caractère ne soit pas toujours constant et que l'on trouve des genres dont les mâchoires sont privées de dent cornée, la forme extérieure est cependant tellement conforme aux autres, qu'il serait difficile de les séparer des Mélasomes.

La famille des Mélasomes doit nous intéresser d'autant plus que plusieurs contrées de la Russie sont riches en insectes de cette famille. Les endroits sablonneux, conséquemment les steppes, sont la vraie patrie des Mélasomes. L'expédition à Bokara, accompagnée par les Naturalistes MM. PANDER

et EVERSMAH, nous a fait connaître combien de formes différentes de cette famille la Grande Tartarie recèle. L'entomographie de la Russie qui a paru depuis 1822 contient plusieurs de ces formes, telles que *Platyope*, *Ocnera*, *Adesmia*, *Diesia*, *Hedyphanes*, *Tagona*, *Gnathosia*, *Gnaptor*; et quoique les Naturalistes français n'adoptent pas tous ces genres ou les présentent sous d'autres noms, (p. e. *Adesmia* (\*) est remplacé par *Trachyderma* de LATREILLE) des Naturalistes russes, MM. FALDERMANN, MÉNÉTRIÉS et KARÉLINE, ont trouvé et décrit des espèces qui confirment ces genres. M. KARÉLINE en a découvert en Turcménie de très intéressantes. Je n'en citerai que deux inédites et très belles, une *Ocnera* des plus grandes, de 43 lignes de longueur; *Ocn. costata* m. *elongata*, *thorace gibbo*, *elytris costatis*, *costis muricatis*. L'autre est un insecte intermédiaire entre *Diesia* et *Pimelia*. Je l'ai laissé en attendant sous le genre *Pimelia*, en lui attribuant le nom de l'espèce *intermedia*. Sa description se trouve à la fin de cette notice.

Mais cette famille a trouvé en France des Entomologistes distingués, qui la traitent avec des observations tellement étendues qu'ils nous font désespérer de pouvoir les suivre même de loin. Je parle de MM. SOLIER et GUÉRIN.

---

(\*) *Adesmiæ* genus speciebus quibusdam novis illustratum. V. Bulletin. Vol. VIII. 1835. p. 310—316, avec 1 pl.

SOLIER (Annales de la Soc. entom. Vol. III. p. 479-636. pl. XII-XIV.) embrasse tout l'ordre des Hétéromères et le divise en sept familles ainsi qu'il suit.

I. *Séléroptérides*. Ongles simples et pointus, les avant-cuisses non proéminentes :

A. Mandibules grandes, proéminens, intérieurement fortement dentés..... 4 F. *Phrépatides*.

B. Mandibules courtes, non proéminens

1. Dent intérieure

\* Elytres réunis, point d'ailes..... 2 F. *Collaptérides*.

\*\* Elytres séparés, ailes quelquefois très petites..... 3 F. *Cryptoptérides*.

II. *Cistelides*. Ongles dentés, Tête sans cou apparent..... 4 F.

III. *Euschionides*. Ongles simples ou profondément fourchus. Avant-cuisses proéminentes;

A. Avant-dos trapézoïde, Tête retractée..... 5 F. *Clynocephalides*.

B. Avant-dos rectangulaire, Tête avec cou..... 6 F. *Trachelides*.

C. Avant-dos grêle, postérieurement plus mince, tête sans cou..... 7 F. *Leptorides*.



A la première famille appartiennent les genres *Phrepates* et *Trictenoma* ; à la seconde les *Pimeliariæ* et *Blapsides* de LATREILLE ; à la troisième les *Hélopiens* et les *Ténébrionides* ; à la quatrième les *Cistelides* ; à la cinquième les *Sécuripalpes* et *Mordellides* ; à la sixième les *Vésicifiques* et à la septième les *Lagirides* et les *Rhinosimides*.

La seconde famille a été traitée jusqu'à présent en particulier. Elle contient 15 tribus. 1. les *Erodides* ; 2. les *Tentyrides* ; 3. les *Macropodides* ; 4. les *Pimelides* ; 5. les *Nyctélides* ; 6. les *Asidides* ; 7. les *Akisides* ; 8. les *Adelostemides* ; 9. les *Tagénides* ; 10. les *Scaurides* ; 11. les *Proacides* ; 12. les *Zophosides* ; 13. les *Molurides* ; 14. les *Blapsides* ; et 15. les *Pedinides*.

Les distinctions de ces tribus sont prises de la forme du menton, des antennes, des palpes, du prothorax et des jambes.

Jusqu'à présent M. SOLIER n'a donné que l'exposition des *Erodides*, qui comprennent 6 genres :

|                  |      |           |
|------------------|------|-----------|
| Leptonychus avec | 2    | espèces ; |
| Arthrodeis       | » 3  | »         |
| Diodontos        | » 3  | »         |
| Erodus           | » 31 | »         |
| Anodesis         | » 4  | »         |
| Zophosis         | » 32 | »         |

Ces genres, comme les espèces, sont rendus clairs par des tableaux synoptiques et des descriptions détaillées. Les caractères des genres sont exposés dans 4 planches qui accompagnent ce mémoire intéressant.

Un travail semblable a occupé M. GUÉRIN qui n'a publié jusqu'ici que des *matériaux pour une classification des Mélasomes* (Magasin de Zoologie. 1834. 8.). Ces matériaux montrent déjà les richesses dont l'auteur dotera cette famille.

Les genres suivans ont été décrits et figurés. *Physogaster mendocinus* Lacordaire, du Chili. Lacordaire a donné un mémoire *sur les mœurs des insectes d'Amérique* (Annal. des Sc. Nat. T. XX. p. 276), où il n'a indiqué que le nom de cet insecte et M. GUÉRIN en donne l'analyse et la description, en y ajoutant une nouvelle espèce, *Ph. tomentosus* de Valéaraiso.

*Nyctelia* de LATREILLE se trouve augmenté de quatre espèces.

*Gyriosomus* de GUÉRIN y est introduit avec cinq espèces (pl. 403).

A la suite de ce genre M. GUÉRIN place un insecte de la Nouv. Holl. avec le nom *Nyctozoilus obesus* (pl. 404). Il a quelque ressemblance avec *Nyctelia*, mais il en diffère par un labre très étroit, transversal point échancré en avant, par sa lèvre inférieure en forme de cœur, très rétréci en arrière etc.

Un petit genre qui remplace les *Zophosis* et les *Erodus* au Chili, c'est *Proacis* d'ESCHSCHOLTZ, que celui-ci avait placé avec les *Blapsides*, mais que M. GUÉRIN croit plus rapproché des *Erodus*. *Hegeter* y est décrit avec deux espèces nouvelles (pl. 406).

Mais comme une analyse de tous les genres me menerait trop loin, je vais en indiquer du moins

les noms pour faire connaître les richesses de ces matériaux.

*Salax*, pl. 107, 4 espèce.

*Hylithus*, pl. 108, 4 espèce.

*Maphorus*, genre voisin d'*Elenophorus*, avec 4 espèce, pl. 109.

*Evaniosomus*, avec 4 espèce, pl. 109 bis.

*Scatobius*, avec 9 espèces, pl. 110.

*Psammeticus*, 2 espèces.

M. GUÉRIN partage l'opinion de LATREILLE, qui réunit les *Psammodes* de KIRBY, à ses *Moluris*.

*Oxura*, 4 espèce, pl. 111.

*Acanthomerus*, avec 8 espèces, pl. 112, auxquelles appartient *Pim. mammillata* de HERBST.

Près du genre *Nycterinus* d'ESCHSCHOLTZ, il place *Ammophorus*, avec 2 espèces.

Un genre voisin de *Misolampus* est *Heliofugus* dont une espèce, *sulcatus*, est figurée, pl. 113.

*Misolampus Hoffmanseggii* se trouve figurée dans l'iconographie de CUVIER (pl. 21, f. 3). M. GUÉRIN donne ici les caractères de la bouche (pl. 114, f. 2, 3) en y ajoutant une nouvelle espèce de Tanger, *Heliof. Gouldotii* (pl. 114, f. 4).

*Pseudoblaps* a deux espèces *substriatus* et *curvipes* (pl. 115).

*Xysta* ESCH. a reçu une nouvelle espèce, *striata*; *gravida* ESCH. est figurée. pl. 116, f. 1.

*Elodes dentipes* ESCH., pl. 117, f. 1.

*Anthrasomus Chevrolatii* voisine le genre *Platysomus* de FABR.

*D'Opatrum*, deux nouvelles espèces, *elongatum* et *latipes*.

*Tenebrio Gigas* FABR. et quelques autres forment pour M. GUÉRIN un nouveau genre *Nyctobates* (pl. 118).

Quoiqu'il nous soit impossible de rivaliser avec tant de découvertes nouvelles, il nous reste toujours l'espérance de glaner sur ce vaste champ. M. le Dr. WIEDEMANN a apporté beaucoup de Mélasomes nouveaux de *Natolie*. Une partie est transférée en Italie, mais une partie est restée à l'Académie de St. Pétersbourg, et M. MÉNÉTRIÉS s'occupe de leur définition. Il nous a déjà fait connaître (Bull. de l'Acad. n. 49), *Pim. timarchoides*, *varicosa*, *Blaps abbreviata*, *plicaticollis*, *Cephalostenus orbicollis*.

Mais l'expédition sur les côtes orientales de la mer caspienne de M. KARÉLINE, accompagné de M. SABLOTZKY, offre une riche récolte pour les Mélasomes, d'après ce que j'ai appris par une lettre de M. KARÉLINE, transmis par moi à la Société, et par M. SABLOTZKY lui-même. La liste des espèces a été considérablement augmentée; les genres *Adesmia*, *Diesia*, *Ocnera* reçoivent de nouveaux soutiens et je suis persuadé qu'il s'y trouve même de nouveaux genres; mais il faut attendre l'arrivée de M. KARÉLINE lui-même pour en connaître le résultat. Je me permets une seule observation aujourd'hui, c'est que j'ai vu parmi les Mélasomes nouvellement découverts par M. KARÉLINE un insecte qu'il a

appelé *Pimelia albovittata*, qui sans doute mérite d'être caractérisé comme genre nouveau. Son corps applati exigerait un nom comme *Platynotus* ou *Platysoma*, si ces noms ne désignaient déjà d'autres insectes. Mais, exception faite d'autres caractères de la bouche etc., son *préthorax* à *sternum large et élevé* engage à lui attribuer le nom de *Sternodes*, d'un mot grec, *στερνωδης*, indiquant la circonstance à *poitrine forte*.

## STERNODES.

Pl. 1. f. 1. a—f.

*Clypeus* valde extensus.

*Labrum* latum prominens, integrum, setis rigidis dense marginatum.

*Mandibulæ* fortes bidentatæ.

*Maxillæ* elongatæ, arcuatæ, subulatæ.

*Palpi* subfiliformes, ultimo articulo parum dilatato compresso.

*Mentum* prominulum, magnum, emarginatum cordiforme.

*Antennæ* articulis omnibus elongatis obconicis setosis, tertio longissimo, ultimis tribus extensis, globosis; ultimo conico, penultimo et antepenultimo pyriformibus.

Oculi magni, subovati. Sternum singulari gaudet structura; latum, basi tuberculatum, prolongatum, apice liberum, supra glabrum infra setosum, tuberculis primi articuli abdominis insistens et cum iis articulans.



## STERNODES Karelini.

*St. ater* ; thorace transverso, gibbo, granulato, antice angulis prominulis ; abdomine dilatato, marginato, granulato, vittis tribus incompletis glabris albescentibus.

Long. 1" 1<sup>'''</sup>. Long. thoracis 5<sup>'''</sup>, abdom. 7<sup>'''</sup>, altitudo abdom. 4 $\frac{1}{2}$ <sup>'''</sup>.

*Pimelia bivittata*, KARELIN in litteris.

*Tenebrio caspicus* PALLAS Icones p. 47. Tab. C. f. 13.

*Ovato-depressiusculus*, thorace antice posticeque excavato, elytris utrinque carinatis, fasciis scaberrimis lævigatisque alternis.

Quoique l'individu de PALLAS soit plus petit, (de 44 lignes de longueur) et que les bandes ne fussent point blanches, il n'y a pas de doute que PALLAS parle du même animal, car il ajoute dans la description : « thorax *subtus mucrone sternali* plano rotundato, fere ut in *Elateribus*, sed horizontali, nullaque fossa pectoris respondente, » caractère, qui nous a également frappés et qui a dicté le nom générique. Je me permets d'attacher à l'espèce le nom de KARÉLINE, en l'honneur de notre Membre, naturaliste et voyageur infatigable, à la bonté duquel plusieurs entomologistes devront sans doute d'être mis en possession de ce coléoptère rare et singulier.

La tête est large, saillante, subtriangulaire, rétrécie près du chaperon, finement chagrinée à la base.

Le corselet large transverse, enflé, avec ses bords antérieurs proéminens, embrasse la tête. Le sternum large, commençant par une élévation granulée, se prolonge jusqu'entre la seconde paire de pattes où l'abdomen est muni d'une élévation tuberculeuse.

L'abdomen est très large, subovoïde et déprimé avec les angles huméraux saillans. L'écusson est large, mais très court, triangulaire et doublé pour ainsi dire par une impression à la base de la suture. L'abdomen est chagriné par des points élevés qui laissent entre eux des bandes lisses blanches. Ces bandes paraissent être formées par une matière gluante et endurcie qu'on peut enlever avec un scalpel, c'est pourquoi ces bandes ne sont pas uniformément constantes, la suturale est toujours la moins complète, la seconde, ou celle du milieu, conserve ses bords blanchis, et celle des bords est toujours la mieux conservée.

Les pieds, à proportion du volume du corps, sont faibles. Les cuisses un peu comprimées et granulées. Celles des pieds de devant ont un fort appendice scapulaire. Les jambes sont plus fortement chagrinées, munies de soies très longues et terminées par trois épines fortes et longues. Les tarses sont forts, à articles très serrés, avec des soies longues, terminés par le dernier article très allongé, obconique avec des ongles longs, courbés et pointus.

**PIMELIA** *intermedia*.

Pl. II. f. 3

*P. atra*, *nitens*, *thorace transverso*, *subquadrato*,  
*angulis anticis subprominulis*, *elytris tuberculato-*  
*muricatis*, *marginibus serratis*.

Long. 9<sup>'''</sup>. Lat. 5<sup>'''</sup>.

Cette espèce offre une forme intermédiaire entre *Pimelia* et *Diesia*. La lèvre est large, échancrée et ciliée de soies noires et rousses ; le chaperon est tuberculeux et la tête finement pointillée. Les antennes ont des articles très serrés. Le corselet est transverse, bombé, avec les angles huméraux un peu proéminents. Il est finement ponctué et les bords antérieurs sont garnis de cils courts et roux. L'écusson est très étendu, occupant avec la base presque toute la largeur du corselet, très court, triangulaire et rugueux par des granulations. Les élytres alongés sont garnis de tubercules aplatis, se terminant en pointe dirigée en arrière. Les tubercules latéraux sont plus élevés et plus pointus. Les pieds n'offrent aucune différence, exceptés les ongles, très faibles, à branches rapprochées.

De Turcménie. D. KARÉLINE.

**AKIS** *Otoës.*

Pl. II. f. 2.

*A. atra, opaca, capite latere valde dilatato s. alato, thorace concavo, medio punctis duobus impressis,*

Long. 8<sup>'''</sup>. Lat. 4 $\frac{1}{2}$ <sup>'''</sup>.

Cette espèce ressemble pour la forme à *Akis punctata* THUNB. (*reflexa* OLIV.) quoiqu'elle soit moins grande, mais elle en diffère par les élytres lisses et par les ailes latérales de la tête. La tête est allongée à ailes latérales très dilatées et longitudinalement évasées. Le corselet est concave au centre, avec deux impressions coniques. Les élytres sont lisses et ne font voir qu'à côté des bords quelques plis, ou élévations transverses courtes.

De Natolie. Dr. WIEDEMANN.

**ACISPA** *Wiedemanni.*

Pl. II. f. 4.

*A. nigra, glabra, nitida, capite thoraceque punctis binis impressis.*

Long. 4 $\frac{1}{2}$ <sup>'''</sup>. Lat. 2<sup>'''</sup>.

Cette espèce que M. le Dr. WIEDEMANN m'a envoyée de Natolie a une grande ressemblance avec celle que feu M. ESCHSCHOLTZ m'a communiquée sous le nom d'*Acapa tentyrioides* PARR. Elle en diffère par sa grandeur, par la surface unie et brillante et par les impressions de la tête et du corselet.

La tête est large à bord antérieur réfléchi, finement chagrinée, avec deux impressions très fortes des deux côtés du bord réfléchi. Le corselet en forme de clochette, enflé, rebordé de côté et en arrière, est très finement chagriné, avec deux impressions au milieu, sur la partie la plus élevée.

L'écusson très court et veu est totalement caché par le thorax.

Les élytres ovoïdes et lisses se terminent en pointe dirigée en bas.

Les pieds sont courts, comprimés, surtout les jambes de la dernière paire de pattes.

M. le Dr. WIEDEMANN, mon compatriote, naturaliste zélé et instruit, ayant à peine achevé son voyage en Orient, s'est déjà de nouveau embarqué pour se rendre en Amérique. Sa récolte dans la Natolie a été très riche; M. le Chevalier DE CHRISTOPHORI en a emporté la plus grande partie en Italie. De Natolie me sont encore parvenus quelques Mélasomes que je vais placer ici.

### **BRACHYSCCELIS** *muricatus*.

Pl. II. f. 5.

*B. niger, opacus, holosericeus; capite thoraceque granulatis, latere setosis; elytris punctis elevatis acutis muricatis, seriatim dispositis.*

Long. 9<sup>'''</sup>. Lat. 4 $\frac{1}{2}$ <sup>'''</sup>.

La tête proéminente est chagrinée. Les antennes sont courtes, à articles très gros et munis de soies fortes. Elles sont insérées près des mandibules sous



une lame très saillante et réfléchie. Le corselet, en forme de capuchon ou de clochette, est bombé, arrondi de côté et garni de soies courtes, et chagriné par des points élevés. Les élytres oblongs, arrondis de côté et à la pointe, sont munis de tubercules rudes et pointus. Les deux paires de pattes antérieures sont munies à la base d'appendices globuleux et forts. Les cuisses courtes et fortes sont chagrinées et munies de soies.

**PIMELIA** *interstincla*.

*P. ovata, nigra, thorace gibbo, lævi, punctis tribus impressis; elytris costatis, costis tribus elevatis versus apicem punctis continuatis, nitentibus, interstitiis opacis punctatis, punctis elevatis inæqualibus splendentibus.*

Long.  $8\frac{1}{2}'''$ . Lat.  $5\frac{1}{2}'''$ .

De la grandeur et de la forme du *Pimelia tuberculata* F. mais l'abdomen en est un peu plus allongé.

La tête est lisse et chagrinée par devant. Le corselet transverse, enflé, latéralement ponctué, est lisse au milieu avec une impression transversale, contenant trois points peu profondément imprimés.

Les élytres présentent trois côtes élevées qui sont composées en partie par des points allongés et brillants. Les interstices sont mats, garnis de quelques points élevés, inégaux et irrégulièrement placés. Ils sont brillants. Le corps en dessous est chagriné.

**PIMELIA** *coordinata*.

*P. ovato-globosa*, thorace glabro; elytris tuberculatis, tuberculis rotundis splendentibus, quibusdam seriatim coordinatis.

Long. 8<sup>'''</sup>. Lat. 5<sup>'''</sup>.

La tête est dilatée par devant et réfléchie en dessus des antennes, de sorte qu'il en résulte un pli transversal qui paraît comme une coupure. La tête et le corselet sont lisses et finement ponctués. Les élytres subovoïdes, rugueux par des tubercules ronds, déprimés et placés pèle mèle à l'exception de l'endroit où se trouvent ordinairement les trois côtés des élytres; là les tubercules se réunissent en séries un peu plus élevées et paraissent représenter les côtes. Les bords sont bicarinés, à carines serrées ou subdentées.

**PIMELIA** *plinthota*.

*P. capite prominulo inflexo; thorace abbreviato, transverso; elytris costatis, costis tribus imbricatis, interstitiis rugosis.*

Long. 6 $\frac{1}{2}$ <sup>'''</sup>. Lat. 4 $\frac{1}{2}$ <sup>'''</sup>.

La tête est saillante, dilatée et fortement dirigée en bas. Le corselet est transverse, mais très court, lisse en dessus et ponctué de côté. Les élytres presque orbiculaires ont trois côtes imbriquées dont les interstices sont rugueux. Les côtes en sont bicarinées à carines granulées.

**PIMELIA** *inæqualis*.

*P. corpore ovato; elytris tuberculatis, tuberculis inæqualibus depressis confluentibus.*

Long. 6<sup>'''</sup>. Lat. 4 $\frac{1}{2}$ <sup>'''</sup>.

La tête et le corselet sont lisses, finement ponctués. Les élytres sont rugueux, à tubercules inégaux, déprimés, en partie confluents. Les jambes des pattes intermédiaires du mâle sont comprimées et garnies des deux côtés de soies courtes, en forme de brosse.

---

# NOTIZ

ÜBER

DIE SAURE BESCHAFFENHEIT DES BLUTS,

VON

R. HERRMANN.

---

Es ist bekannt, dass ich bei Gelegenheit meiner Untersuchungen, über die Wirkungen der Cholera auf das Blut, die Entdeckung machte, dass das venöse Blut gesunder Menschen freie Kohlensäure und noch eine andere stärkere Säure enthalte, die im Stande ist, aus kohlen-saurem Baryte Kohlensäure auszutreiben. Auch fand ich, dass venöses Blut, mit blauer Lakmustinctur in verschlossenen Gefässen gemischt, dieselbe roth färbt, also deutlich saure Eigenschaften besitze.

Diesen Angaben hat man bisher allgemein widersprochen, namentlich haben ROSE, WITTSTOCK, DULR, LECANU, STROMEYER u. And. bei Prüfung meiner Versuche ganz entgegengesetzte Resultate erhalten. Die Meinung aller Chemiker vereinigte sich demnach

darin: dass das Blut eine alkalische Flüssigkeit sey, die weder freie Kohlensäure, noch eine andere freie Säure enthalte.

Endlich tritt ein Chemiker von Gewicht auf, der meine Beobachtungen bestätigt. In einem Berichte über die Sitzung der Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde vom 18. April d. J. finde ich folgende Anzeige:

«Herr Professor MAGNUS sprach über den Kohlensäure-Gehalt des Bluts, den er nach eigenen Untersuchungen *bestätigt*. Diese Gasart lässt sich von dem Blute durch andere Gasarten (Wasserstoff, Stickstoff, atmosphärische Luft) vermöge eines Absorptions-Austausches, aber auch durch die Luftpumpe trennen. Für die letztere Operation hat sich Herr MAGNUS eines eigenen sehr zweckmässigen Apparats bedient, um die Luftarten aus dem Blute bequem absondern und untersuchen zu können. Nach seinen Beobachtungen enthält das venöse Blut, ausser der Kohlensäure, noch Sauerstoff und Stickstoff, und zwar, im Vergleich zur atmosphärischen Luft, überwiegend mehr Sauerstoff. Das arterielle Blut enthält dieselben Gasarten, aber verhältnissmässig weniger Kohlensäure, dagegen mehr Sauerstoff.»

Also das Blut enthält *freie* Kohlensäure, denn sie kann ihm selbst durch indifferente Gasarten, Stickstoff, Wasserstoff u. s. w. durch Absorptions-Austausch entzogen werden. Da nun die Kohlensäure eine Säure ist, so ist das Blut schon wegen seines Gehalts an freier Kohlensäure eine *saure* Flüssigkeit, und muss



schon desshalb in verschlossenen Gefäßen auf Lakmustinctur *sauer* reagiren. Das Blut ist also keine alkalische Flüssigkeit, wie man bisher annahm. Die alkalische Reaction des Serums gegen Lakmuspapier widerspricht dieser Ansicht keinesweges, da sie in Folge der Verflüchtigung der Kohlensäure eintritt, und eine Wirkung des darin enthaltenen phosphorsauren Natrons ist.

Aber es bleibt noch übrig die Gegenwart jener andern stärkern Säure, die sich beim Gerinnen des venösen Bluts mit dem Blutkuchen niederschlägt, und die ich für Essigsäure halte, nachzuweisen. Ich habe daher Herrn Professor MAGNUS gebeten, mit Hülfe seines Apparats folgende Versuche auszuführen:

- 1) Man mische *venöses* Blut mit kohlensaurem Baryte und bestimme die Quantität der nach diesem Zusatze entwickelten Kohlensäure in Vergleich mit der, die ohne diesen Zusatz daraus erhalten wird.

Nach meinen Versuchen erhält man daraus mehr mit kohlensaurem Baryt, als ohne denselben.

- 2) Man stelle dieselben Versuche mit arteriellem Blute an.

Nach meiner Vermuthung wird man dabei aus arteriellem Blute bei beiden Versuchen, also mit und ohne kohlensauren Baryt, gleich viel Kohlensäure bekommen.

Fallen diese Versuche so aus, wie ich bei dem venösen Blute gewiss bin, bei dem arteriellen aber vermuthe, so ist die Gegenwart einer stärkern Säure als Kohlensäure in dem venösen Blute ebenfalls bestätigt, und die Abwesenheit derselben in dem arteriellen Blute, mithin der chemische Unterschied zwischen beiden Blutarten erwiesen.

---

UEBER  
**EINE NEUE SÄURE**  
IN DEM  
**HOLZESSIG,**  
VON  
KARL SCHLIPPE.

---

Im Holzeßsig wird die Essigsäure in ansehnlicher Menge von einer Säure begleitet, die sich weder durch Geruch noch andere physische Eigenschaften, bestimmt und scharf aber durch ihr chemisches Verhalten, von der Essigsäure unterscheidet.

Ihre Salze sind löslicher als die der Essigsäure, und finden sich daher in den Mutterlaugen der mit Holzeßsig bereiteten Verbindungen in grösserer Menge; so z. B. in denen des Blei's, Kupfers und Natrumsalzes. Am auffallendsten verschieden von den essigsäuren Salzen und ganz besonders interessant sind die Verbindungen dieser Schwestersäure des Essigs mit dem Bleioxyde; mit diesem bildet sie, ausser dem basischen, drei, durch Gestalt und Was-

sergehalt verschiedene Salze. Das eine krystallisirt aus den unter  $-40^{\circ}$  R. erkalteten Mutterlaugen des mit Holzessig bereiteten Bleizuckers in grossen farblosen Krystallen, deren Gestalt das Dodecaëder ist. Sie röthen das Lakmuspapier und verwittern in trockner kalter Luft leicht an ihrer Oberfläche, schmelzen aber bei einigen Graden Wärme schon in ihrem Krystallisationswasser, und trocknen bei  $+48-50^{\circ}$  R. zu einer dem Gummi ähnlichen trocknen Masse ein, indem sie 34,5 pCent an Gewicht verlieren.

Erhält man dies in seinem Krystallisationswasser geschmolzene Salz längere Zeit über bei einer Temperatur zwischen  $20-40^{\circ}$  R. in einem offenen Gefässe, so scheidet sich, wenn die Flüssigkeit Syrupconsistenz erreicht hat, das zweite Salz in kleinen Krystallen aus, deren Grundgestalt das Rhombcëder zu seyn scheint. Diese verlieren, auch durch längeres Liegen in warmer trockner Luft, weder Glanz noch Gestalt, schmelzen aber, mehr erwärmt, zur durchsichtigen, hornähnlichen Masse, und verlieren dann 2,45 pCent am Gewicht. Derselbe Gewichtsverlust zeigt sich, wenn das Salz, mit Bleioxyd vermischt, der Wärme des kochenden Wassers ausgesetzt wird, ein Beweis, dass das Entweichende nur Wasser ist.

2,396 Grm. dieses Salzes wurden im Platintiegel mit einer zur vollständigen Zersetzung hinlänglichen Menge verdünnter Schwefelsäure übergossen, an einer warmen Stelle eingetrocknet, und dann, zur

Entfernung der im Ueberschuss vorhandenen Schwefelsäure, gelinde geglüht. Es hatten sich so 2,09 Grm. schwefelsaures Bleioxyd gebildet, und diese Menge zeigt 65,9 pCt. Bleioxyd im obigen Salze an. Die Sättigungs-Capacität dieser Säure ist demnach etwas geringer, als die der Essigsäure, und das Gewicht eines Atoms derselben würde, hieraus berechnet, = 734 seyn, wenn das der Essigsäure = 638,63 ist. Doch behalte ich mir eine genauere Bestimmung der atomistischen Verhältnisse noch vor.

Das dritte Salz, welches diese neue Säure mit dem Bleioxyd darstellt, erhält man durch Abkühlung der zu einer gewissen Concentration gebrachten Lösung der vorhergehenden Salze, oder durch freies Verdunsten derselben bei mittlerer Temperatur. Es scheidet sich in warzenähnlichen Gruppen aus, und ist offenbar dieselbe Verbindung, welche sich aus den Lösungen des Bleioxyds in Holzessig mit dem essigsauren Salze zugleich ausscheidet, und die Hauptursache der hier so eigenthümlichen Krystallisation des letztern. Es zeigt keine Neigung an der Luft zu verwittern, und getrocknet immer eine glänzende, gummiähnliche Oberfläche. Sein Wassergehalt ist grösser als der des vorhergehenden Salzes.

Die Verbindung mit dem Kupferoxyde sieht man bei der Fabrikation des Grünspans häufig mit den beiden Hydraten des essigsauren Kupfers zugleich anschliessen, und zwar in haarförmigen Büscheln, ganz so wie der Gyps aus seinen Auflösungen zu krystallisiren pflegt. Es ist löslicher als das ihm ent-



sprechende essigsäure Salz. Eine dem blauen essigsauren Salze entsprechende Verbindung darzustellen, ist mir nicht gelungen; aber eine basische blaue Verbindung besteht und bildet sich unter denselben Umständen, und ist ähnlich dem blauen sogenannten Marseiller Grünspan.

Mit Natrum stellt diese Säure ein schönes Salz dar, dessen Form wenig, aber bestimmt, vom essigsauren abweichend ist.

Die Salze, welche sie mit Kali, Kalk, Baryt bildet, sind nicht auffallend verschieden von den essigsauren Verbindungen, und von mir keiner weiteren Untersuchung unterworfen worden, so wie überhaupt so vieles noch zu thun übrig bleibt über diese interessante Säure, deren Existenz darzuthun ich mir heute nur zur Aufgabe gemacht hatte.

Plesenskoe,  
den 10. April 1837.

---

# ОТВѢТЫ

ПР. ПЕРЕВОЩИКОВА

## НА ВОПРОСЫ

Г. Гумбольдта

20 ЯНВАРЯ 1837 ГОДА.

---

Вопросы *Г. Гумбольдта*, полученные мною чрезъ Вице-Президента Общества, суть слѣдующіе:

1. Сообщить метеорологическія суточные наблюденія отъ 10 Мая до 4 Ноября (ст. шпиль) 1829 года.

2. Определить высоту Московскаго Университета надъ уровнемъ океана. «

3. Определить высоту Новой горы, принадлежащей къ горамъ Валдайскимъ.

На сіи вопросы я могу отвѣчать:

I. Въ 1829 году я жилъ въ Университетѣ, и начиная съ Іюня мѣсяца, метеорологическія наблюденія производились подѣ моимъ смотрѣніемъ посред-

ствомъ барометра работы *Нейгебауера*, при которомъ находишься термометръ столбчатый; температура воздуха наблюдалась по термометру Реомюра; гигрометръ *Соссюровъ*; дни начинаются по спарому шпилю; часы наблюдений были въ 6 ч. и 9 ч. утра, въ 2 и въ 9 часовъ вечера. Упомянутый барометръ былъ сравненъ съ Форшеневымъ барометромъ *Г. Гумбольдта*, во время его путешествія чрезъ Москву въ Сибирь: разность оказалась только въ 0,2 линей Французскаго фуза. И такъ прилагаемая при семъ полная оригинальная таблицы наблюдений ( \*) должны совершенно удовлетворить желанію *Г. Гумбольдта*.

II. Число всѣхъ выше-упомянутыхъ наблюдений надъ барометромъ и термометромъ=732; изъ нихъ среднія барометра  $27''\ 40'''{,}354 = 754{,}25$  миллиметра, столбчатскаго термометра при барометрѣ  $+ 20^{\circ}{,}09$ ; Реомюрова термометра на воздухѣ  $+ 42^{\circ}{,}45\text{ Р.} = 45^{\circ}{,}56\text{ сш.}$  Теперь, принявъ, согласно съ наблюденіями *Г. Гумбольдта*, что средняя высота барометра при океанѣ=763,45 милл. При показаніяхъ обоихъ термометровъ  $= + 25^{\circ}{,}3$ , посредствомъ гипсометрическихъ таблицъ *Ольманса*, вычисляемъ :

---

(\*) Таблицы сіи были отправлены къ *Г. Гумбольдту*, который уведомилъ уже общество о полученіи ихъ съ благодарностью.

|                            |            |             |                              |
|----------------------------|------------|-------------|------------------------------|
| для 763,15.....            | 6183,56    | мешр. = a   | $T = +25^{\circ},3$          |
| 754,25.....                | 6090,12    | ---- = b    | $T' = +20,09$                |
|                            | 93,44      | = a - b     | $T - T' = +5^{\circ},21$     |
| Поправ. для $T - T'$ ..... | 7,60       | = c         | $t = +25,3$                  |
|                            | 85,84      | = a - b - c | $t' = +15,56$                |
| Испр. для 2 (t+t').....    | 7,01       |             | $t + t' = +40,86$            |
|                            | 92,85      | меш.        | $2(t + t') = +81^{\circ},72$ |
|                            | или 47,639 | шозовъ.     |                              |

Такова есть высота Университета надъ океаномъ; слѣд. почти одинакова съ принимаемою *Галстеемъ* (48 п.). По какъ можно полагать безъ чувствительной погрѣшности, что Университетъ находится на самомъ берегу Москвы-рѣки; но ея высоту должно принять за высоту уровня Москвы-рѣки при *Каменномъ мостѣ*.

III. Въ Іюль мѣсяцъ 1830 г. метеорологическія наблюденія были перенесены на Астрономическую Обсерваторію, находящуюся на возвышеніи, извѣстномъ подъ именемъ *трехъ горъ*. Сѣверная широта сего мѣсяца =  $55^{\circ}45' 20''$ , Восточная долгота отъ Парижа 2 ч.  $21' 42''$ . Здѣсь производятся сіи наблюденія непрерывно посредствомъ сифоннаго барометра съ метрическимъ дѣленіемъ и съ термометромъ столбическимъ; температура же воздуха замѣчается по термометру Реомюрову. Дни считаются по старому штилю; часы наблюденій суть 8 ч. утра, 2 по полудни и 40 ч. вечера. Но въ зиму 1830 — 1831 годовъ, когда были закрыты Университетскія лекціи, наблюденія производились

8 разъ въ день, также между 8 ч. утра и 10 ч. вечера; число сихъ наблюдений есть 2920; изъ нихъ средня: барометра (при  $0^{\circ}$ ) 745,23 миллиметра, Реомюрова терм.  $+3^{\circ},9$ . Изъ всѣхъ шести лѣтъ 1831 г. былъ наилучшій; худшій же 1835; въ этомъ году средняя сущь: барометра (при  $0^{\circ}$ ) 743,92, Реомюрова терм.  $+2^{\circ},65$ . И такъ, для опредѣленія высоты Обсерваторіи надъ уровнемъ океана, можно положить, что сред. высота барометра (при  $0^{\circ}$ ) есть 744,57 милл., термом.  $+3^{\circ},27$  Р.  $= +4^{\circ},09$  ш. Если сіи данныя сравнимъ съ принятыми Г. Гумбольдтомъ для поверхности Океана; то получимъ для искомой высоты 168,45 метр.  $= 86,427$  шаговъ; слѣд. Обсерваторія выше Университета 38,788 шагами.

Но чтобы Г. Гумбольдтъ имѣлъ возможность повѣрить сіи вычисленія, прилагаю таблицу среднихъ результатовъ каждого мѣсяца 1831 и 1835 годовъ.



| МѢСЯЦЫ.  | 1831 года.      |            | 1835 года.      |            |
|----------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|          | БАР.<br>при 0°. | ТЕР.<br>Р. | БАР.<br>при 0°. | ТЕР.<br>Р. |
| Январь   | 744,25          | —8°,2      | 741,50          | —5°,45     |
| Февраль  | 743,44          | —5,5       | 744,88          | —3,26      |
| Мартъ    | 750,45          | —0,7       | 744,85          | —4,24      |
| Апрѣль.  | 744,10          | + 8,2      | 746,89          | + 6,89     |
| Май      | 745,16          | +12,6      | 742,21          | + 9,57     |
| Іюнь     | 742,42          | +16,4      | 745,33          | +15,53     |
| Іюль     | 743,90          | +16,2      | 743,23          | +13,58     |
| Августъ  | 740,21          | +12,6      | 743,65          | + 9,19     |
| Сентябрь | 747,10          | + 7,3      | 743,65          | + 8,02     |
| Октябрь  | 751,30          | + 0,2      | 749,74          | —2,37      |
| Нобрь    | 738,97          | —3,9       | 740,42          | —4,82      |
| Декабрь  | 751,83          | —7,8       | 740,70          | —13,60     |

IV. Чтожъ касается до измѣреній на Валдайскихъ горахъ, то онѣ совершенно мѣ неизвѣстны, а поному я не могу рѣшить сомнѣній Г. Гумбольдта, который при семъ случаѣ справедливо замѣчаетъ, что для полученія точныхъ заключеній по сему предмету, необходимо знать относительныя высоты Москвы, Твери, Торжка, Вышняго Волочка и Валдая. Но можно ли удовлетворишь сему вопросу, весьма любопытному въ отношеніи къ Физической Географіи, поному что упомянутыя мѣста принадлежатъ къ той плоской возвышенности, изъ которой выпекаютъ главныя рѣки Евро-

пейской Россіи?—Я думаю, что Московскій Уни-  
верситетъ имѣетъ всѣ средства для достиженія  
сей цѣли, и если будетъ угодно Обществу, то я  
въ слѣдующее его засѣданіе представлю подробное  
начертаніе всѣхъ необходимыхъ Геометрическихъ  
работъ, которыхъ исполненіе почту за честь при-  
нять на себя.

---

# RÉFLEXIONS

SUR

L'ALIMENTATION DES SOURCES,

PAR

PAUL EINBRODT.

---

Le principe d'association pour des travaux en commun, qui dans les entreprises industrielles a fait sentir son immense influence, en changeant les rapports des différens pays et en traçant de nouvelles routes au commerce, commence à être introduit dans les recherches scientifiques. Pour les branches nouvellement créées de la Physique de la terre, où les observations d'un seul individu, quelque grand que soit le zèle dont il est inspiré, ne sauraient mener à des résultats généraux, l'adoption de ce principe est la seule voie à suivre, et l'on sait à combien de résultats ont déjà donné lieu les recherches faites aux observatoires magnétiques, qui ont été établis sur la proposition de M. DE HUMBOLDT, et forment maintenant un réseau sur presque toute la terre. Mais les doctrines nouvelles ne sont pas

les seules qui devraient être étudiées par un grand nombre d'observateurs, partant d'un même principe et dirigeant leurs recherches dans le même sens. Il y a dans la Physique de la terre tels chapitres, où les développemens de la théorie ne sauraient supporter un examen critique, et où le nombre et la valeur des données positives ne suffisent pas à l'établissement solide d'une théorie plus juste. Je me propose de prouver dans ce mémoire la justesse de cette remarque par rapport au chapitre qui traite de l'alimentation des sources d'eau. Je me flatte de faire voir, que la Russie est peut-être le pays le plus propre à jeter quelque lumière sur cette question plus obscure qu'elle ne paraît ordinairement. Je suis sûr que la Société Impériale des Naturalistes de Moscou ne me refusera pas sa coopération pour l'entreprise des travaux et démarches qu'elle jugerait nécessaires dans l'intérêt de la science.

Il serait fastidieux d'énumérer toutes les explications qu'on a voulu donner relativement à l'alimentation des sources. Cette fonction vitale de notre terre se passe presque sous nos yeux, la nature semble y employer des moyens si simples, qu'il n'est pas surprenant que l'opinion des Physiciens de nos jours ne diffère presque en rien de celle des anciens Philosophes. A voir combien peu les MARIOTTE, les DE LUC et DESCARTES lui-même ont ajouté à ce que VITRUVÉ, ARISTOTE et LUCRETIUS CARUS avaient enseigné, ne dirait-on pas qu'il a paru aux physiciens modernes au dessous de leur dignité de s'occuper

d'une question aussi simple. Il n'y a que M. KEFERSTEIN de l'école allemande des *Naturphilosophen*, qui ait annoncé une théorie toute neuve, il est vrai, mais aussi peu soutenable que tout autre rêve d'une imagination fougueuse. Malheureusement sa théorie s'appuie sur l'autorité du grand KEPLER, qui compara poétiquement la terre à un gros animal qui buvait, avait sa respiration etc.

Tout le monde est d'accord sur l'origine des sources. Elles ne sont que l'une de ces formes toujours renaissantes sous lesquelles l'eau de la terre apparaît dans son éternel mouvement d'aller et de venir, dans cette circulation entre le sol et l'atmosphère, sans laquelle le règne organique serait arrêté à son premier développement. On ne diffère d'opinion, que lorsqu'on veut préciser la manière dont agit le sol pour rassembler des filets d'eau, et en général lorsqu'on veut suivre dans ses détails la marche de la nature. — Selon VITRUBE ce sont les eaux pluviales, qui filtrent à travers le sol jusqu'à ce qu'elles rencontrent des couches d'argile ou de toute autre substance imperméable; c'est alors que les eaux cherchent un lieu d'écoulement. C'est le fond de la théorie de MARIOTTE, qui est maintenant regardée, conjointement avec celle de HALLEY, comme la véritable. ARISTOTE donne, entre toutes les opinions, la préférence à celle-ci: l'humidité de l'atmosphère est attirée par les montagnes, se condense sur elles et découle dans des cavernes servant de réservoirs. Ce qu'il y ajoute est du non-sens à la mode de son



tems. Le célèbre HALLEY étant à Ste. Hélène, a vu la rosée former des gouttes sur son télescope, et mouiller son papier; entraîné par cette observation, il rétablit la théorie d'ARISTOTE. Pour quiconque a été à même de reconnaître le moyen dont la nature s'est servie dans un cas spécial pour produire un phénomène, il est naturel de s'éprendre pour sa découverte, et de ne plus vouloir admettre d'autre explication dans la théorie générale. Aussi voyons-nous l'opinion de HALLEY tellement en faveur auprès des savans qui habitent les pays montagneux, qu'ils n'ont pas même essayé de la fortifier par des travaux qui pussent servir de base au calcul.

Nous avons dit que ces deux théories, prises conjointement, constituaient de nos jours la doctrine des Météorologistes sur l'alimentation des sources. Examinons, ce qu'il y a d'indubitable dans cette doctrine, et sur quels points elle a paru vicieuse et a pu donner lieu à d'autres hypothèses, que nous rapporterons plus tard.

Les eaux qui tombent sur le sol sous la forme de pluie, de neige, de rosée etc., se divisent en trois parties :

Une première coule sur la superficie du sol; elle alimente les ruisseaux et les torrents;

La seconde est celle qui s'enfonce plus bas dans la terre et forme des amas, d'où provient peut-être la majeure partie de l'eau qui sert à alimenter les sources permanentes.

Enfin la troisième est celle qui de la surface de la terre s'en retourne directement à l'atmosphère par l'évaporation tantôt immédiate, tantôt retardée par un séjour dans les végétaux. Pour complaire à l'école de Philosophie naturelle, on dirait que l'eau, qui par sa circulation sert de principe vital au macrocosme de la terre, introduit en même tems la vie dans le microcosme organique, et présente, à l'instar du sang, une circulation intérieure enclavée dans la circulation extérieure générale.

Ceux des Météorologistes modernes, qui ont remis en vigueur la théorie de VITRUVÉ, ont eu le mérite d'avoir reconnu le besoin de la confirmer par des mesures. Ils entreprirent dans ce dessein de constater les rapports suivant lesquels se faisait la tripartition sus-indiquée de l'eau. Certainement ils auraient fait disparaître le prétexte même d'un doute, s'ils avaient réussi à démontrer que la somme de ces trois parties égale la quotité des précipités atmosphériques. — Comme il serait impossible de faire de pareils calculs pour toute la terre, on a cru que des îles pouvaient seules servir de terrain pour ces recherches. Remarquons que cette opinion a été conçue à la légère; elle se fondait sur la difficulté de tracer exactement les limites des versans des fleuves. Pour remédier à cet inconvénient, au lieu de diviser un plus grand terrain sur le continent par versans de fleuves, on n'aurait qu'à le partager en carrés de dimensions égales, après quoi on ap-

précierait le surplus des eaux qui sortent de chaque carré par les rivières sur celles qui y sont introduites par la même voie. Ce travail exécuté d'une manière assez scrupuleuse, dans un pays comme l'Allemagne ou la France, offrirait même, contre l'opinion générale, des résultats bien plus proches de la vérité que le travail auquel M. DALTON s'est livré pour l'Angleterre; et cela par la raison qu'une source d'erreur y serait éliminée en partie. Elle consiste en ce que l'on n'a pas tenu compte des nappes d'eau souterraines, qui du littoral peuvent se plonger dans la mer au dessous de son niveau. La Géologie ne présente aucune objection à la possibilité d'une pareille décharge d'eau, qui à la vérité peut-être fort considérable. Je n'ai pas besoin de citer comme preuves les sources qui font voir, par une hausse et une baisse de leur niveau isochrones avec la marée, qu'elles communiquent avec la mer, ni les exemples assez fréquents de sources d'eau douce dans la mer près des côtes.

Toutefois, comme on croyait les îles le plus favorables au contrôle de la balance de recette et de dépense d'eau, les Physiciens anglais se sont chargés de ce travail, et nous n'avons pas de données meilleures que les chiffres obtenus par M. JOHN DALTON. Mais à l'examen des bases de son calcul, même en négligeant la source d'erreur déjà indiquée, je ne balance pas à déclarer, que la conséquence qu'on en a tirée, savoir, que la filtration fournissait seule les eaux de sources, ne mérite aucune confiance.

Certes ce n'est pas en faire un tort à l'ingénieux savant de Manchester; ce n'est que reconnaître l'extension des difficultés de son travail, qui en vérité sont insurmontables.

La partie du travail la plus facile, c'est la tâche d'évaluer la quantité d'eau qui tombe de l'atmosphère; on peut le faire assez exactement, à la portion d'eau près qui se condense sur les montagnes. La moyenne que M. DALTON a tiré des épreuves faites à l'udomètre, lui donne pour hauteur annuelle des eaux de pluie en Angleterre 31",3. Les expériences avaient été instituées tant dans l'intérieur du pays, que sur la côte; c'est dans les provinces maritimes de l'Ouest que tombe la plus grande quantité de pluie, et l'on trouve comme extrêmes 50" à Kendal en Westmoreland, et 47" à Lyndon en Rutlandshire. GILBERT remarque très judicieusement, qu'avant de chercher la moyenne, M. DALTON aurait dû évaluer approximativement l'aréal des comtés maritimes et celui des comtés de l'intérieur; à l'inspection de la carte d'Angleterre et des tableaux d'observations à l'udomètre, il me paraît plus que probable, que son calcul, après cette correction, lui aurait donné un chiffre plus petit. La rosée n'y a pas été comprise par une excellente raison; elle n'a pas été portée non plus dans le nombre qui représente la quantité d'évaporation. Mais les eaux condensées par les montagnes y ont été négligées à tort.

Pour la contre-épreuve on évalue la première et

la seconde partie des eaux ensemble, puisqu'en se réunissant, elles s'écoulent toutes les deux par les grands fleuves. Le résultat auquel M. DALTON est arrivé, était qu'il s'écoulait par tous les fleuves de l'Angleterre une quantité d'eau qui couvrirait ce pays à 13" de hauteur. En considérant tous les élémens qui doivent entrer dans un pareil calcul pour chaque fleuve, son profil étant connu; les variations journalières de la hauteur de son niveau, la vitesse différente des couches de cette veine fluide et l'influence, sur cette vitesse, des vents et de la marée qui peuvent la faire varier si fortement; en considérant, qu'après avoir calculé la masse d'eau s'écoulant par tous les grands fleuves sous l'influence de toutes ces circonstances modifiantes, il faudrait y ajouter celle qui, sans avoir été versée au préalable dans les grands fleuves, est envoyée directement du littoral dans la mer par les ruisseaux, masse d'eau qui peut devenir très considérable après des averses et des pluies continues;..... au lieu de quoi M. DALTON s'est contenté d'évaluer les eaux de la seule Tamise sur d'anciennes mesures, corrigées un peu arbitrairement, et porta sur son tableau la quantité d'eau versée par tous les autres fleuves comme 9 fois aussi grande, se guidant pour cela par des comparaisons vagues de l'étendue des versans; on est bien autorisé, il me semble, à ne voir, dans le résultat de ses calculs, qu'un chiffre assez arbitraire.

Il nous reste maintenant à voir, de quelle ma-



nière on a procédé, pour déterminer la quantité d'eau qui ne pénètre pas dans le sol, mais qui sous forme de vapeurs en remonte directement dans l'atmosphère. Les atmomètres dont on s'était servi à ce propos jusqu'à DALTON, parlaient un langage entièrement faux. C'étaient des vases remplis d'eau jusqu'au bord; on mesurait ou bien l'on pesait l'eau, qu'il fallait y ajouter de tems à autre, pour rétablir le niveau qui s'abaissait constamment par l'évaporation. Les résultats obtenus avec ces instrumens pourraient servir de base au calcul, s'il s'agissait de déterminer l'évaporation des nappes d'eau, de la mer par exemple; encore faudrait-il alors enfoncer les atmomètres dans un milieu ayant exactement la température de la mer et recouvert d'air absolument au même état hygrométrique, comme aussi le remplir d'eau marine et calculer les fautes de comparaison, pouvant provenir de ce que les ondes rendent la superficie des mers plus grande que leur aréal. Mais puisque dans le cas qui nous occupe, les atmomètres doivent indiquer non la quantité d'eau qui peut s'évaporer en tems donné, mais celle qui se vaporise réellement; et comme dans le courant d'une année le sol n'est jamais constamment humecté, qu'il se trouve au contraire pour un tems assez long fortement desséché, — il s'ensuit que dans l'application des données de ces instrumens à l'évaluation des eaux qui s'évaporent sur la terre, l'erreur des chiffres doit constamment porter à un immense excès. Aussi voyons-nous que les différens

atmomètres employés indiquent la quantité d'eau vaporisée plus grande que celle des eaux pluviales d' $\frac{1}{10}$  en Angleterre, de  $\frac{3}{10}$  en Hollande et dans la France septentrionale; plus on avance vers la Méditerranée, fait remarquer M. KAMTZ, plus cette différence devient considérable: à Bordeaux l'atmomètre marqua 59" d'eau, l'udomètre 24", à Mannheim la différence dans le même sens était encore plus grande dans la proportion de 73" à 21", enfin à Marseille elle devint énorme, étant de 85" 7" à 21" 40", de manière que les vapeurs supposées se former sur le sol de Marseille font presque 4 fois autant que les eaux de pluie qui y tombent.

Les atmomètres construits d'après BELLANI, LESLIE et ANDERSON valent encore moins. Ils font voir combien des vases poreux ou des tissus, imbus d'eau, en laissent évaporer en un tems donné. Leurs résultats sont faux par la même raison, savoir que la terre n'est jamais constamment humectée; tout au plus s'ils pourraient servir, d'après la remarque de M. MUNCKE, d'hygromètres plus ou moins justes.

Enfin M. DALTON a senti que, pour faire des expériences rationnelles, il fallait opérer sur des masses terreuses, placées aussi exactement que possible dans les mêmes circonstances que le reste du sol et mesurer l'eau qui s'en évapore, en soustrayant la quantité des eaux filtrées de la somme des eaux de pluie. Il enfoua dans la terre un vase cylindrique de 3' de profondeur, ayant d'un côté deux tuyaux avec des flacons attachés. Le premier tuyau était placé

à 4" au dessous de la surface, l'autre au fond du vase. Il mit d'abord dans ce vase une couche de cailloux et de sable grossier, et le couvrit ensuite de terreau. Il y versa assez d'eau, pour qu'elle commençât à filtrer dans le flacon inférieur. C'était en automne que se firent ces préparatifs; le 4 Janvier de l'année suivante, où commença l'expérience, il vida les flacons et les attacha de nouveau. Après quoi il laissa agir sur l'appareil la pluie et l'air pendant 3 ans, et il trouva pour la moyenne annuelle de l'évaporation une colonne de 25" de hauteur. En additionnant ces 25" aux 43" dépensés par les rivières, on trouve un déficit de 7" pour la recette des eaux de pluie. M. DALTON essaya d'expliquer ce déficit, mais ses raisons sont faibles et peuvent être contrebalancées par d'autres. Il se peut pourtant que le déficit réel soit moindre. A mon avis, l'expérience peut être considérée comme vicieuse dans quelques détails; d'abord en ce que pendant les 6 premiers mois, lorsque la terre ne s'était pas encore affaissée au dessous du tuyau supérieur, l'appareil montrait la quantité d'évaporation trop petite, puis en ce que l'eau trouvait en général, contre l'opinion de M. DALTON, plus de facilité à s'écouler dans les flacons, qu'elle n'en trouve à traverser des couches terreuses plus épaisses, et particulièrement en ce que au commencement de l'expérience la terre de l'atmomètre, haute de 3', se trouvait peut-être à un tout autre état d'humidité que le sol ambiant, tandis que nous savons par d'autres

expériences du même savant qu'un seul pied cube de terreau calciné ne demande pas moins d'une colonne de 7" pour être saturé d'humidité. M. DALTON croit que les données de son instrument sont assez justes pour l'espace d'une année, mais qu'on doit s'y fier moins pour des tems plus limités. Cette confiance est ébranlée quand on compare les moyennes des eaux de filtration de la 1<sup>ère</sup> et de la 2<sup>de</sup> année. Pour la 1<sup>ère</sup> année qui était plus sèche elle faisait 6",877; pour la 2<sup>de</sup> qui était pluvieuse ce nombre était de 40",934, c'est-à-dire plus grand que le premier de la moitié. Il me semble que le niveau des grands fleuves eût été altéré d'une manière effrayante, si les quantités d'eau qui se rassemblaient dans les flacons représentaient exactement la quantité des eaux de filtration. La différence n'a plus été aussi grande entre la seconde et la troisième année. M. DALTON observa que la terre de son atmomètre se couvrit de végétaux ces deux années, mais que le changement dans l'état de superficie n'influa pas visiblement sur la quantité d'évaporation. Peut-être eut-il mieux valu rejeter entièrement les résultats de la première année d'observation.

En résumé, en ne suivant que la théorie de MARIOTTE, on pourrait avancer que l'appareil de M. DALTON peut donner des mesures assez exactes pour le lieu où l'expérience est instituée. Mais, quelque grand que soit le nombre de ces lieux et la différence de leur exposition, dès que l'on veut tirer des résultats généraux pour tout un pays des données



des atmomètres, on s'expose aux plus grandes erreurs, étant réduit à des taxations arbitraires par rapport à deux grandes influences, la répartition du vent et celle de l'ombre. Qui ne connoît le pouvoir dessicatif du vent, et qui se chargerait de le contrôler? Il est inutile que j'en dise davantage. Quant à l'influence de l'exposition au soleil ou à l'ombre, elle a été peu examinée. Du moins je ne connais que les expériences que M. DE HUMBOLDT a faites à ce sujet à Cumana; il trouva qu'un vase exposé au soleil perdait dans la durée d'un jour  $8^{\text{mm}}_{,8}$  d'eau et à l'ombre  $3^{\text{mm}}_{,4}$  seulement. Maintenant je demanderai encore, qui se croira en état d'évaluer, pour tout un pays, le rapport de la portion de terrain qui, dans le courant d'une année, a été exposée au soleil, à cette autre qui s'était trouvée à l'ombre des nuages, des montagnes, des forêts, des maisons?

Je crois avoir prouvé, que les mesures fautes de pouvoir être rendues assez exactes, ne sauraient décider la question de savoir: si la nature n'emploie pas quelque mode d'alimentation des sources outre ceux qui ont été indiqués par VITRUE et par ARISTOTE. Quittons ces calculs si difficiles et essayons si, en suivant la voie des inductions, nous ne pourrions nous rapprocher du but.

Conformément à la théorie de MARIOTTE il ne peut plus y avoir de sources à des hauteurs, où la température moyenne du sol en été ne monte pas au-dessus de zéro.

Aussi prétend-on que c'est le cas dans les régions



polaires de l'hémisphère boréal. Mais outre que l'on a fait si rarement des descentes dans ces régions, que cette assertion serait toujours un peu hasardée, même dans ce peu de faits on a observé des exceptions à une règle aussi faiblement établie. Le Capitaine JAMES trouva une source très abondante, si je ne me trompe par la hauteur de 80° de latitude boréale. Le Capitaine SCORESBY fils dans son voyage au Groenland trouve au N. du Cap Stewart lat. 70° 40' une rivière assez considérable pour une telle contrée, et difficile à passer à gué. M. MÜNCKE remarque que selon la théorie de MARIOTTE, dont il est partisan, les pays couverts de rochers ont la meilleure conformation pour amasser des rivières, tandis que les plaines recouvertes de sable et de terre végétale ne les doivent produire que difficilement. SCORESBY, au contraire, a trouvé dans cette côte qu'il a si bien explorée, qu'elle n'offre même pas de ruisseaux dans sa plus grande extension, où elle est formée d'un banc de rochers nuds et escarpés, et couverts de neige et de glaciers, dont quelques uns descendent jusque dans la mer; mais que partout où il y avait de petits terrassements, reparaissaient les sources et les ruisseaux.

La théorie de MARIOTTE avait un antagoniste dans WOODWARD; il voulait la réfuter par un argument fort ingénieux. Il prétendit que puisque la température des Alpes, qui fournissent les sources du Rhin et du Rhône, est pendant l'hiver au dessous de zéro, ces sources dans ce tems devraient tarir. L'argument

eût été inattaquable et la remarque parfaitement juste, si WOODWARD l'avait appliquée à une autre contrée que la Suisse. DE LUC n'a pas eu de peine à lui trouver une réponse; il lui fit observer que les sources des fleuves de la Suisse n'étaient jamais aussi abondantes que par les grandes chaleurs d'été, et devenaient bien plus pauvres en hiver. Honneur pourtant à WOODWARD; il a entamé une discussion, qui doit être pour nous du plus grand intérêt. En Suisse ce sont les glaciers qui en fondant fournissent la majeure partie des eaux des sources; là un peu de neige des montagnes peut fondre encore en hiver, les pluies y tombent en toute saison. Mais en d'autres pays plus vastes, en Pologne, dans notre patrie, en Sibérie, la neige pendant 4 à 5 mois ne peut certainement fournir une goutte d'eau au sol gelé, et pourtant c'est là que des fleuves, plus grands que ceux du reste de l'Europe ne cessent de charrier sous la glace d'immenses quantités d'eau. Qu'eût trouvé DE LUC à dire en faveur de la théorie de MARIOTTE, si WOODWARD avait fixé pour elle la Russie comme lieu d'essai? Ce n'est pas sans hésitation que je me suis décidé à soulever la question; je craignais de me tromper, je cherchais de tous côtés des renseignemens, si par hasard la glace ne s'affaissait pas sur l'eau dans les rivières et ne lui barrait pas le cours, s'il n'arrivait pas de trouver un espace vide entre la couche solide et la couche fluide des fleuves, si les sources cessaient de couler? Sur toutes ces questions la réponse était négative, jusqu'ou

portaient les observations. Partout où l'on avait pratiqué des ouvertures dans la glace des rivières, l'eau se montrait immédiatement au-dessous et paraissait se mouvoir d'un cours aussi rapide qu'en été, les petits ruisseaux n'avaient point tari, au contraire ils avaient fréquemment soulevé la croute de glace qui les couvre ; des sources assez fortes pour être observées ne coulaient pas moins abondamment. Telle est la source du village des Grands-Mitistchi, qui fournit d'eau la ville de Moscou ; M. le Général DE JÆNISCH qui avait été chargé de la construction de notre bel aqueduc, n'a pas remarqué la plus légère différence de volume dans cette source aux deux saisons opposées. Enfin il n'y a pas de puits en Russie, qui ne donne aussi bien de l'eau en hiver qu'en été ; et les propriétaires des moulins et de toutes les fabriques où le mouvement des machines est produit par une chute d'eau, les font travailler de préférence en hiver, étant sûrs alors d'un courant d'eau également nourri et d'un niveau constant.

Comment procède la nature pour fournir cette eau et pour rendre habitable plus d'un huitième de la terre ? Gardons nous de tomber dans les subterfuges de théoristes embarrassés, en recherchant l'explication de ce fait bienfaisant. La nature emploie partout les mêmes moyens ; les anomalies apparentes d'une activité terrestre, examinées de plus près, doivent se montrer comme des conséquences nécessaires de la loi générale.

Il n'y a pas à balancer ; le résultat de M. DALTON,

le fait des rivières coulant en hiver dans des pays glacés, le manque absolu de montagnes dans ces mêmes pays et d'autres argumens que je citerai plus bas nous forcent d'en venir à cette conclusion, *que toute l'eau qui alimente les sources ne saurait être fournie par la seule filtration de la pluie, ni par la condensation des vapeurs sur les montagnes.* Ne rejetons pas les théories de VITRUVÉ et d'ARISTOTE, mais ajoutons-y une autre théorie, non moins vénérable par son antiquité, celle de LUCRETIVS CARUS. Comme les deux autres elle a été remise au jour dans nos tems modernes et cela par DESCARTES. Suivant le philosophe épicurien l'eau des mers filtre à travers les interstices de la terre, s'y purifie et se rassemble de nouveau dans les sources. Cette idée a été développée de deux manières, dont l'une est évidemment fausse et que je ne cite que pour ne plus y revenir. WARENIUS, DERHAM et KIRCHER supposent que l'eau marine est soulevée par des vaisseaux capillaires jusqu'à une hauteur, d'où elle retombe pour former des nappes d'eau qui alimentent les sources. De nos jours les lois de la capillarité sont trop bien connues pour qu'une pareille idée mérite une réfutation sérieuse, d'autant moins qu'en l'admettant possible, il n'y aurait pas de motif pour que l'eau marine pendant son trajet se dépouillât du sel qu'elle contient.

Un meilleur développement de l'idée de LUCRÈCE date de DESCARTES. Selon ce philosophe des canaux souterrains conduisent les eaux marines dans des cavités, où elles sont converties en vapeurs, qui se



condensent de nouveau aux parois supérieures de ces cavités et forment les sources. Nous reviendrons sur les modifications de cette théorie, nécessitées par l'état actuel de la science; ici il suffira de remarquer qu'il y a bien plus de preuves directes parlant en sa faveur, que pour celles de MARIOTTE et de HALLEY. En effet, on a vu que des couches de pierre ayant été enlevées à une profondeur de 40' dans une carrière sur la montagne Odmiloost en Slavonie, il s'en suivit une éruption de vapeurs denses, qui dura treize jours; trois semaines après l'éruption toutes les sources des environs avaient tari. Le même phénomène s'est répété dans les environs de Paris; une source qui faisait mouvoir un moulin se dessécha lorsqu'on ouvrit une carrière voisine d'où s'échappa une forte vapeur; la source se remplit de nouveau, après que la carrière eut été comblée. — On peut citer comme une autre preuve directe le résultat d'une expérience que LA HIRE avait faite en plusieurs fois pour prouver que l'eau de pluie ne pénètre que fort peu dans le sol. Un plateau métallique, à bords recourbés, fut enfoui dans une position un peu inclinée, à 8' au dessous du sol; un tuyau de plomb, long de 42' conduisait de sa partie la plus basse dans une cave. Pendant 45 ans pas une goutte ne découla par ce tuyau. Un autre plateau de 64" □ de surface fut enfoui à 8" de profondeur dans un emplacement à l'abri du vent et du soleil. Depuis le 42 Juin jusqu'au 29 Février il ne se montra point d'eau, et même alors il



n'en parut qu'une petite quantité après une grosse pluie qui fut suivie d'une forte neige. — A 16' de profondeur l'eau ne filtrait plus du tout, et chose digne de remarque, les *plantes qui se trouvaient au dessus du plateau, manquèrent d'humidité au point qu'elles se fanèrent*. On se rappelle que M. DALTON a vu son atmomètre, appareil tout semblable à celui de LA HIRE, se revêtir de plantes pendant la seconde année. Je ne sais s'il faut chercher la raison des résultats opposés de DALTON et de LA HIRE dans la nature des plantes qui couvraient le sol, ou simplement dans la plus grande profondeur de l'atmomètre ou bien dans la grande humidité de l'atmosphère à Manchester. M. DALTON l'attribue à l'exiguité de la hauteur des pluies à Paris, qui ne fait que 20''; mais il convient en même tems de ce que la pluie ne saurait suffire quelquefois en été, même en Angleterre, à la vie des plantes. Quant à la cause qui fait monter alors l'humidité jusqu'aux racines des plantes, il ne veut pas se prononcer là dessus. — On serait peut être tenté de regarder l'observation de LA HIRE comme chose accidentelle; mais la comparaison de la quantité de pluie qui tombe en des lieux différents, fait douter que ce soit l'eau seule des pluies qui nourrisse les plantes. Or il est constaté que plus on avance en Europe vers l'E., plus la quantité de pluie annuelle diminue; il est reconnu par exemple que dans les sept années depuis 1785—1792 le nombre des jours pluvieux par an s'élevait à 205 à Moscou, tandis

qu'à Casan ce nombre descend à 90. Plus à l'E. encore, en Sibérie, deux observateurs ont fixé pour Irkutsk ce nombre l'un à 64, l'autre à 54 jours; de plus ils font remarquer que la pluie y était ordinairement si faible, qu'elle mouillait à peine le sol. — De semblables contrastes se trouvent aussi en d'autres pays; à Stockholm la hauteur des eaux de pluie fait 49"; à Bergen, en Norwège, par la même latitude elle est de 83". Maintenant, si les plantes à Irkutsk et à Casan ne recevaient d'en bas de l'eau, pour suppléer à celle qui leur est fournie si parcimonieusement par l'atmosphère, ne serait-il pas probable, que ces deux régions eussent été des déserts; et que si le  $\frac{1}{4}$  des eaux d'irrigation à Bergen pouvaient suffire à la vie des plantes à Stockholm, tous les environs de la ville norvégienne seraient des marais imperméables? Très souvent j'ai été étonné de la grande quantité d'eau qu'il fallait verser dans un pot de jardin, pour qu'une chétive fleur ne manquât pas d'humidité. Quelque grand que l'on veuille supputer le pouvoir dessicatif de l'argile dont ces pots sont confectionnés, certainement toute plante en pot, demande dans le courant d'une année plus du double de ce qui tombe sur les plantes des champs. — Peut-être qu'une alimentation artificielle des plantes par des vapeurs conduites dans le sol, alimentation imitée de la nature, aurait pour les serres chaudes une heureuse influence. S'il n'y avait pas de vapeurs émanant d'en bas, comment pourrait-on expliquer que, par les tems

de plus forte sécheresse, la terre reste toujours humide; après le coucher du soleil, à Moscou au moins, on n'a qu'à remuer légèrement la terre de jardin, pour qu'elle paraisse de couleur noire, quelque sèche qu'elle soit à la surface. En même tems des précipités chimiques, qu'on met très humides encore en tonneaux, dessèchent parfaitement.

Dans tous les ouvrages sur la Physique de la terre on peut trouver une relation des expériences de LA HIRE; mais malgré que personne ne les ait refutées, on ne s'en embarasse pas trop et on va toujours son train. C'est attristant, puisqu'il y a ou de la partialité à ne pas vouloir en aborder toutes les conséquences naturelles, ou de la négligence à ne pas les reproduire.

Une autre considération vient encore à l'appui de la théorie de DESCARTES. Il y a des expériences de DUFAY par rapport à la formation de la rosée, qui ont eu le même sort que les expériences de LA HIRE. DUFAY suspendit des plaques de verre en position horizontale à différentes hauteurs au dessus du sol. Il vit que leur surface inférieure se mouilla seule, et que la plaque placée le plus haut à 34', ne se couvrit de rosée qu'une demi-heure après celles qui étaient tout en bas. Ces expériences prouveraient que des vapeurs non condensées peuvent s'échapper de la terre, mais elles s'accordaient mal avec une expérience de WELLS et furent comme oubliées. Toutefois la belle théorie de WELLS, qui démontre comme cause première de la rosée le rayonnement,

suivi d'une plus grande perte de chaleur dans le sol que dans l'atmosphère, n'oppose rien à l'hypothèse des vapeurs sortant de l'intérieur de la terre, hypothèse qui expliquerait les expériences de DUFAY.

On a très souvent cité en faveur de la théorie de MARIOTTE les eaux qui encombrant presque toutes les mines et plus abondamment dans leurs parties inférieures; l'origine de ces eaux s'explique encore mieux par la théorie cartésienne. Il n'y a que la comparaison de la température de ces eaux, avec celle des couches d'où elles jaillissent, qui pourrait décider quel mode d'origine est le plus productif. Si les eaux se formaient dans des couches supérieures, elles devraient avoir une température plus basse que le roc, à moins d'avoir séjourné assez longtems aux profondeurs où on les trouve. Mais ce sont là des observations extrêmement délicates, qui pourraient difficilement trancher la question, quand même elles existeraient en très grand nombre.

Les puits artésiens présentent une circonstance curieuse. En les forant on ne rencontre l'eau jaillissante presque jamais au dessus d'une couche argileuse, mais constamment en dessous. Si, la première couche d'argile percée, l'eau ne jaillit pas, à la rencontre de la seconde ou de la troisième, l'espoir renaît; quelquefois, comme à Erlangen, ce n'est qu'après la quatrième couche d'argile percée, que l'on trouve une veine d'eau jaillissante avec assez de force. Voici l'ordre des couches percées pour des puits artésiens. Pour les environs de Vienne ce sont



une couche épaisse de cailloux et au dessous une autre encore plus épaisse d'argile bleue suivie d'une couche de marne très dure; lorsqu'on a foré celle-ci jusqu'au fond, l'eau jaillit avec une violence telle, que les ouvriers doivent s'éloigner précipitamment. A Wad Reag, dans les environs d'Alger, situé loin des montagnes dans une plaine d'une grande étendue, ce sont plusieurs couches alternantes de sable et de cailloux de plus de 200 mètres de profondeur, puis une couche de schiste, au dessous de laquelle on est sûr de trouver de l'eau, qui jaillira avec violence. Le plus souvent le nombre des couches est plus grand que dans les exemples cités, et elles se suivent dans un ordre plus compliqué.

Cette disposition constante des couches imperméables au dessus des amas d'eau, semble impliquer que ces couches vont sans aucune interruption jusqu'au pied des montagnes. Quant à l'eau des puits artésiens, aussi longtems qu'il n'a pas été prouvé qu'une pareille continuité de couches n'existe point, son origine peut être attribuée aussi bien à la filtration qu'à la distillation. Mais comme il est bien permis de douter dans quelques cas de la continuité des couches très minces à d'énormes distances, la condensation des eaux telluriques entre deux couches imperméables est plus vraisemblablement la cause génitrice des eaux alimentaires des puits artésiens. La tension des vapeurs peut expliquer la force avec laquelle l'eau y est projetée en dehors. On a voulu trouver un avantage à la théorie de MARIOTTE, celui



d'expliquer facilement la force avec laquelle l'eau s'écoule des sources. On n'aurait à cet effet, qu'à imaginer, disait-on, des siphons remplis d'eau. Si la branche plus longue se fournissait d'eau à une plus grande élévation que la branche plus courte, l'eau devait nécessairement sortir de celle-ci avec une certaine énergie. Bien que la théorie de DESCARTES participe à cet avantage d'explication, observons qu'il peut rarement y avoir continuité dans le filet d'alimentation, et que la nature montre, par les fontaines de naphte à Bacou, qu'elle peut fort bien se passer de siphons, communiquant avec les montagnes.

Toutes ces considérations, qui prises une à une ne sauraient peut-être décider la question, prises conjointement me semblent imprimer le cachet de la vérité à la théorie cartésienne. Les modifications qu'on devrait y introduire, ne seraient pas essentielles. Ainsi, on dirait que les cavités, que DESCARTES conçoit remplies d'eau marine et auxquelles il donne une élévation si grande, que sur le fond l'eau est convertie en vapeur et sur les parois les vapeurs sont condensées, n'existent certainement pas. La vaporisation peut s'effectuer dans des cavités qui ne communiquent avec les couches supérieures que par de minces fissures. Il n'est pas besoin d'imaginer dans l'intérieur de la terre des vases distillatoires à l'instar des cornues des Chimistes; la vapeur peut se condenser partout, dans du sable comme entre deux couches de pierre;

enfin elle peut sortir comme telle par les pores de la surface terrestre, n'ayant perdu que sa tension. Il est aisé de concevoir qu'une pareille opération de la nature soit possible; il me semble qu'on peut la démontrer comme rigoureusement nécessaire. En effet non seulement il y a quelques cas où l'on a observé l'eau des mers pénétrant par des canaux dans l'intérieur de la terre; mais si la pluie filtre à travers les couches supérieures de l'écorce terrestre, à plus forte raison les eaux de la mer doivent le faire sous l'immense pression à laquelle elles sont exposées. Les eaux minérales d'Aix en Provence sont évidemment des sources d'eau de la température ordinaire détournées dans une fente profonde, qui les conduit à des couches plus basses où elles se chargent de chaleur, et d'où elles remontent par un accident instructif pour les Physiciens aussi près du lieu de leur perte. (Voy. Ann. du Bur. des Long. p. l'an 1836.) Les eaux de Carlsbad et du Mont d'Or si semblables par leurs ingrédients, sortent aussi de rochers de la même composition, et quoique l'on ne puisse pas indiquer tel filet d'eau à la température ordinaire qui les nourrit, personne n'a plus de doute, qu'elles ne soient formées de la même manière que les eaux d'Aix. Si de la surface des continens aux couches inférieures l'existence de canaux de communication est démontrée, pourquoi de pareils canaux n'existeraient-ils pas au fond de l'Océan, et pourquoi ces canaux n'auraient-ils pas des ramifications jusqu'au dessous des continens?

En les admettant, on comprendrait comment les eaux de la mer Caspienne, des mers Noire et Baltique, et même les pluies qui tombent en Autriche ou en Turquie peuvent parvenir jusqu'en Russie et alimenter les sources d'un pays glacé.

Un autre phénomène singulier s'explique de la même manière : sur la plus haute montagne de l'Allemagne septentrionale, le Brocken au Hartz, comme aussi sur l'Ochsenkopf, la plus haute montagne du Fichtelgebirge, il y a à 48' au dessous de la cime des sources très abondantes. La source des sorcières au Brocken fournit par jour 4440' cubes d'eau. Des juges impartiaux déclareront certainement, que ces sources ne peuvent pas être alimentées par les pluies ; des sectataires de MARIOTTE le déclarent eux-mêmes. Mais alors ils ont recours à la théorie de HALLEY : comme si on pouvait s'attendre à ce que des cimes aussi exiguës pussent condenser une aussi prodigieuse quantité d'eau.

Faisons une dernière remarque. GEHLER opposa à DESCARTES, que l'intérieur des montagnes serait depuis longtems rempli de sel marin. Mais d'abord ce n'est pas dans l'intérieur des montagnes que doit se faire la distillation de l'eau, mais dans les profondeurs de la terre ; et qui sait, si les cavités qui y servent ne sont pas déjà remplies à moitié de sel marin ? Le dépôt de sel qui serait occasionné par le départ de toute l'eau de l'Océan, ne serait pas si grand en comparaison de l'intérieur de la terre. Des calculs qui ont été faits sur les sources de Carls-

bad peuvent servir d'échelle de comparaison. On a trouvé qu'elles devraient couler 54,421 ans pour fournir une masse de sel de 145,5 carrés de base et haute de 20' seulement. L'argument de GEHLER s'affaiblit encore quand on considère, que les eaux marines ne sont pas seules volatilisées; une portion des eaux de pluie, des rivières et des lacs doit tout aussi bien y participer.

Je crains d'avoir abusé de votre patience, Messieurs, et je me hate d'en venir aux conclusions. Le résultat de ces réflexions a été, que la théorie de MARIOTTE, adoptée exclusivement, est insuffisante, que la nature emploie certainement, pour alimenter les sources, les moyens indiqués par HALLEY et par DESCARTES. Que la distillation des eaux pluviales ayant été étudiée sans mener à des chiffres exacts, il est absolument nécessaire:

- 1) d'étudier à leur tour l'influence des montagnes et des forêts, et
- 2) de tâcher d'évaluer ce qui peut-être fourni aux sources par la volatilisation de l'eau souterraine.

Pour atteindre l'objet de la première étude il me semble qu'on devrait mesurer la masse des eaux qui sont annuellement exportées par les fleuves hors de la Suisse. Ayant fixé par des observations la somme dont ces fleuves sont augmentés en traversant un aréal de la grandeur de la Suisse dans la zone adjacente de terrain plat, le surplus du premier chiffre sur le second, soumis à des corrections



nécessaires, indiquerait le degré de puissance des montagnes pour condenser les vapeurs.

La seconde étude nous intéresse de plus près. Ne serait-il pas temps de mesurer exactement la différence qui existe entre les moyennes des masses d'eau, qui sont versées par tous les grands fleuves de la Russie, les deux Dwina, la Néwa, l'Oural, le Wolga, le Don, le Dnièpr, pendant que ces fleuves sont gelés et lorsque leur cours est libre. La grandeur de cette différence déterminerait seule suffisamment le degré d'influence, qu'il faut attribuer à la condensation des vapeurs telluriques. Peut-être ces mesures serviraient-elles aussi à nous indiquer les localités, où il faut supposer les plus forts courans de ces vapeurs. Quant à leur existence, je le répète, elle n'est pas douteuse; vainement expliquerait-on le fait qui nous occupe par des réservoirs d'eau, où s'accumuleraient les pluies d'automne. A voir combien par les tems de sécheresse en été les rivières diminuent rapidement, ces amas ne fourniraient d'eau en hiver que pour quelques semaines, et il y a des années où les pluies ne précèdent pas les gelées. Je rappellerai qu'en Septembre de l'année passée à Moscou comme à Vienne pas une goutte de pluie n'est tombée; en Autriche les sources tarirent presque entièrement: mais en Russie, elles ne s'en ressentirent pas; au contraire elles eurent leur crue ordinaire vers ce tems. En Suède on ne se rappelle pas d'avoir vu déborder les ruisseaux et les rivières autant qu'en



Avril 1829, quoique les champs à cette époque fussent encore recouverts d'une haute couche de neige. — Ces anomalies apparentes, je le repète, ne s'expliquent que par la théorie cartésienne, et ne laissent de doute que sur l'extension dans laquelle la nature emploie la vaporisation souterraine pour alimenter les sources.

Ne serait-ce pas, Messieurs, une tâche digne de la Société, à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir comme membre, que d'éclaircir une question d'une si haute importance. Ma position individuelle ne me permet pas de me consacrer entièrement à un travail d'une aussi grande étendue. Je sou mets donc mes vues aux lumières de la Société, dans l'espoir que si mes réflexions lui paraissent justes, elle voudra bien inviter les savans, et ceux particulièrement qui y sont appelés par leur état ou favorisés par le lieu de leur séjour, à entreprendre en commun un travail, qui jetterait quelque lumière sur un chapitre encore obscur de la Météorologie. Cette invitation de la Société, je n'en doute pas, deviendrait la base d'une association scientifique, dont les nombreuses observations pourraient servir bientôt de matériaux pour la Krenographie.

Moscou,  
le 27 Avril 1837.

---

# SÉANCES

DE LA

SOCIÉTÉ IMPÉRIALE DES NATURALISTES

DE MOSCOU.

---

SÉANCE DU 27 AVRIL 1837.

## *Ouvrages offerts.*

Полишическое устройство Германцевъ до VI столѣтія, сочиненіе Михаила Куторги. С. Пб. 1837; par l'Université Impériale de St. Pétersbourg.

Proceedings of the zoological society of London. Part. III. 1835. 8.; par la Société.

The transactions of the Linnean Society of London. Vol. XVII. Part. the third. London 1836; par la Société.

Voyage autour du monde, exécuté par ordre de SA MAJESTÉ L'EMPEREUR NICOLAS I, sur la corvette le Seniavine, dans les années 1826, 1827, 1828 et 1829, par FRÉDÉRIC LUTKE de 1835. III vol. 8.; par un des rédacteurs M. A. P. POSTELS.

Beitrag zur Monographie der Gattung *Crania*, von FRIEDRICH WILHELM HOENINGHAUS etc. 1828; par l'auteur.

Calymene arachnoides Goldfuss, par FRÉD. GUILL. HOENINGHAUS, 1835, 4 Mars; par l'auteur.

*Objets offerts.*

M. S. S. SCHTSCHOUKINE envoie 350 espèces des plantes rares du Gouvernement d'Irkoutsk.

M. P. TH. ZABLOTSKY envoie 400 espèces de plantes recueillies sur les côtes de la mer Caspienne et 30 espèces d'insectes Coléoptères rares et nouveaux.

E. C. C. STEVEN envoie 4 peaux d'oiseaux du Mexique, envoyés par M. HOOKER de Glasgow, pour changer contres des espèces d'oiseaux russes.

M. HOENINGHAUS envoie une collection des pétrifications d'Allemagne.

*Lectures.*

S. Ex. M. le Vice-président G. FISCHER DE WALDHEIM: Observations sur l'Ornithorhynches de Blainville.

P. P. EINBRODT: Réflexions sur l'alimentation des sources.

J. R. HERMANN: Ueber die saure Beschaffenheit des Bluts.

CH. SCHLIPPE sur un acide nouveau qu'il trouve dans le vinaigre de bois. (Ueber eine neue Säure in dem Holzeßig.)

V. J. MOCZOULSKY: Continuations de ses observations sur les Pselaphiens.

Arachnographiæ rossicæ decas prima et Cicada Steveni, par Prof. J. A. KRYNICKY de Charkow, lu par le 2<sup>e</sup> secrétaire.

Description de quelques nouveaux Coléoptères, par le 1<sup>er</sup> secrétaire B. P. ZOUBKOW.

*Membres élus.*

Sur la proposition de Son Ex. M. le Vice-président  
FISCHER DE WALDHEIM.

*Membre honoraire.*

S. Ex. M. le Directeur du Département médical  
du Ministère de l'Intérieur M. le Dr. S. TH. GAYEWSKY.

*Membres ordinaires.*

RICHARD OWEN du Danemark.


P. TH. ZABLOTSKY à St. Pétersbourg.

Sur la proposition du 1<sup>er</sup> secrétaire de la Société  
M. B. P. ZOUBKOW: M. le Prof. A. P. POSTELS à St.  
Pétersbourg.

---

## ERRATA.

N<sup>o</sup>. III. Séance du 20 Janvier, lisez: Mars.



*Sternodes Karelini*  
*Tenebrio caspicus* Pall.








2. *Otes*; 3. *Timelia intermedia*; 4. *Acapha Wiedemanni*; 5. *Brachyscelis muricata*.











*Pseudoeurycea* *Tracyi*



# RÉGLEMENT

DE LA

## SOCIÉTÉ IMPÉRIALE

DES

## NATURALISTES

DE


## MOSCOU.



CONFIRMÉ PAR

S. E. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

*le 13 Mars 1837.*



MOSCOU.

DE L'IMPRIMERIE DE L'UNIVERSITÉ.

1837.



Съ одобрения Университетскаго Начальства. Гюня  
13 дня, 1837 года.

---

# RÉGLEMENT

DE LA

SOCIÉTÉ IMPÉRIALE

DES NATURALISTES

DE MOSCOU.

---

## DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

### 1.

Conformément au consentement Suprême, accordé en 1807, la Société des Naturalistes de Moscou conserve le titre de Société IMPÉRIALE.

### 2.

Le principal but de la Société est de s'occuper de l'Histoire Naturelle et des Sciences qui s'y rattachent, telles que



jusqu'à leur détermination complète , ont un local particulier , qui sert à la fois à la Société de lieu de séances, de Bibliothèque et d'Archives. La Société reçoit ce local de l'Université IMPÉRIALE de Moscou.

#### 10.

La Bibliothèque et les instrumens de Physique forment la propriété inaliénable de la Société.

#### 11.

La Société a son cachet ; il porte les armes de l'Empire avec cette inscription : *De la Société IMPÉRIALE des Naturalistes de Moscou.*

#### 12.

Conformément au privilège obtenu en 1808 , la Société est affranchie de tout paiement pour envoi d'argent , comme pour envoi de lettres et de paquets relatifs aux objets de science, lorsque cet envoi ne dépasse pas un poud (16 kil. 240).

## DE L'ENTRETIEN DE LA SOCIÉTÉ.

### 13.

Deux sommes sont assignées à l'entretien de la Société: l'une est fixe, l'autre dépend des dons volontaires.

### 14.

La somme fixe consiste, premièrement: en 10,000 roubles que la Société doit, tous les ans, à la munificence de SA MAJESTÉ L'EMPEREUR, pour subvenir à ses opérations, et conformément aux Oukases du 9 Février 1818 et du 11 janvier 1829; et secondement: en ce qui résulte du dépôt intégral de 30 roubles ass. fait par chaque membre, chaque année.

### 15.

La recette volontaire consiste dans les dons des membres de la Société. Ces dons sont remis au premier Secrétaire, qui en tient compte, et qui, chaque mois, en porte le résultat à la connaissance de la Société.

### 16.

La Société a le droit d'accepter, au moyen de ces dons volontaires, les sacrifices de tout genre faits en sa faveur, soit en meubles soit en immeubles, et de

conclure à cet effet toute convention, toute transaction légale.

### 17.

Il sera fait mention de tous les dons volontaires en faveur de la Société, dans le plus prochain numéro de son Journal; et ceux qui auront mérité une attention particulière, seront imprimés dans la Gazette de Moscou.

## DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ.

### 18.

La Société se compose de Membres ordinaires et de Membres honoraires.

### 19.

Pour être reçu membre, tout candidat doit :

- 1<sup>o</sup>) Etre présenté par un membre qui témoigne de ses connaissances.
- 2<sup>o</sup>) Présenter à la Société quelque dissertation ou quelque ouvrage dont il soit l'auteur et qui soit connu dans le monde savant.
- 3<sup>o</sup>) Etre mis au scrutin, et obtenir les trois quarts des voix.

**20.**

Les Membres qui font part à la Société du fruit de leurs travaux et de leurs observations, ou qui lui envoient des objets d'Histoire Naturelle rassemblés par leurs soins, ont le droit de recevoir gratuitement le journal publié par la Société.

**21.**

Les Membres qui déposent la somme annuelle désignée par le § 14, ont le droit de recevoir gratuitement le Journal, les Mémoires et toute publication faite par la Société.

**22.**

L'auteur d'un article inséré dans le Journal ou dans les Mémoires de la Société, ou d'un ouvrage publié par la Société même, reçoit gratuitement 50 exemplaires de son travail.

**DES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ.****23.**

La Société fait paraître des Mémoires, un Journal, et des ouvrages séparés, qui, à cause de leur étendue, ne peuvent faire partie des Mémoires ni du Journal.

Les Mémoires renferment les articles originaux les plus intéressans , le résultat des observations et des recherches des Membres de la Société.

Le Journal sert à répandre plus rapidement la connaissance des découvertes faites par les membres , et de plus, il renferme les articles d'une moindre importance, les extraits des protocoles des séances ainsi que de la correspondance scientifique, et, en général, tout ce qui concerne les travaux de la Société.

#### 24.

Les ouvrages présentés à la Société peuvent être écrits en russe, en latin, en allemand, en italien et en français.

#### 25.

La publication des Mémoires, du Journal et des ouvrages séparés est confiée au Bureau de la Société.

### DE L' ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ.

#### 26.

La Société a son Président. Le Président veille à l'exécution du règlement, il dirige les opérations de la Société vers le but



qui lui est assigné; il fixe les séances, signe les protocoles et autres actes.

### 27.

Le Curateur du cercle Universitaire de Moscou est de droit Président de la Société.

### 28.

La Société a un Vice-Président, choisi parmi les membres ordinaires, à la pluralité des voix. En l'absence du Président, il occupe sa place et entre dans tous ses droits.

### 29.

La Société a deux Secrétaires et un Trésorier, qui sont choisis, chaque année, parmi les membres ordinaires, à la pluralité des voix.

### 50.

Le premier Secrétaire est chargé de toute la correspondance de la Société. Toutes les lettres, tous les envois destinés à la Société doivent être adressés en son nom. Au commencement de chaque séance, il donne lecture du protocole de la séance précédente, et le signe avec le Président. Il expose le contenu des papiers nouvellement reçus, il dresse le protocole des séances,

et tient la correspondance au nom de la Société. C'est encore lui qui, sous la direction du Président, établit le compte-rendu général.

### 51.

Le second Secrétaire prend la place du premier, en cas d'absence ou de maladie de celui-ci. Il est à la fois Bibliothécaire, Gardien des Archives et Conservateur des productions naturelles qui parviennent à la Société. C'est lui qui est chargé de l'envoi des doubles aux personnes qui les ont acquis par des échanges.

### 52.

En cas de besoin, la Société choisit parmi ses membres ordinaires un Conservateur pour les objets d'Histoire Naturelle, lequel, en recevant ce titre, devient membre du Bureau de la Société.

### 55.

Le Trésorier est dépositaire des fonds de la Société. Il reçoit l'argent, tient note des rentrées, et fait tous les débours que la Société a jugés nécessaires. Il est responsable de toute la comptabilité. A la fin de l'année, et conformément à des statuts particuliers établis d'avance pour

cet objet, il rend compte de tous les fonds que renfermait la caisse.

### 54.

Le Président, le Vice-Président, les Secrétaires, le Conservateur des objets d'Histoire Naturelle et le Trésorier, auxquels sont adjoints deux Membres, élus à la pluralité des voix, forment la Direction de la Société, en d'autres termes, le Bureau. Dans les circonstances qui exigent une prompte décision, la Direction agit au nom de la Société; et, après avoir dressé un rapport sur la décision qu'elle a prise, elle le communique à la Société dans la séance qui doit suivre.

## DISPOSITIONS INTÉRIEURES.

### 55.

Les Séances de la Société ont lieu une fois par mois, à l'exception des mois de Mai, Juin, Juillet, Août et Septembre. Au commencement de l'année, les membres sont informés des dates auxquelles ces séances sont fixées pour tout le cours de l'année.

**56**

Toute discussion étrangère aux sciences qui font l'objet des travaux de la Société, est bannie des séances.

**57.**

Tout membre a le droit d'amener des personnes de sa connaissance aux assemblées de la Société.

**58.**

La Société verra surtout avec plaisir dans ses assemblées les Étudiants qui auraient un goût particulier pour les sciences auxquelles elle consacre ses travaux ; et, dans l'intention de développer encore ce goût en eux , elle recevra au nombre de ses membres ceux de ces jeunes Naturalistes qui se montreront dignes de cet honneur.

















3 5185 00259 6797

Only bot. art. is at I/56 by Wieg.



